

61(08)

0-88

1857



814

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ

61(08)  
0-88

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ


ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ  
обозначенного здесь срока

			31169	

13

Тип. им. Котлякова. 4 — 7500000. 1984 г. ЛГ-087-01-589.  
Цена 0 р. 58 к. за 1000 шт.







$$\Phi_n(1)^{1''} + \Phi_{12}(1'')^2$$



22

## ОТЧЕТЪ

## О СОСТОЯНІИ ОБЩЕСТВЕННАГО ЗДРАВІЯ

И

ДѢЯТЕЛЬНОСТИ БОЛЬНИЦЪ ГРАЖДАНСКАГО ВѢДОМСТВА

ВЪ ИМПЕРІИ

ЗА 1856 ГОДЪ.

По приказанію Господина Министра Внутреннихъ Дѣлъ составленъ Медицинскимъ Департаментомъ изъ поступившихъ въ оный официальныхъ свѣдѣній.


Съ тремя литографированными рисунками и числительною вѣдомостію болѣзней, пользовавшихся въ гражданскихъ больницахъ, по губерніямъ.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЪ.

Въ типографіи Императорской Академіи Наукъ.

1857.

П К



3 506  
31169





Печатано по приказанію Господина Министра Внутреннихъ Дѣлъ и съ  
разрѣшенія Медицинскаго Департамента.

Директоръ, Гражданскій Генераль-Штабъ-Докторъ **Θ. Отсолиъ.**



На подлинномъ написано:

Напечатать. *С. Ланской.*

ГОСПОДИНУ МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ

**МЕДИЦИНСКАГО ДЕПАРТАМЕНТА**

ДОНЕСЕНІЕ.

Согласно приказанію Вашего Высокопревосходительства, Медицинскій Департаментъ имѣетъ честь представить у сего Отчетъ о состояніи народнаго здравія и о дѣятельности больницъ гражданскаго вѣдомства въ Имперіи за 1856 годъ. И на сей разъ Медицинскій Департаментъ могъ ограничиться только общимъ выводомъ данныхъ изъ отчетовъ 54 Врачебныхъ Управъ и 493 больницъ, собственно въ вѣденіи Министерства Внутреннихъ Дѣлъ состоящихъ, и за тѣмъ поставленъ въ возможность представить на судъ ученаго сословія похвальные труды на пользу науки и человѣчества лишь врачей, Медицинскому Департаменту подчиненныхъ.

Директоръ, Гражданскій Генераль-Штабъ-Докторъ

*Θ. Отсолигъ.*

24 Октября 1857 года.

---



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY



# ОТЧЕТЪ

О СОСТОЯНІИ

## ОБЩЕСТВЕННАГО ЗДРАВІЯ

И

О ДѢЯТЕЛЬНОСТИ БОЛЬНИЦЪ ГРАЖДАНСКАГО ВѢДОМСТВА

**ВЪ ИМПЕРІИ**

ЗА 1856 ГОДЪ.

Зима въ концѣ 1855 года повсемѣстно началась весьма рано: уже къ половинѣ Ноября всюду, кромѣ самыхъ южныхъ предѣловъ Имперіи, установилась санная дорога и въ началѣ Декабря стали почти всѣ рѣки при сильныхъ и постоянныхъ морозахъ. Первая половина Декабря была особенно холодна; охлажденіе температуры воздуха, послѣдовавшее между 15 и 30 Ноября, или держалось на той же степени, или мѣстами, не только въ сѣверныхъ, но и въ среднеполосныхъ и южныхъ губерніяхъ, еще замѣтно усилилось. Вообще первой половинѣ Декабря 1855 года принадлежитъ самое значительное пониженіе термометра прошлогодней зимы. Оно доходило до—37° въ губерніяхъ Тобольской и Алтайскомъ Округѣ Томской;



- до—32° » Кяхтѣ;  
» —30° » Ярославской (3 и 4 Декабря), Тверской (10  
Декабря) и сѣверной части Херсонской гу-  
берніи;  
» —29° » губерніи Иркутской (около половины Де-  
кабря);  
» —28° » губерніяхъ Минской, Витебской (около 10  
Декабря) и Вятской (7 Декабря);  
» —27° » губерніяхъ Харьковской (въ началѣ Де-  
кабря), Калужской (около 10), Полтавской и  
Смоленской (до 15 Декабря);  
» —26,5° » Тульской (около половины его);  
» —26,2° » Курской (5 Декабря);  
» —26° » Могилевской (около половины Декабря);  
» —25° » губерніяхъ Псковской, Орловской, Костром-  
ской, Тамбовской, Виленской, Ковенской и  
Черниговской (между 7 и 15 Декабря);  
» —24° » губерніяхъ Кіевской и Волынской (7 Дека-  
бря); Московской и Владимірской (до 10 Де-  
кабря);  
» —22° » Бессарабской области (въ началѣ Декабря)  
и губерніяхъ Симбирской (7) и С. Петер-  
бургской (по 8 Декабря);  
» —20° » Одессѣ и губерніяхъ Гродненской и Екате-  
ринославской (до 15 Декабря);  
» —18° » Саратовской губерніи (въ началѣ Декабря).

И только въ губерніяхъ Тифлиской, Ставропольской, Астраханской и Таврической первая половина Декабря еще не сопровождалась полнымъ развитіемъ зимнихъ холодовъ.

Сильные морозы смѣнились оттепелями, быстро и неожиданно наступившими, мѣстами въ концѣ первой трети и затѣмъ повсемѣстно, съ половины Декабря. Въ губерніяхъ Курской еще съ 8-го, въ С.-Петербургской съ



9-го, въ Калужской, Минской, Московской и Рязанской съ 10 Декабря холодъ сдѣлался слабѣе, показались туманы и температура воздуха поднялась мѣстами до  $+3^{\circ}$ ; а къ 15 Декабря почти на всемъ протяженіи Имперіи сдѣлалась оттепель, согнавшая на большихъ пространствахъ снѣгъ, и начали падать дожди. Въ Томской губерніи еще около 10-го, въ Черниговской и Курской съ 15-го, въ С.-Петербургской съ 19-го, въ Виленской, Ковенской и Лифляндской губерніяхъ между 15 и 20 днемъ Декабря эти зимніе дожди были особенно значительны. Оттепель замѣчалась слабѣе въ отдаленныхъ сѣверныхъ и восточныхъ губерніяхъ, именно въ Архангельской, Олонецкой Ярославской, Костромской, Вологодской, Пермской, Вятской, Казанской, Нижегородской и Симбирской, знаменуясь въ нихъ однимъ ослабленіемъ морозовъ до  $-10^{\circ}$  и мѣстами до  $-4^{\circ}$ ; въ губерніяхъ же средней и южной полосы теплота воздуха въ это время при пасмурномъ небѣ доходила до  $+4^{\circ}$ , а на югѣ до  $+7^{\circ}$ . Такъ продолжалось съ 15 Декабря и мѣстами ранѣе вплоть до 24; въ этотъ день ночью вновь показались сильные морозы; ожесточаясь въ продолженіи послѣдующихъ дней они скоро дошли въ губерніяхъ Волынской и Кіевской до  $-12^{\circ}$ , въ Калужской и Гродненской до  $-17^{\circ}$ , въ Астраханской до  $-18^{\circ}$ ; при чемъ Волга покрылась льдомъ, въ С.-Петербургской и сопредѣльныхъ съ ней также до  $-18^{\circ}$ , въ Ставропольской до  $-19^{\circ}$ , въ Симбирской и Казанской до  $-21^{\circ}$ , въ Нижегородской до  $-22^{\circ}$ , въ Ярославской до  $-26^{\circ}$  и въ Тверской мѣстами до  $-27^{\circ}$ . Но это возобновленное усиленіе морозовъ было весьма кратковременно: уже 27 Декабря на югѣ сдѣлалась сильная оттепель, мѣстами съ мокрымъ снѣгомъ и дождемъ, и вліяніе ея, при господствовавшемъ въ то время южномъ вѣтрѣ, обнаружилось почти чрезъ все протяженіе Имперіи. Сухой холодъ смѣнялся туманами, воздухъ сдѣлался сырѣе и влаженѣе; тем-



пература дня повсемѣстно отъ восточныхъ до западныхъ предѣловъ Европейской части Государства и на сѣверъ до  $58^{\circ}$  сѣверной шпроты доходила до  $+3$  и  $+4^{\circ}$ . Во многихъ мѣстахъ выпало много мокраго снѣгу и шли дожди, особенно сильныя въ губерніяхъ Вольнской, Курской, Херсонской, Калужской, Гродненской, Кіевской, Черниговской, Харьковской, Тамбовской и Екатеринославской. Въ четырехъ послѣднихъ губерніяхъ они почти совершенно согнали снѣгъ; а въ Тамбовской отъ нихъ даже вскрылись и прошли рѣки. — На глубокомъ сѣверѣ и въ губерніяхъ Сибирскихъ Декабрь съ начала до конца отличался постоянными суровыми холодами.

Въ продолженіи Января погода была также весьма переменчива. Въ первые дни этого мѣсяца вездѣ были морозы, мѣстами даже въ умѣренной полосѣ значительныя; такъ доходили они въ Черниговской, Тульской (8 Января) и Вольнской губерніи (1 и 2 Января) до  $-16^{\circ}$ , въ Минской до  $-22^{\circ}$  (4 Января), въ Курской до  $-24,5$  (3 Января), въ Харьковской до  $-27^{\circ}$  (около 8 Января); при чемъ вновь встали рѣки. На сѣверѣ температура воздуха колебалась между  $-20^{\circ}$  и  $22^{\circ}$ ; въ Сибирскихъ губерніяхъ упадала она до  $-30^{\circ}$ , при чемъ встала Ангора въ Иркутской губерніи (на 6 Января). Въ остальныхъ же частяхъ Имперіи въ первые дни мѣсяца держались морозы отъ  $-6^{\circ}$  до  $-15^{\circ}$ , и даже въ Астрахани до  $-7^{\circ}$  и  $-8^{\circ}$ , въ Одессѣ до  $-10^{\circ}$  и въ Тифлисѣ до  $-12^{\circ}$ . Непосредственно за ними опять наступила оттепель, обнаружившаяся прежде всего въ южныхъ мѣстностяхъ и постепенно распространявшаяся на сѣверъ. Съ 5 числа въ Вольнской, Минской, Кіевской и южныхъ частяхъ Херсонской губерніи термометръ началъ показывать днемъ  $+4^{\circ}$ , при томъ снѣгъ быстро сходилъ и уничтожался санный путь; въ Астрахани въ это время было  $+5^{\circ}$ , въ Одессѣ  $+6^{\circ}$ ; между 9 и 11 Января оттепель



обнаружилась въ губерніяхъ Курской (до  $+2^{\circ}$ , 3), Черниговской ( $+3^{\circ}$ , 3), сѣверной части Херсонской, въ Харьковской, Саратовской, Тульской ( $+1^{\circ}$ , 5), Воронежской, Орловской, Калужской, Московской, Тверской, Псковской, С.-Петербургской ( $+2^{\circ}$ ) и Ярославской ( $+1^{\circ}$ ). Къ 15 Января сдѣлалась она почти повсемѣстною, была чувствительна даже на сѣверѣ и въ Сибири и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сопровождалась сильными дождями, особенно въ губерніяхъ Вольнской (8, 11 и 27 Января), Харьковской (10, 17 и 29), Курской (10 и 11), С.-Петербургской (9, 10, 15 и 17), Ярославской (11) Калужской (15), Гродненской, Воронежской и Саратовской (около 15), а также Курляндской и Эстляндской (27 и 29). Отъ этихъ дождей обнажились поля и въ Гродненской, Саратовской и Харьковской губерніяхъ рѣки вскрылись, очистились отъ льда и разлились какъ весною. — Продолженіе этой почти повсемѣстной оттепели въ Январѣ было различно; въ сѣверныхъ мѣстностяхъ уже съ 16 Января вновь наступили морозы; въ Ярославской губерніи термометръ опять опустился въ этотъ день до  $-16^{\circ}$  и такъ держался до послѣднихъ чиселъ мѣсяца, поднявшись только однажды вновь до  $+2^{\circ}$  (27 Января); въ С.-Петербургской губерніи легкіе морозы отъ  $-6^{\circ}$  до  $-10^{\circ}$  вновь начались съ 18, въ Симбирской, Калужской и Кіевской отъ  $-5^{\circ}$  до  $-10^{\circ}$  съ 20 Января, вмѣстѣ съ тѣмъ въ послѣдней выпало много снѣгу и вновь установился санный путь; въ Ставропольской губерніи морозы опять явились съ 22 Января, при чемъ стали рѣки этой губерніи; въ Вольнской съ 24 Января холодъ доходилъ до  $-15^{\circ}$ , въ Харьковской съ 25-го до  $-10^{\circ}$ , въ Иркутской до  $-28^{\circ}$  и въ Псковской съ 26 Января до  $-15^{\circ}$ .

Зима въ продолженіи Февраля держалась довольно постоянно; за исключеніемъ нѣсколькихъ дней въ средней трети его, въ продолженіи которыхъ были непродол-



жительныя оттепели въ губерніяхъ средней и южной полосы, остальная часть мѣсяца сопровождалась постоянными, мѣстами сильными, морозами.

Отъ 1 до 10 Февраля холодъ доходилъ

- |           |   |
|-----------|---|
| до — 32°  | въ Кяхтѣ,   |
| » — 30°   | » Ярославской губерніи (отъ 1 до 4 Февраля),  |
| » — 27°   | » Тамбовской и Полтавской губерніяхъ,   |
| » — 23°   | » Архангельской губерніи (6 Февраля),   |
| » — 22°   | » Псковской и С.-Петербургской,   |
| » — 20°   | » Калужской, Черниговской (6 и 7 Февраля) и Тверской (отъ 1 до 8 Февраля) губерніи, |
| » — 19°   | » Минской и Астраханской,   |
| » — 16°   | » Симбирской и Гродненской,   |
| » — 15°   | » Смоленской,   |
| » — 14°   | » Лифляндской,  |
| » — 13°   | » Волынской (6 и 7 Февраля),  |
| » — 12°   | » Тифлиской,  |
| » — 11°,6 | » Одессѣ и южной части Херсонской губерніи.   |

10 и 11 числа начались оттепели въ Тверской, Гродненской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Курской, Волынской, Екатеринославской, Харьковской, Тамбовской и Херсонской губерніи, и въ области Бессарабской. Въ Одессѣ теплота воздуха въ это время доходила до + 8°; въ Тамбовской и Екатеринославской губерніяхъ падали сильные дожди, а въ Бессарабской области прошли рѣки. Съ 15 числа начались оттепели въ Саратовской, Астраханской (до + 6½°), Виленской и Ковенской губерніяхъ; съ 16 термометръ поднялся выше 0° въ С.-Петербургской губерніи и въ слѣдующіе затѣмъ 3 дня проходили по ней холодные дожди; съ 17 Февраля оттепель обнаружилась въ Черниговской и Псковской, съ 18 въ Ярославской (+ 5°) губерніи, гдѣ она сопровож-



далась сильнымъ дождемъ и держалась три дня сряду; наконецъ съ 19 Февраля оттепель началась въ Ставропольской губернии, въ которой до тѣхъ поръ, начиная съ 22 Января, продолжалась постоянная зимняя погода. Около 20 Февраля вновь наступили повсемѣстные морозы, продолжавшіеся постоянно вплоть до конца его и доходившіе до  $-28^{\circ}$  въ Тульской губернии,

»  $-27^{\circ}$  » Тамбовской,

»  $-22^{\circ}$  » Псковской,

»  $-21^{\circ}$  » Курской,

»  $-20^{\circ}$  » Черниговской и Орловской,

»  $-19^{\circ}$  » С.-Петербургской и Минской губернии,

»  $-18^{\circ}$  » Гродненской и Калужской губернии,

»  $-15^{\circ}$  » Волынской, Ярославской и Симбирской губернии,

»  $-12^{\circ}$  » Нижегородской и Саратовской губернии,

Въ Ставропольской губернии съ 26 Февраля также возвратились морозы.

Въ Мартѣ еще продолжалась зимняя погода на большей части протяженія Имперіи. Не только въ сѣверныхъ губерніяхъ держались въ теченіи его морозы, рѣдко ниже  $-10^{\circ}$  и по ночамъ иногда значительно усиливавшіеся, но даже въ средней и южной полосѣ мѣстами было холодно почти до самаго исхода мѣсяца. Въ губерніяхъ Ярославской, Владимірской, Вятской, Нижегородской, Казанской, Симбирской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Воронежской, Витебской, Саратовской, Астраханской и Полтавской весь Мартъ продолжались морозы, не уступавшіе Февральскимъ, иногда съ паденіемъ снѣга, мятелями и выюгами. Самое большее пониженіе термометра въ этомъ мѣсяцѣ доходило еще



- до — 20° въ губерніяхъ Смоленской и Тамбовской (въ началѣ Марта),
- » — 19° » Курской (17 Марта) и Ставропольской (14 Марта),
- » — 18° » С.-Петербургской (до 23 Марта), Харьковской (съ 12 до 28 Марта) и Ярославской (15 и 16 Марта),
- » — 17°,5 » Тульской (27 Марта),
- » — 16° » Минской (до 20 Марта) и Волынской (3 и 5 Марта),
- » — 15° » Черниговской (16 Марта), Калужской (отъ 1 до 10 и около 20 Марта) и Псковской (до 27 Марта),
- » — 14° » Симбирской
- » — 13° » Волынской } (15 Марта),
- » — 12° » Кіевской
- » — 10° » Херсонской (около 15 Марта).

До половины этого мѣсяца вообще оттепели были рѣдки и ограничивались небольшими протяженіями, такъ въ началѣ его была оттепель въ Тульской, Архангельской и Псковской губерніяхъ, 5, 9 и 11 числа въ С.-Петербургской, 9-го же въ Тверской (+ 5°) и Харьковской (+ 3°) и 10 въ Волынской губерніи (до + 4°). Но при новомъ усиленіи морозовъ эти кратковременныя оттепели не влекли за собою никакихъ послѣдствій; только въ Харьковской губерніи отъ проливныхъ дождей, сопровождавшихъ оттепель 10 и 11 Марта, вновь вскрылись небольшія рѣчки. 12 Марта послѣ нѣскольконедельной оттепели, при туманахъ и сырости и влажномъ воздухѣ, прошелъ Діфпръ въ Екатеринославской губерніи, а съ 15 наступило совершенно теплое время въ Гродненской губерніи и при + 10° рѣчки прошли во второй разъ. Съ этого же времени начался оттепели въ Орловской губерніи, но 20 Марта вновь былъ въ ней морозъ съ силь-



ною выгою, отъ которой нѣсколько человѣкъ замерзли въ поляхъ и по дорогамъ. Въ этотъ самый день ночью въ Вольнской губерніи было еще  $-10^{\circ}$  и въ Кіевской  $-8^{\circ}$ . Съ 21 Марта температура воздуха, разогрѣваемая весеннимъ солнцемъ, начала повсемѣстно дѣлаться теплѣе и на сѣверѣ въ губерніяхъ Тобольской, Пермской и Томской обнаружился оттепели, въ Иркутской произошла Ангора вслѣдствіе предшествовавшихъ дождей. Въ средней и южной полосѣ вездѣ обнаруживалось вліяніе пробуждавшейся весенней теплоты: 22 Марта въ Курской губерніи термометръ показывалъ въ тѣни до  $+4^{\circ}$ , 23 въ Одессѣ въ это же время было уже  $+14^{\circ}$ ; 24 Марта прошла Десна въ Черниговской губерніи, въ С.-Петербургѣ днемъ было  $+7^{\circ}$ , но ночью еще  $-2^{\circ}$ ; въ Кіевѣ, гдѣ еще за три дня былъ морозъ до  $-7^{\circ}$  и продолжалась санныя дорога, 24 Марта термометръ показывалъ въ тѣни  $+11^{\circ}$ , а на другой день  $+14^{\circ}$ ; 25 Марта былъ первый весенній дождь въ Тверской губерніи и первый совершенно теплый день въ Астрахани; — 26 чрезъ Вольнскую губернію пронеслась буря съ дождемъ и молніей, послѣ которой вскрылись рѣки; въ тотъ же день прошелъ Дибръ въ Кіевѣ и въ Орловской губерніи началъ первый весенній дождь. 27 Марта вскрылись рѣки въ Воронежской, 28 прошла Аа въ Курляндской, 29 рѣки въ Минской, 30 Аа и 31 Двина въ Лифляндской губерніи. Въ послѣднихъ дняхъ Марта наступили весеннія оттепели въ Псковской, Владимірской, Тверской, Ярославской, Нижегородской, Казанской и Симбирской губерніяхъ, при чемъ впрочемъ не прекращались утренники отъ  $-2^{\circ}$  до  $-7^{\circ}$ . — 31 Марта около 5 часовъ утра въ разныхъ мѣстахъ Иркутска ощущалось землетрясеніе.

Апрѣль отличался повсемѣстно сырою и холодною погодою; на бѣльшемъ протяженіи Имперіи еще продолжались утренники, и даже на югѣ ночи сдѣлались



прохладны, съ обильными холодными росами. Мѣстами возвратились морозы, не прекращавшіеся и днемъ; отъ того бѣльшая часть рѣкъ оставалась покрытыми льдомъ до второй половины этого мѣсяца, при томъ во многихъ мѣстахъ еще падалъ снѣгъ и удерживалась санныя дорога. Въ началѣ Апрѣля въ Курской губерніи было нѣсколько морозовъ, доходившихъ по ночамъ до  $-17^{\circ}$ , въ Тульской и Тамбовской до  $-15^{\circ}$ , въ губерніяхъ Ярославской, Тверской, Смоленской, Нижегородской и сопредѣльныхъ съ ними постоянно держались утренники, мѣстами вплоть до 15 Апрѣля, иногда даже до  $-6^{\circ}$ . Въ С.-Петербургской губерніи до 12 Апрѣля теплота воздуха въ полдень не возвышалась болѣе  $+2^{\circ}$ , по утрамъ же и вечерамъ термометръ упadalъ до точки замерзанія, а по ночамъ продолжались морозы около  $-5^{\circ}$ . Въ Калужской и сосѣднихъ съ нею губерніяхъ до 10 Апрѣля при постоянно ясной погодѣ по утрамъ продолжались морозы до  $-3^{\circ}$ ; легкіе ночные холода до  $-2^{\circ}$  держались также въ Курляндской, Лифляндской, Гродненской и Минской губерніяхъ до 12 Апрѣля. Въ Нижегородской санный путь стоялъ еще въ началѣ Апрѣля и оттепелей почти не было. — Въ южныхъ частяхъ Имперіи первая половина Апрѣля также была холодна; термометръ днемъ рѣдко поднимался выше  $+8^{\circ}$  въ Таврической и Астраханской и  $+5^{\circ}$  въ Волынской, Кіевской, Полтавской и Черниговской губерніяхъ и области Бессарабской, а иногда и тамъ еще опускался ниже точки замерзанія; съ 7 на 8 Апрѣля въ Черниговской и Волынской губерніяхъ былъ морозъ въ  $-2^{\circ}$ , а 9 числа онъ дошелъ до  $-3^{\circ}$ , въ то же время въ Одессѣ и въ Екатеринославской губерніи термометръ показывалъ  $-2^{\circ}$ . 10 Апрѣля морозъ въ  $-3^{\circ}$  держался въ Черниговской, Волынской и Полтавской губерніяхъ; въ Воронежской въ эти дни по утрамъ и вечерамъ термометръ опускался ниже 0. Въ то же время въ



Ярославской губернии показались вновь утренние морозы до  $-6^{\circ}$ , державшіеся до 15 числа. При такомъ состояніи температуры воздуха въ Апрѣлѣ нерѣдко шелъ снѣгъ: въ первой половинѣ мѣсяца — въ Ярославской, Иркутской, Олонецкой, Гродненской, Нижегородской и Симбирской губерніяхъ; 7 Апрѣля онъ падалъ на всемъ протяженіи Курляндской и Эстляндской губерній, 8 въ Киевской и Волынской, 9 вновь въ послѣдней и сверхъ того въ Полтавской, Ставропольской и Ярославской губерніяхъ съ сильнымъ мятелью, а 10, 11 и 12 Апрѣля въ Симбирской губернии. Вообще этотъ снѣгъ скоро стаялъ, но количество его было такъ обильно, что въ Волынской губернии земля была покрыта имъ на 2, а въ Киевской на 4 вершка. Послѣ 15 Апрѣля мокрый снѣгъ еще нѣсколько разъ шелъ на большихъ протяженіяхъ въ Нижегородской губернии, и въ ночи на 23 выпало въ Архангельской губернии много снѣгу, скоро стаявшаго.

При такихъ атмосферическихъ условіяхъ необходимо должно было замедляться развитіе весенней теплоты воздуха. Хотя мѣстами, какъ то въ Полтавской, Владимирской, Киевской, Оренбургской, Саратовской, Таврической, Симбирской, Новгородской, Орловской, Черниговской, Тамбовской и Витебской между 15 и 20 и наступили теплые дни, такъ что температура воздуха въ полдень доходила въ тѣни до  $+17^{\circ}$ , но и въ этихъ губерніяхъ ночи еще нерѣдко были прохладны и сыры отъ обильныхъ холодныхъ росъ. Въ большей же части протяженія Имперіи воздухъ оставался холоднымъ почти до конца Апрѣля; такъ въ Бессарабской области и губерніяхъ Подольской, Гродненской, Астраханской, Московской, Тверской, Калужской, Смоленской, Волынской, С.-Петербургской, Псковской, Тульской, Нижегородской, Казанской, Ярославской, Олонецкой, Архангельской, Томской, Тобольской и Иркутской. Въ Смоленской гу-



бернии только послѣ 15 Апрѣля началъ таять снѣгъ; въ Волынской еще 19, 24 и 27 Апрѣля термометръ показывалъ только  $+5^{\circ}$ , въ Иркутской  $+4^{\circ}$ , въ Гродненской перѣдко  $+3$ ; въ С.-Петербургской 27 и 28 Апрѣля утромъ былъ морозъ  $-1^{\circ}$ , въ Ярославской 30  $-2^{\circ}$ , а въ Томской отъ половины до конца Апрѣля нѣсколько разъ термометръ показывалъ  $-5^{\circ}$ . Притомъ безпрестанно падали дожди по большей части холодные, иногда съ мокрымъ снѣгомъ, и поддерживали влажный холодъ въ воздухѣ. Они особенно обильны были въ губерніяхъ: Олонецкой, Новгородской, Исковской, Ковенской, Гродненской, Витебской, Эстляндской, Томской, Иркутской, Казанской, Нижегородской, Московской, Орловской, Калужской, Воронежской, Полтавской, Харьковской, Черниговской, Волынской, Херсонской, Тифлиской и Ставропольской. — Грозъ до 15 Апрѣля вовсе не было; въ этотъ день первая сильная гроза съ громомъ и молніей была въ Минской и въ Тверской губерніи; въ этотъ же день шелъ первый весенній дождь въ Архангельской губерніи; 16 Апрѣля былъ громъ во время дождя въ Ярославской губерніи; 20 падалъ сильный градъ и былъ слышенъ громъ въ Волынской губерніи, 21 громъ былъ въ первый разъ въ Черниговской и Гродненской губерніяхъ и 22 — въ С.-Петербургѣ, при чемъ термометръ на короткое время поднялся до  $+18^{\circ}$ ; 23 была сильная гроза съ громомъ и молніей въ Кіевской и 29 былъ громъ въ Барнаулѣ Томской губерніи. 30 Апрѣля пошелъ первый теплый дождь въ Иркутской губерніи. Въ Ставропольской съ 15 Апрѣля начались особенно сильныя грозы съ порывистымъ вѣтромъ, вырывавшимъ деревья съ корнями.

Рѣки вскрывались въ Апрѣлѣ въ слѣдующемъ порядкѣ:



- 4 Апрѣля прошла Двина въ Витебской губерніи (9-ю днями позднѣе, чѣмъ въ 1855 году),
- 5       »       прошла Ока въ Калужской губерніи (21-мъ днемъ позднѣе),
- 6       »       Нѣманъ въ Ковенской губерніи (22-мя днями позднѣе),
- 7       »       вскрылись рѣки въ Псковской губерніи,
- 8       »       Цна въ Тамбовской губерніи (10-ю днями позднѣе),
- 11       »       Вологда, Сухона и другія рѣки въ Вологодской губерніи (7-ю днями позднѣе),
- 14       »       Ока и Волга въ Нижегородской и рѣки въ Оренбургской и Владимирской губерніяхъ (16-ю днями позднѣе),
- 15       »       Москва и Ока въ Московской и Рязанской губерніяхъ (15-ю и 21-мъ днемъ позднѣе),
- 16       »       Волга въ Ярославской и Саратовской (14-ю днями позднѣе) и Обь въ Алтайскомъ округѣ Томской губерніи,
- 18       »       Сура и Свіяга въ Симбирской губерніи (25-ю днями позднѣе),
- 19       »       Нева въ С.-Петербургской (11-ю днями позднѣе), и рѣки въ Смоленской губерніи,
- 20       »       Кама и Волга въ Казанской, Волга въ Симбирской губерніяхъ, (24-мя днями позднѣе),
- 22       »       Кама въ Елабужскомъ уѣздѣ Вят-



ской губерніи (18-ю днями позднѣе),  
 къ 26 » прошли рѣки въ Яранскомъ, Ур-  
 жумскомъ, Малмыжскомъ и Сара-  
 пульскомъ уѣздахъ Вятской гу-  
 берніи,  
 между 20 и 30-мъ » прошли рѣки въ Тобольской гу-  
 берніи вездѣ, кромѣ Березовскаго  
 края, и вскрылось озеро Солигеръ  
 въ Тверской губерніи.

Двина въ Архангельской губерніи вскрылась толь-  
 ко 7 Мая при сильномъ дождѣ и чувствительномъ хо-  
 лодѣ, 24-мя днями позднѣе, чѣмъ въ 1855 году; и толь-  
 ко къ 10 Мая прошли рѣки въ Котельническомъ, Нолин-  
 скомъ, Орловскомъ, Витекомъ и Слободскомъ уѣздахъ  
 Вятской губерніи.

Май отличался теплою погодою въ южныхъ частяхъ  
 Имперіи; въ области Бессарабской и въ губерніяхъ По-  
 дольской, Вольнской, Кіевской, Черниговской, Херсон-  
 ской, Харьковской, Екатеринославской, Воронежской,  
 Тамбовской, Таврической, Ставропольской и Тифлиской  
 постоянно стояла теплая и нерѣдко жаркая погода, из-  
 рѣдка охлаждаемая дождями и грозами. На короткое  
 время по ночамъ и утратамъ термометръ упалъ до  $+ 8^{\circ}$   
 въ Таврической, до  $+ 6^{\circ}$  въ Вольнской, до  $+ 5^{\circ}$  въ Чер-  
 ниговской, до  $+ 4^{\circ}, 6$  въ Херсонской, до  $+ 3$  въ Тамбов-  
 ской и однажды въ Вольнской и въ Курской до  $+ 0^{\circ}, 6$  (7  
 Мая). Но въ губерніяхъ сѣверныхъ Май былъ еще хо-  
 лоденъ и сыръ; въ Архангельской въ продолженіи его  
 часто еще падалъ мокрый снѣгъ и потому особенно пер-  
 вая половина мѣсяца сопровождалась чувствительнымъ  
 холодомъ какъ въ ней, такъ и въ Олонецкой, Новгород-  
 ской, Псковской, Смоленской, Лифляндской, Курлянд-  
 ской, Эстляндской, Виленской, Гродненской, Ковенской



и Минской губерніяхъ. Въ Сибири, въ Иркутской губерніи, послѣ нѣсколькихъ весьма теплыхъ дней, выпало много снѣгу 7 и 8 Мая и погода вновь сдѣлалась холодная; въ Томскомъ округѣ также перѣдко шелъ въ это время снѣгъ и въ послѣдній разъ еще 15 Мая; притомъ воздухъ былъ сыръ и холоденъ, до 18 числа термометръ днемъ показывалъ только  $+8^{\circ}$ , а ночью бывали морозы отъ  $-2^{\circ}$  до  $-4^{\circ}$ , въ Алтайскомъ округѣ также было холодно и ненастно. Такое пониженіе температуры не могло оставаться безъ вліянія на сопредѣльныя губерніи: въ Вятской и Пермской ночи были постоянно холодны и дни прохладны, въ Казанской — еще послѣ 15 числа было нѣсколько легкихъ морозовъ, въ Пензенской, за исключеніемъ нѣсколькихъ дней въ началѣ, весь мѣсяцъ былъ холоденъ и сыръ. Въ губерніяхъ Ярославской, Костромской, Владимірской, Тверской, Орловской, Калужской, Московской, Нижегородской, Рязанской, С.-Петербургской, Симбирской и Тульской въ Маѣ съ самаго начала были постоянно теплые и даже жаркіе (до  $+20^{\circ}$ ,  $+22^{\circ}$  и  $+23^{\circ}$ ) дни, а во второй половинѣ его погода сдѣлалась болѣе непостоянною и температура воздуха значительно охладилась.

Дожди въ продолженіи Мая падали часто въ губерніяхъ Архангельской, Олонецкой, Томской, Ярославской, Псковской, Тверской, Новгородской, Московской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Гродненской, Впленской, Эстляндской, Лифляндской, Тульской, Курской, Харьковской, Кіевской, Черниговской, Волынской, Таврической, Тамбовской, Симбирской, Самарской, Казанской и Иркутской. Грозы были рѣдки: громъ былъ слышенъ 4 Мая въ С.-Петербургской и 5 въ первый разъ въ Курской губерніи; градъ былъ однажды — въ Воронежской губерніи; значительныя грозы были 12 и 24 въ Симбирской и 25 въ Волынской губерніи,



гдѣ разразилась въ этотъ день страшная буря съ громомъ, вырывавшая деревья съ корнями и продолжавшаяся нѣсколько часовъ сряду; незначительныя грозы проходили изрѣдка по Курской и Курляндской губерніямъ.

Отъ большихъ снѣговъ зимою и обильныхъ дождей въ продолженіи весеннихъ мѣсяцевъ разливъ водъ былъ необыкновенно великъ, преимущественно въ восточной части Имперіи, именно въ губерніяхъ Ярославской, Вологодской, Вятской, Тобольской, Томской, Казанской, Симбирской, Самарской, Оренбургской, Астраханской, Саратовской, Тамбовской, Воронежской и Екатеринославской. Рѣки разливались на такія протяженія, какъ никто не запомнить и притомъ медленно и продолжительно, такъ что затопленные мѣста оставались весьма долго подъ водою. Въ Симбирской губерніи вода въ Волгѣ достигла небывалой высоты — 39 футовъ; въ Астрахани разливъ ея былъ на 7 футовъ выше обыкновеннаго; вода затопила самую населенную часть города и стояла въ продолженіи 2-хъ недѣль на 1 — 1½ аршина выше уровня улицъ. Въ Екатеринославской губерніи въ Ростовскомъ уѣздѣ Донъ разлился на 8 верстъ въ ширину. Подобныхъ же давно небывалыхъ размѣровъ достигало разлитіе рѣкъ въ Сибири, особенно Оби и Иртыша, — затопленные ими пространства стояли подъ водою до Іюля. Такое значительное разлитіе рѣкъ въ Сибири и губерніяхъ, сосредѣленныхъ съ нею, составляетъ собою дополнительное явленіе къ замѣченному повсемѣстно въ Азіи неслыханному поноводію, которымъ отличался 1856 годъ. Изъ прочихъ частей Имперіи разлитіе рѣкъ было велико въ Московской и сѣверной части Новгородской губерніи, умеренно — въ Бессарабской области и губерніяхъ Пензенской и Орловской, и мало — въ остальныхъ частяхъ Имперіи, особенно въ западной полосѣ и притомъ въ губерніяхъ




Волынской, Витебской и Минской, а также въ Рязанской и Харьковской губерніяхъ.

Кратковременная отъ поздняго наступленія теплаго времени и притомъ сырая и прохладная весна смѣнилась лѣтнею погодою, наступившею повсемѣстно съ Іюня. Начало этого мѣсяца сопровождалось теплою, благорас-творенною, мѣстами даже жаркою погодою, но при обиль-ныхъ дождяхъ, усилившихся особенно съ половины его, вновь и почти повсемѣстно послѣдовало быстрое охлаж-деніе температуры воздуха. Тогда, какъ въ началѣ Іюня дневная теплота въ полдень достигала уже:

- + 30° въ Ярославской,
- + 28° » Псковской, Тобольской,
- + 27° » Черниговской, Волынской, Тамбовской,
- + 26° » Томской, Минской, Владимірской и С.-Петер-бургской,
- + 25° » Нижегородской, Кіевской, Херсонской, Туль-ской, Вятской, Казанской,
- + 24°,5 » Курской, Калужской, Симбирской, Гроднен-ской и др.,

во второй половинѣ Іюня термометръ вновь упалъ до + 10° и даже мѣстамъ + 6°. Тоже самое замѣчалось и въ Іюль: жаркіе дни въ продолженіи его смѣнялись не-рѣдко холодными ночами и послѣ теплой погоды опять наступалъ на нѣсколько дней сряду пронзительный хо-лодъ. Повсемѣстное охлажденіе температуры въ Іюль послѣдовало съ 20 числа. Въ общемъ выводѣ лѣтомъ 1856 года жаркихъ дней было весьма мало; несравненно болѣе холодныхъ и сырыхъ. И на югѣ это время года было прохладнѣе обыкновеннаго; при общей засухѣ въ Ставропольской губерніи высшая теплота воздуха въ тѣ-ни доходила до + 28°, — въ Тифлисѣ до + 30° въ Іюнѣ и Іюль и только до + 25° въ Августѣ; въ остальныхъ же южныхъ губерніяхъ такихъ жаровъ не было. Въ Астраханской губерніи





ханской только однажды термометръ показывалъ  $-1-28^{\circ}$ , высшая же средняя температура Іюня и Іюля была  $+22^{\circ}$ , и только въ Августѣ доходила до  $+26^{\circ}$ ; въ Саратовской губерніи въ первой половинѣ Іюня были жары, но менѣе обыкновенныхъ, а затѣмъ наступила холодная и дождливая погода, продолжавшаяся съ малыми исключеніями до конца Іюля, когда тамъ наступили уже утренники, продолжавшіеся при дождливой погодѣ и въ Августѣ. Въ Таврической губерніи Іюнь прошелъ въ непрерывныхъ дождяхъ охлаждавшихъ температуру воздуха и только въ Іюлѣ наступило совершенно теплое лѣто, съ возвышеніемъ температуры до  $+28^{\circ}$ , что продолжалось и въ Августѣ. Въ Херсонской губерніи погода лѣтомъ была непостоянна: температура воздуха колебалась между  $+24^{\circ}$ , 4 и  $+7^{\circ}$ , 4 въ Іюлѣ и  $+24^{\circ}$ , 6 и  $+3^{\circ}$ , 2 въ Августѣ. Въ Подольской губерніи и Бессарабской области въ первую половину лѣта было много холодныхъ и дождливыхъ дней и теплое время наступило поздно, особенно въ сѣверной ихъ части. Въ Кіевской губерніи въ концѣ Іюня, при облачной, пасмурной и дождливой погодѣ, утра и ночи были очень прохладны, въ Іюлѣ же и Августѣ хотя и было постоянно тепло, но жаркихъ дней вовсе не было. Въ Волынской въ Іюлѣ и Августѣ дневная теплота по большей части равнялась  $+14^{\circ}$  или  $+15^{\circ}$ , рѣдко доходила до  $+24^{\circ}$ , но притомъ довольно часто опускалась въ Іюлѣ до  $+10^{\circ}$ ,  $+9^{\circ}$ ,  $+8^{\circ}$  и  $+7^{\circ}$ , а въ Августѣ до  $+7^{\circ}$   $+5^{\circ}$ ,  $+4^{\circ}$  и  $+3^{\circ}$ ; притомъ въ продолженіи трехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ было въ ней до 37 дождливыхъ дней. Въ губерніяхъ: Полтавской, Харьковской, Черниговской и Тамбовской лѣто было менѣе теплое, чѣмъ обыкновенно; дневная теплота, доходившая въ Іюнѣ и Іюлѣ до  $+22^{\circ}$  и  $+24^{\circ}$ , нерѣдко упала до  $+9^{\circ}$ ,  $+7^{\circ}$  и  $+6^{\circ}$ , по утрамъ и вечерамъ часто были обильныя росы и въ двухъ послѣднихъ губерніяхъ было много дождливыхъ дней. Въ



Воронежской губернии при постоянной засухѣ и въ Кур-ской при частыхъ обильныхъ дождяхъ лѣто было такъ холодно, какъ никто не запомнить; почти во все продол-женіе его господствовали сѣверный вѣтеръ, термометръ съ  $+24^{\circ}$  упалъ въ Іюль до  $+5^{\circ}$  и въ половинѣ Августа до  $+1^{\circ}7$ , при чемъ по ночамъ показывался холодный иней и наступала холодная и сырая погода, продолжав-шаяся по нѣскольку дней сряду. Въ средней и сѣверной полосѣ Имперіи лѣто было также непостоянно, холодно и сыро. Не смотря на засуху до половины Іюля, въ Мос-ковской, Орловской, Рязанской и Тульской губерніяхъ жаркихъ дней лѣтомъ вовсе не было; высшая теплота въ тѣни не доходила болѣе  $+22^{\circ}$ , а вечера и ночи были нерѣдко холодны, особенно во второй половинѣ Іюля и въ Августѣ, при наступленіи проливныхъ дождей. Въ Орловской губерніи въ концѣ Іюля уже начались утрен-ніе морозы, повторившіеся три раза и въ Августѣ. Въ Рязанской губерніи засуха продолжалась до 30 Іюня, съ этого времени начались дожди, какихъ никто не запо-мнить, и продолжались всю остальную часть лѣта и осень. Въ Калужской, при ясной и сухой погодѣ въ Іюль выс-шее стояніе термометра было до  $+23^{\circ}$ , но съ 20 нача-лись непрерывные дожди, продолжавшіеся весь Августъ почти ежедневно, при чемъ температура воздуха не была уже выше  $+19^{\circ}$  въ полдень, а по вечерамъ опускалась часто до  $+7^{\circ}$  и  $5^{\circ}$  въ Іюль и  $+5^{\circ}$  и  $+3^{\circ}$  въ Августѣ. Въ Смоленской, Тверской, Новгородской и Псковской гу-берніяхъ первая половина лѣта, за исключеніемъ немно-гихъ жаркихъ дней отъ конца Іюня до 15 Іюля, была прохладна, съ этого же времени наступили частые силь-ные дожди и сырой холодъ, особенно по ночамъ, что продолжалось и въ Августѣ. Въ Могилевской и Витеб-ской губерніяхъ лѣто было вообще прохладно, а съ по-ловины Іюля начались также дожди и холода, въ концѣ



же этого мѣсяца наступили легкіе ночные морозы, повторявшіеся перѣдко и въ Августѣ; въ губерніяхъ: Ковенской, Виленской, Гродненской, Минской, Лифляндской, Курляндской и Эстляндской жаркихъ и ясныхъ дней лѣтомъ было мало, вечера и ночи были прохладны и сыры, и болѣе  $\frac{1}{3}$  было дождливыхъ дней. Въ Минской губерніи со 2 на 3 Августа былъ первый морозъ и въ концѣ мѣсяца цѣлую недѣлю продолжались утренники. Въ Гродненской губерніи во второй половинѣ Августа наступила вновь ясная и теплая погода до  $+22^{\circ}$ , по ночью термометръ опускался обыкновенно до  $+4^{\circ}$ . Въ С.-Петербургской, Олонецкой, Архангельской, Вологодской и Ярославской губерніяхъ теплое время продолжалось съ 1 до 18 Іюня; при ясной солнечной погодѣ температура полдня доходила до  $+28^{\circ}$  и  $+30^{\circ}$ , и большую часть дня держалась около  $+20^{\circ}$ ; съ 19 же числа послѣ грозъ и дождей сдѣлалось холоднѣе, иногда только  $+7^{\circ}$ , но въ концѣ Іюня опять наступило тепло, продолжавшееся до 21, съ этого времени сдѣлалось пасмурно и не постоянно, термометръ рѣдко показывалъ болѣе  $+10^{\circ}$ , а по вечерамъ опускался до  $+6^{\circ}$ . Въ Архангельской губерніи въ это время показались уже ночные морозы, отъ которыхъ померзъ хлѣбъ; въ Августѣ опять сдѣлалось нѣсколько теплѣе, температура воздуха колебалась между  $+15$  и  $+9^{\circ}$ , опускаясь иногда до  $+5^{\circ}$ ,  $+2^{\circ}$  и  $+1^{\circ}$ . Съ 16 Августа начались морозы въ Ярославской и Олонецкой губерніяхъ и 20 ночью при тихомъ туманѣ они дошли до  $-4^{\circ}$ , въ концѣ Августа они смѣнились ненастьемъ и осеннею погодою. Въ Вятской, Костромской, Владимірской, Пензенской, Симбирской, Оренбургской и Самарской губерніяхъ лѣто было непостоянно, прохладно и дождливо; жаркихъ дней было немного; съ половины Іюня въ Вятской, съ начала Іюля во Владимірской, съ 15 въ Пензенской и Симбирской губерніяхъ на-



чались проливные дожди, понижавшіе температуру до того, что въ полдень было не болѣе  $+13^{\circ}$ , а вечеромъ и ночью  $+5^{\circ}$ ; въ Августѣ сдѣлалось нѣсколько теплѣе, термометръ показывалъ иногда въ полдень до  $+20^{\circ}$ , но съ 20 числа температура воздуха вновь понизилась до  $+12^{\circ}$  въ полдень и отъ  $+7^{\circ}$  до  $+5^{\circ}$  по утрамъ. Въ Самарской губерніи 21 Августа былъ первый морозъ. Въ Оренбургской губерніи въ сѣверозападной полосѣ падали непрерывно холодные, а въ югозападной теплые дожди. Въ Казанской губерніи до 15 Іюля дни были знойны и ясны, а ночи прохладны, съ 15 начались дожди и продолжались весь Августъ. Въ Нижегородской и Екатеринославской губерніяхъ лѣто стояло теплое, сухое съ рѣдкими дождями, вплоть до половины Августа.

Въ Сибири теплое, но непостоянное лѣто было въ Иркутской губерніи; жары начались съ Іюля и въ полдень на солнцѣ термометръ поднимался до  $+36^{\circ}$ , но отъ времени до времени воздухъ охлаждался частыми бурями и грозами, въ Августѣ же почти ежедневно шелъ сильный дождь съ порывистымъ вѣтромъ и по утрамъ и вечерамъ термометръ показывалъ не болѣе  $+4^{\circ}$  и даже  $+2^{\circ}$ . Въ остальныхъ же частяхъ Азіятской Россіи лѣтомъ стояла мрачная, холодная и дождливая погода; въ Тобольской губерніи едва насчитывали 18 теплыхъ дней, въ которые термометръ въ тѣни показывалъ  $+28^{\circ}$ ; въ Томской губерніи стояла холодная погода, въ Іюнѣ и Іюлѣ въ Алтайскомъ и въ Августѣ въ Томскомъ округѣ; здѣсь въ продолженіи этого мѣсяца термометръ по ночамъ рѣдко поднимался выше  $+4^{\circ}$ , а иногда опускался до  $-2^{\circ}$  и  $-3^{\circ}$  отъ частаго и обильнаго паденія снѣга на сосѣднихъ горахъ.

При такомъ общемъ характерѣ лѣта грозы въ продолженіи его были особенно рѣдки: во всей южной и большей части средней полосы, за исключеніемъ Чер-



ниговской и сѣверной части Херсонской губерніи, во все лѣто не было ни одной грозы и громъ слышался лишь нѣсколько разъ. Изрѣдка встрѣчались они тоже въ губерніяхъ: Псковской, Смоленской, Ярославской, Витебской, Гродненской, Эстляндской и Ковенской; нѣсколько чаще въ Казанской, Нижегородской и Симбирской (5 разъ между 10 и 15 Іюля) и болѣе часто въ Иркутской губерніи, гдѣ въ послѣдній разъ лѣтомъ была гроза 29 Августа, и въ Кяхтинскомъ Градоначальствѣ, что тѣмъ болѣе замѣчательно, что въ томъ краю они принадлежатъ къ явленіямъ болѣе рѣдкимъ, чѣмъ въ средней и южной полосѣ Европейской части Имперіи. Быть можетъ это исключительное обстоятельство находилось въ связи съ землетрясеніемъ, обнаружившимся въ теченіи отчетнаго года однажды въ Иркутскѣ и 2 раза въ Кяхтѣ.

Грады падали иногда въ Иркутской, Томской, Вятской, Ярославской, Казанской, Симбирской, Смоленской, Воронежской, Псковской, Витебской, Гродненской и Минской губерніяхъ. 17 Іюня въ Великихъ Лукахъ Псковской губерніи была буря съ градомъ, доходившимъ до 13 золотниковъ вѣсу, выбивавшимъ стекла въ домахъ и убивавшимъ птицъ. Къ ночи буря эта пронеслась къ Пскову и тамъ продолжалась около 12 часовъ сряду, но безъ граду, ломая все, что встрѣчалось ей на пути. 24 Іюня въ Нижнеудинскомъ округѣ Иркутской губерніи былъ ужасный ураганъ съ градомъ въ курное яйцо, выбившимъ мѣстами хлѣбъ и овощи; порывистый вѣтеръ вырывалъ съ корнями деревья на цѣлыхъ десятинахъ и сносилъ крыши съ домовъ; цѣлыя стада скота были снесены въ рѣку и потонули.—Дожди падали лѣтомъ часто и вездѣ, кромѣ Екатеринославской, Воронежской, Ставропольской, Тифлисской, Иркутской, Нижегородской, Полтавской и южной части Херсонской губерніи.

Въ продолженіи сентябрю въ южной части Имперіи



погода стояла ясная, теплая и тихая; въ Бессарабской области и губерніяхъ Херсонской, Таврической, Ставропольской, Тифлиской, Кіевской, Харьковской, Волынской, Подольской, Орловской, Тульской, Курской, Черниговской, Тамбовской, Воронежской, Екатеринославской, и Полтавской термометръ поднимался нерѣдко до  $+25^{\circ}$  и по большей части держался на  $+20^{\circ}$ . Дожди шли въ губерніяхъ: Таврической, Волынской, Курской и Тамбовской, въ остальныхъ же погода стояла сухая. Грозы, бывшія особенно рѣдко въ продолженіи лѣта, проходили отъ времени до времени по Черниговской, Курской, и особенно часто Воронежской губерніи; послѣднія изъ нихъ были еще 20, 21, 22 и 23 Сентября. Въ остальныхъ частяхъ Имперіи погода въ Сентябрѣ стояла пасмурная, ненастная и дождливая и особенно въ губерніяхъ: Архангельской, С.-Петербургской, Тверской, Ярославской, Владимірской, Костромской, Смоленской, Московской, Лифляндской, Виленской, Гродненской, Эстляндской, Курляндской, Минской, Калужской, Рязанской, Нижегородской, Пензенской, Оренбургской и Саратовской; холодные, иногда проливные, дожди, шедшіе почти ежедневно, охлаждали температуру воздуха до того, что въ полдень термометръ рѣдко показывалъ болѣе  $+12^{\circ}$ , а по ночамъ опускался до  $+6^{\circ}$  и на сѣверѣ до  $+3^{\circ}$ ; такое охлажденіе температуры воздуха отъ холоднаго ненастья распространялось и въ сопредѣльныхъ губерніяхъ, въ которыхъ дожди шли рѣдко. И тамъ погода по большей части была сумрачная и туманная, термометръ рѣдко поднимался днемъ выше  $+10^{\circ}$ , а по ночамъ падалъ до  $+7^{\circ}$  и  $+5$ , за исключеніемъ немногихъ дней во второй трети Сентября, отличавшихся во всей средней и мѣстами въ сѣверной части Имперіи болѣе теплою погодою (отъ  $+15^{\circ}$  до  $+19$ ); въ Астраханской губерніи при сѣверозападномъ вѣтрѣ, дувшемъ почти



постоянно, температура воздуха въ Сентябрѣ рѣдко достигала  $+14^{\circ}$ , а большею частию держалась между  $+10^{\circ}$  и  $+12^{\circ}$ , тогда какъ обыкновенно въ это время года термометръ показываетъ тамъ въ тѣни отъ  $+28^{\circ}$  до  $+34^{\circ}$ . Въ Сибирскихъ губерніяхъ Сентябрь былъ дождливъ и холоденъ. Въ Томскомъ округѣ, съ 8 Сентября дождливая ненастная погода смѣнилась снѣгомъ и къ 15 началась морозы, дошедшіе въ концѣ этого мѣсяца до  $-5^{\circ}$ ; въ Иркутской губерніи снѣгъ началъ часто падать съ половины Сентября и холодъ по утрамъ скоро дошелъ до  $-6^{\circ}$ . Вліяніе такого рановременнаго наступленія зимней погоды прежде всего обнаружилось въ восточныхъ губерніяхъ Имперіи; послѣ 15 Сентября выпалъ снѣгъ сначала въ Казанской, затѣмъ въ Костромской губерніи при холодной и ненастной погодѣ; съ 20 Сентября сдѣлалось вездѣ значительно холоднѣе, такъ, что термометръ по утрамъ во многихъ мѣстахъ средней и сѣверной и въ восточной части южной полосы уже нерѣдко упалъ до  $+1^{\circ}$  и  $0^{\circ}$ ; на 25 Сентября выпалъ снѣгъ въ Архангельской губерніи; на 27 въ Оренбургской, между 28 и 30 въ Ярославской, Калужской, Тульской, Нижегородской, Симбирской, Тамбовской и Смоленской губерніяхъ. По большей части онъ быстро таялъ; въ одной только Ярославской губерніи оставался до начала Октября; въ Смоленской же лежалъ болѣе сутокъ, а въ Симбирской количество его было такъ велико, что нѣсколько дней свободно ѣздили на саняхъ, на поляхъ же остановились работы и много хлѣба и овощей осталось не снятымъ. Холодъ въ это время доходилъ:

- |                   |  |
|-------------------|--|
| до $+0^{\circ},3$ | въ Симбирской;   |
| » $-0^{\circ}$ ,  | » С.-Петербургской, Новгородской, Минской, Тульской, Калужской, Вольнской и Екатеринославской; |
| » $-0^{\circ},2$  | » Херсонской и въ Одессѣ;  |

до — 1°        въ Ярославской, Владимірской, Витебской,  
Тверской, Гродненской и Могилевской;  
отъ — 3° до — 5° » Смоленской и Воронежской;  
»        » — 4° » Черниговской;

еще значительнѣе были морозы въ Казанской и Оренбургской губерніяхъ, гдѣ въ это время мѣлкія рѣки уже покрылись льдомъ.

Въ первыхъ дняхъ Октября падалъ снѣгъ въ Тобольской, Вятской, Курляндской, Вологодской, Тверской, Саратовской, Воронежской и вновь въ Тамбовской и Смоленской губерніяхъ, но скоро стоялъ отъ оттепелей и проливныхъ дождей. Температура воздуха въ это время была весьма непостоянна: въ среднѣмъ Имперіи, какъ напр. въ Орловской губерніи стояло еще совершенно теплое время, продолжавшееся до 10 Октября, такъ, что всѣ деревья и кусты тамъ оставались въ свѣжей зелени, вплоть до морозовъ, наступившихъ только 15 Октября; изъ сопредѣльныхъ съ нею губерній въ тоже время термометръ показывалъ еще иногда въ полдень:

до + 17° 5 въ Тамбовской губерніи,  
» + 14° 7 » Тульской и  
» + 13°,3 » Курской; но въ другихъ мѣстахъ первая треть Октября была уже холоднѣе, — такъ въ полдень температура воздуха доходила только:  
до + 12°    въ Вольнской, Гродненской и Лифляндской губерніи,  
» + 11°,4 » Херсонской,  
» + 10°    » Черниговской, Минской и С.-Петербургской,  
» + 9°    » Кіевской,  
» + 6°    » Ярославской, Смоленской и Архангельской,  
» + 5°    » Калужской и Эстляндской,  
» + 2½    » Курляндской губерніи.

При томъ мѣстами по ночамъ термометръ нерѣдко опу-



скался до точки замерзанія и падалъ снѣгъ, не остававшійся долго на сырой не замерзшей землѣ; въ большей части восточной полосы отъ легкихъ морозовъ, нѣсколько дней сряду державшихся, и земля уже замерзала, но и тамъ падавшій въ это время снѣгъ скоро сходилъ отъ вновь наступавшихъ оттепелей и дождей. Съ такими перемѣнами осенняя погода продолжалась до половины Октября. Къ 14-му морозы показались почти вездѣ и притомъ сдѣлались продолжительнѣе и постояннѣе; въ этотъ самый день выпалъ большой снѣгъ въ южной полосѣ, именно въ Херсонской, Кіевской и Тифлисской губерніяхъ, но скоро сошелъ отъ наступившей затѣмъ кратковременной оттепели. 15 Октября падалъ снѣгъ на огромномъ протяженіи: по Тобольской, Архангельской, Ярославской, Смоленской, Калужской, Черниговской, Полтавской и Тамбовской губерніямъ въ такомъ количествѣ, что установилась садовая дорога, скоро впрочемъ исчезающая отъ дождей вездѣ, кромѣ Архангельской и Тобольской губерній. Между 20 и 28 Октября падалъ снѣгъ повсемѣстно и въ большомъ количествѣ въ остальныхъ губерніяхъ, за исключеніемъ Таврической, Ставропольской, Астраханской, Кіевской, Тульской, Рязанской, Нижегородской, Казанской, Воронежской и Екатеринославской. Морозы, съ половины Октября начавшіеся всюду, къ концу его доходили до — 14° въ Иркутской губерніи;

- » — 13° » С.-Петербургской;
- » — 12°,5 » Курляндской;
- » — 12°, » Орловской и Ярославской;
- » — 11°,5 » Курской;
- » — 11° » Псковской и Вологодской;
- » — 10°, » Тверской, Калужской, Симбирской, Лифляндской и Минской;
- » — 9° » Томской и Тамбовской;
- » — 8° » Гродненской и Тульской;

- до —  $7^{\circ}$  въ Нижегородской и Черниговской;
- » —  $6^{\circ},6$  » Херсонской;
- » —  $5^{\circ}$  » Волынской и Воронежской;
- » —  $1^{\circ},5$  » Кіевской;
- и » —  $1^{\circ}$  » Эстляндской.

При такихъ холодахъ 27 Октября стала Двина въ Архангельской губерніи, въ Ярославской 28 стала Волга; съ 28 на 29 замерзъ Солигеръ въ Тверской, 29 остановилась Нева въ С.-Петербургской, 30 Великая въ Псковской, Обь въ Алтайскомъ округѣ Томской, Ока въ Калужской, Волга въ Нижегородской и рѣки въ Орловской, Тульской и Тамбовской губерніяхъ.

Между тѣмъ съ 1 Ноября, и мѣстами еще съ 30 Октября, вновь началась почти повсемѣстно сильная оттепель и пошли дожди при  $+6^{\circ}$  и мѣстами  $+10^{\circ}$ ; снѣгъ всюду быстро согнало и даже вскрылись мѣстами только что ставшія рѣки, именно въ Тамбовской, Орловской, Тульской, Ярославской и Нижегородской губерніяхъ, а въ Воронежской въ это позднее время года вновь начались грозы; санная дорога, исчезнувшая вездѣ, удержалась только на сѣверѣ. Съ 4 Ноября морозы опять начались повсемѣстно и, быстро усиливаясь въ продолженіи слѣдующихъ трехъ недѣль, до 24 Ноября доходили:

- до —  $25^{\circ}$  въ Вологодской и Архангельской губерніяхъ;
- » —  $24^{\circ}$  » Тобольской и Томской;
- » —  $22^{\circ}$  » Минской;
- » —  $21^{\circ}$  » Иркутской;
- » —  $20^{\circ}$  » Ярославской, Костромской, Витебской и Вятской;
- » —  $18^{\circ}$  » Гродненской;
- » —  $16^{\circ}$  » Псковской;
- » —  $15^{\circ}$  » С.-Петербургской и Воронежской;
- » —  $14^{\circ},5$  » Тамбовской;
- » —  $14^{\circ}$  » Курской;



- до — 13° въ Тверской и Лифляндской;  
» — 12°,4 » Херсонской;  
» — 12° » Смоленской, Вольнской, Черниговской и  
Нижегородской;  
» — 10° » Симбирской, Казанской и Оренбургской;  
» — 9°,3 » Тульской;  
» — 7° » Киевской;  
» — 3° » Эстляндской.

Притомъ отъ часто падавшего съ 4 Ноября обильнаго снѣга въ продолженіи этого мѣсяца мало по малу вновь устанавливалась санная дорога вездѣ, за исключеніемъ Пензенской, Владимірской, Вятской, Орловской, Казанской, Саратовской, Воронежской, южной части Екатеринбургской, Харьковской, Подольской, Таврической, Ставропольской, Тифлисской губерній и области Бессарабской. Въ концѣ мѣсяца мѣстами начался даже сильныя снѣжныя выюги, среди которыхъ люди и животныя замерзали въ поляхъ, какъ это случилось 20 Ноября въ Киевской и 22 въ Черниговской губерніяхъ.

Призначительныхъ Ноябрьскихъ морозахъ стали рѣдки къ 5 числу въ Тобольской губерніи, къ 9 въ Черниговской, къ 10 въ Вятской, Симбирской и Саратовской, къ 12 въ Витебской, Минской, Гродненской, вновь въ Ярославской и Тульской, во Владимірской, Смоленской и Новгородской, къ 14 въ Киевской и Вольнской, къ 15 въ Екатеринбургской, вновь въ Тамбовской и Нижегородской, въ Воронежской и Ковенской, послѣ 15-го вездѣ въ остальныхъ губерніяхъ, кромѣ Таврической, Ставропольской, Тифлисской, Подольской и области Бессарабской. Между тѣмъ мѣстами вновь обнаруживались на короткое время оттепели и снѣгъ смѣнялся холоднымъ, иногда проливнымъ, дождемъ. 9 Ноября въ Алтайскомъ округѣ Томекой губерніи такой дождь шелъ цѣлый день, а за тѣмъ вновь наступили морозы; въ Курской губерніи оттепель

началась съ 12 Ноября и продолжалась при  $+6^{\circ},5$  и частомъ сильномъ дождѣ до 20 числа, съ котораго вновь наступили холода; въ Тульской губерніи 10 Ноября термометръ поднялся до  $+8^{\circ},2$ , а чрезъ два дня опять сдѣлалось холодно; въ Екатеринославской 17 Ноября при тепломъ южномъ вѣтрѣ наступила сильная оттепель и уже 19 исчезъ весь снѣгъ, вскрылся Днѣпръ и началась весенняя, умѣренно теплая и ясная погода. Въ Симбирской, Тамбовской и Воронежской губерніяхъ при частыхъ атмосферныхъ перемѣнахъ въ Ноябрѣ санный путь сходилъ нѣсколько разъ отъ дождей. Наконецъ въ послѣднихъ числахъ Ноября оттепель распространилась почти повсемѣстно, атмосфера сдѣлалась сырою и туманною, пошли дожди и во многихъ мѣстахъ рѣки вновь вскрылись и разлились, какъ весною. На 24 Ноября при юго-западномъ вѣтрѣ исчезъ санный путь и прошли рѣки въ Смоленской губерніи; съ 25 при  $+5^{\circ}$  — въ Минской, Курляндской, Виленской, Ковенской и Могилевской, при  $+7^{\circ}$  въ Гродненской и при  $+12^{\circ}$  въ Вольнской; 26 при  $+5^{\circ}$  въ Псковской, Владимірской, Тверской и Курской; около 28-го при  $+3^{\circ}$  въ Орловской, Калужской, Тульской, Нижегородской, Оренбургской, Симбирской, Саратовской, Тамбовской, Воронежской и 29 Ноября въ Витебской губерніи. Затѣмъ только въ Ярославской, Костромской, Вятской, С.-Петербургской, Новгородской и Вологодской губерніяхъ; не смотря на десятидневную оттепель въ тоже время, доходившую по  $+5^{\circ}$ , ледъ на рѣкахъ удержался; въ губерніяхъ же Архангельской, Олонецкой, Иркутской, Тобольской и Томской оттепели почти не было и весь Ноябрь продолжались морозы, съ сильными метелями и выюгами. При томъ за исключеніемъ этихъ губерній санный путь отъ сильныхъ дождей, начавшихся съ 24 Ноября, почти вездѣ сошелъ и поля обнажились отъ снѣга.



Въ Бессарабской области и губерніяхъ: Подольской, Таврической, Ставропольской и Тифлиской въ продолженіи всего мѣсяца стояло довольно теплое, ясное и сухое время, только въ Таврической губерніи довольно часто шли дожди и держались туманы; въ Ставропольской снѣгъ падалъ только однажды, 10 Ноября, при  $+ 2^{\circ}$ , а послѣ того было ясно и сухо: въ Тифлисѣ до конца Ноября термометръ держался между  $+ 12$  и  $+ 15^{\circ}$  и только по ночамъ атмосфера дѣлалась влажною и туманною.

Такимъ образомъ истекшій 1856 годъ характеризовался зимою раннею, въ началѣ и въ концѣ повсемѣстно и постоянно суровою, въ срединѣ же непостоянною и съ рѣзкими и внезапными переходами отъ суровыхъ холодовъ къ сырому и дождливому времени, притомъ долго продолжавшеюся; весною поздно наступившею, холодною, дождливою и сырою; лѣтомъ непостояннымъ отъ рѣзкихъ переходовъ къ холоду, въ большей же части продолженія своего холоднымъ, сырымъ, туманнымъ и дождливымъ; осенью продолжительною и непостоянною, притомъ то теплою и сырою, то съ суровыми морозами.

Таковой ходъ времени года почти повсемѣстно обнаруживалъ неблагопріятное вліяніе на растительность и урожай земныхъ произведеній. Отъ продолжительной зимы и поздняго наступленія весенняго времени, сопровождавшагося притомъ ночными морозами, холодными росами и дождями растительность вообще развивалась медленно и слабо. Въ среднелюсной и южной части Имперіи сильные зимніе морозы повредили садовымъ плодамъ: въ Подольской губерніи вымерзли абрикосы, персики, черешни и грецкій орѣхъ; всѣ виды фруктовыхъ деревьевъ пострадали въ Орловской, Черниговской, Волынской, Полтавской, Харьковской и Кіевской губерніяхъ. Такое же вліяніе имѣли весенніе холода: въ Астраханской губерніи первый цвѣтъ на персикахъ отъ нихъ

замерзъ; въ Бессарабской области виноградъ, листья плодовыхъ деревьевъ и зелень, вышедшіе въ Февралѣ, помертвѣли отъ утренниковъ, вновь начавшихся съ конца этого мѣсяца и продолжавшихся еще въ Мартѣ; въ Виленской, Ковенской, Могилевской, Курляндской и Гродненской губерніяхъ, равно какъ и въ большей части средней полосы Имперіи, весенними холодами былъ остановленъ цвѣтъ фруктовыхъ деревьевъ до того, что нѣкоторыя породы ихъ вовсе не цвѣли. Отъ весеннихъ холодовъ и овощи выходили медленно и слабо почти повсемѣстно. — Ранніе всходы хлѣбовъ были вездѣ хороши и обѣщали богатую жатву, но дальнѣйшее развитие ихъ замедлилось какъ отъ морозовъ, вновь наступившихъ весною, такъ и отъ холодовъ, показавшихся въ лѣтнюю пору. Въ Ярославской, Саратовской, Могилевской и Архангельской губерніяхъ въ Іюлѣ хлѣбъ большею частию померзъ и колосъ его оказался пустымъ или съ слабымъ наливомъ; въ Казанской — яровые мѣстами пропали отъ майскихъ морозовъ; отъ этой же причины въ Московской, Тульской, Калужской и Орловской губерніяхъ наливъ и созрѣваніе яровыхъ хлѣбовъ остановились и ослабѣли. Съ другой стороны мѣстами засуха, а въ другихъ мѣстахъ постоянно дождливая погода препятствовали своевременному созрѣванію хлѣбовъ и сообщили имъ дурныя свойства. Отъ холодныхъ дождей лѣтомъ хлѣбъ не дозрѣлъ и пострадалъ въ зернѣ въ сѣверозападной полосѣ Оренбургской, во Владимірской, Вятской, Подольской, Рязанской, Смоленской, Таврической, Московской и Калужской губерніяхъ; отъ засухъ урожай хлѣбовъ былъ скуденъ въ губерніяхъ Херсонской, Полтавской, Нижегородской, Астраханской, Орловской, Екатеринославской и Ставропольской, особенно въ Пятигорскомъ, Кизлярскомъ и Моздокскомъ уѣздахъ.

Въ общемъ выводѣ урожай хлѣбовъ былъ скуденъ



въ южной части Имперіи: въ Харьковской, Херсонской, Подольской, Полтавской, Астраханской, Таврической, Ставропольской и Екатеринославской губерніяхъ; изъ средней полосы: въ Орловской, Московской, Смоленской, Владимірской и Симбирской; на сѣверѣ: въ Олонецкой, Архангельской и Вятской, въ Сибири въ Иркутской губерніяхъ. Хорошимъ урожаемъ отличались губерніи: Томская, Тобольская, Пермская, Вологодская, Новгородская, Гродненская, Виленская, Ковенская, Курляндская, Минская, Вольнская, Тамбовская, Самарская и южная часть Оренбургской. Въ остальныхъ губерніяхъ урожаи были посредственный, именно при урожаѣ озимыхъ яровыя родились дурно въ Тверской, Костромской, Смоленской, Рязанской, Нижегородской, Казанской, Калужской, Тульской, Воронежской и Саратовской губерніяхъ; озимыя были скудны въ Кіевской и южной части Херсонской губернии и въ области Бессарабской; оба сорта хлѣбовъ родились посредственно въ С.-Петербургской, Псковской, Эстляндской, Лифляндской, Ярославской, Витебской, Могилевской и Черниговской. Огородныя овощи родились скудно, были водянисты и склонны къ скорой порчѣ вездѣ, кромѣ губерній: Ярославской, Самарской, Симбирской, Казанской, Саратовской, Гродненской, Ковенской, Виленской, Кіевской, Тамбовской, Московской, Тульской, Иркутской и области Бессарабской, гдѣ сборъ ихъ былъ довольно обиленъ и качества хорошаго. Болѣзнь на картофелѣ обнаруживалась въ Черниговской, Владимірской, Подольской, Пермской, мѣстами въ Виленской, Ковенской и въ слабой степени въ Курляндской губерніяхъ. Въ Могилевской онъ промерзъ въ землѣ въ Августѣ и Сентябрьѣ. Недостатокъ въ садовыхъ и полевыхъ плодахъ ощущался повсемѣстно; они или вовсе не родились отъ сильной стужи зимою и весеннихъ морозовъ, повредившихъ деревья и кустарники и уничтожив-

шихъ весенній цвѣтъ, или не дозрѣли отъ холоднаго и дождливаго лѣта. Даже на югѣ плодовъ въ истекшемъ году родилось мало и притомъ многіе изъ нихъ не имѣли надлежащаго вкуса; виноградъ въ одной Астраханской губерніи былъ очень хорошъ, въ Таврической же мѣстами уничтожился онъ плѣсенью отъ проливныхъ дождей, въ Бессарабской области промерзъ отъ рано наступившихъ морозовъ осенью 1856 года, а въ Гуріи и Мингреліи былъ постигнутъ болѣзною. Посредственнымъ урожаемъ плодовъ отличались Иркутская, Кіевская, Таврическая, Казанская и Ярославская губерніи.

Не смотря на значительныя отклоненія отъ правильнаго теченія временъ истекшаго года, ни на невыгодныя атмосферныя состоянія въ продолженіе большей части его, общественное здоровье почти на всемъ протяженіи Имперіи находилось въ удовлетворительномъ состояніи. Хотя цифра больныхъ въ числительномъ отношеніи мало уступала степени болѣзненности двухъ предшествовавшихъ годовъ, но самыя виды болѣзней въ истекшемъ году были менѣе трудны и характеръ не такъ злокачественъ, а потому и ходъ ихъ былъ правильнѣе, исходы благоприятнѣе и общая смертность менѣе чѣмъ въ 1854 и 1855 годахъ. Адинамическій характеръ болѣзней, обнаруживавшійся въ первой половинѣ года и почти исключительно въ одной южной полосѣ, исчезалъ постепенно по мѣрѣ удаленія мѣстностей отъ бывшаго центра военныхъ дѣйствій и съ наступленіемъ лѣтнаго времени года. На сѣверѣ вліяніе его на ходъ болѣзней было замѣтно лишь въ С.-Петербургской и сопредѣльныхъ съ ней Псковской, Новгородской и Тверской губерніяхъ. Въ остальной части Имперіи господствовалъ по преимуществу катарральный характеръ, смѣняясь то ревматическимъ, то чисто воспалительнымъ.

Изъ доставленныхъ Врачебными Управами вѣдомо-



стей общаго числа болѣзненныхъ случаевъ, находившихся во врачебномъ пользованіи по губерніямъ, какъ въ частной практикѣ, такъ и въ больницахъ гражданскаго вѣдомства, губернскихъ и уѣздныхъ, тюремныхъ, помѣщичьихъ, при учебныхъ заведеніяхъ, фабрикахъ и заводахъ, оказывается, что на 1000 больныхъ умерло:

- |    |             |  |
|----|-------------|--|
| 21 | въ губерніи | Пермской,                                  |
| 27 | »           | Лифляндской,                               |
| 30 | »           | Смбпрской,                                 |
| 31 | »           | Эстляндской,                               |
| 32 | »           | Ставропольской и въ Забайкальской области, |
| 35 | »           | Курляндской,                               |
| 36 | »           | Тобольской,                                |
| 39 | »           | Тамбовской и Томской,                      |
| 40 | »           | Самарской,                                 |
| 41 | »           | Владимірской,                              |
| 42 | »           | Воронежской,                               |
| 44 | »           | Архангельской,                             |
| 45 | »           | Градоначальствѣ Таганрогскомъ,             |
| 46 | »           | губерніи Рязанской,                        |
| 47 | »           | Саратовской и Виленской,                   |
| 49 | »           | Иркутской и Ковенской,                     |
| 50 | »           | Харьковской,                               |
| 52 | »           | Витебской и Могилевской,                   |
| 55 | »           | Минской,                                   |
| 57 | »           | Калужской,                                 |
| 58 | »           | Орловской,                                 |
| 59 | »           | Тифлиской,                                 |
| 60 | »           | Пензенской,                                |
| 62 | »           | Московской,                                |
| 63 | »           | Астраханской и Кіевской,                   |
| 64 | »           | Подольской,                                |
| 65 | »           | Тульской и Костромской,                    |

66	въ губерніи	Курской,
68	»	Ярославской,
69	»	Олонецкой,
70	»	Казанской и Оренбургской,
72	»	Екатеринославской,
75	»	Смоленской,
76	»	Вологодской,
79	»	Вятской и Вольнской,
80	» Области	Бессарабской,
82	» губерніи	Нижегородской и въ Одесскомъ Градоначальствѣ,
83	»	Черниговской и Тверской,
90	»	Гродненской,
93	»	Новгородской,
98	»	Херсонской и Полтавской,
101	»	Псковской,
131	»	Таврической,
150	»	С.-Петербургской.

Такимъ образомъ самая большая смертность отъ болѣзней въ 1856 году сосредоточивалась въ двухъ противоположныхъ концахъ на сѣверѣ и югѣ и уменьшалась по мѣрѣ удаленія отъ нихъ къ срединѣ Имперіи и на востокъ.

Причины такого различнаго содержанія смертности основывались преимущественно на степени господствованія въ отдѣльныхъ губерніяхъ различныхъ болѣзней съ болѣе или менѣе губительнымъ характеромъ. Главнѣйшія изъ нихъ въ теченіи года были слѣдующія:

## І. ГОРЯЧКИ.

*Горячки катарральныя, ревматическія и гастрическія* при быстрыхъ и рѣзкихъ перемѣнахъ атмосферы, которыми знаменовался весь истекшій 1856 годъ и при



господствѣ сырой и холодной погоды повсемѣстно были развиты и мѣстами держались во все продолженіе его, усиливаясь особенно въ зимніе и весенніе мѣсяцы. По большей части характеръ ихъ не обнаруживалъ злокачественности, но мѣстами онѣ усложнялись то повальными воспалениями внутреннихъ органовъ, то значительнымъ разстройствомъ пищеваренія и склонностью къ переходу въ тифъ. Зимой почти повсемѣстно господствовали катарральныя и ревматическія горячки, усложненныя катаррами и воспалениями глазъ, зѣва, дыхательнаго горла, плейры и легкихъ, и мѣстами ревматическимъ страданіемъ составовъ. Гриппъ безъ усложненій былъ развитъ въ это время года въ Иркутской, Вятской, Харьковской, Орловской и мѣстами въ Псковской губерніи. Ревматическія горячки, съ опухолью составовъ, довольно чистой формы попадались въ то же время также въ послѣдней и въ Курляндской губерніи. Вообще въ продолженіе трехъ зимнихъ мѣсяцевъ характеръ горячекъ оставался по преимуществу катарральнымъ и воспалительнымъ, но мѣстами въ Архангельской, Олонецкой, С.-Петербургской, Псковской, Лифляндской, Костромской, Витебской, Гродненской, Тверской, Московской, Калужской, Курской, Черниговской, Волынской, Кіевской, Полтавской, Тамбовской, Воронежской, Херсонской и Таврической уже въ Январѣ начали онѣ обнаруживать склонность къ переходу въ тифъ. Склонность эта еще замѣтнѣе сдѣлалась въ Февралѣ и почти повсюду проявлялась въ весенніе мѣсяцы, въ теченіи которыхъ тифъ мало по малу вытѣснялъ катарральныя и ревматическія горячки.—Гастрическія горячки показались эпидемически еще зимою между мѣстными жителями въ Псковской губерніи, въ уѣздахъ Псковскомъ, Порховскомъ и Островскомъ, а также въ Тульской, Могилевской и Гродненской. Въ Мясной губерніи онѣ начались съ Марта, особенно въ Пинскомъ

уѣздѣ, отъ низменнаго положенія его и невыгодныхъ діететическихъ условій большей части жителей; въ губерніяхъ Витебской, Курской, Томской, Самарской, Саратовской и С.-Петербургской въ то же время года катарральныя горячки начали усложняться гастрическими припадками. Иѣтомъ гастрическая форма сдѣлалась вездѣ господствующею и держалась до осени, или въ чистомъ видѣ, или въ сопровожденіи и усложненіи съ простыми и кровавыми поносами, тифомъ, перемежающеюся лихорадкою и болѣзнями печени. Болѣе чѣмъ въ другихъ мѣстностяхъ были они развиты въ губерніяхъ Рязанской, Херсонской, С.-Петербургской, Нижегородской и Самарской, въ которыхъ иногда переходили въ тифъ, затѣмъ въ Пензенской, Саратовской, Тульской, Новгородской, Псковской и Архангельской, гдѣ они усложнялись воспалениями внутреннихъ органовъ и нерѣдкимъ исходомъ въ кровавый поносъ, наконецъ въ Тверской, Томской, Иркутской, Вятской, Калужской, Кіевской, Лифляндской, Минской, Гродненской, Московской и Харьковской губерніяхъ; но вообще смертность отъ нихъ нигдѣ не была значительна. Гастрическая форма горячекъ удержалась и въ продолженіе осени въ Псковской губерніи, гдѣ была она особенно сильна въ Торопецкомъ и Холмскомъ уѣздахъ; въ Витебской, гдѣ мѣстами развилась она поварально, съ ревматическимъ усложненіемъ и склонностію къ переходу въ тифъ; въ Лифляндской, особенно въ Рижскомъ уѣздѣ, съ сильнымъ проявленіемъ катарра кишечнаго канала; въ Херсонской и Ярославской съ частымъ развитіемъ рожи, принимавшей нерѣдко флегмонозное свойство и съ исходами въ тифъ; сверхъ того въ Гродненской, Тверской, Тульской, Томской, Иркутской, Пензенской, Вольнской и Саратовской губерніяхъ. Въ большей же части остальныхъ губерній осенью вновь показались и господствовали катаррально-ревматическія го-



рячки съ характеромъ воспалительнымъ, мѣстами съ страданіемъ органовъ дыхательнаго снаряда. Изъ нихъ ревматическія горячки были особенно сильны въ Курской и сопредѣльныхъ съ нею губерніяхъ. Грнѣ въ чистой формѣ и безъ усложненій всю осень держался въ губерніяхъ Вологодской, Владимірской, Смоленской, Вольнской, Харьковской и Астраханской.

Число горячечныхъ случаевъ въ теченіи года, представившихся врачебному наблюденію въ отдѣльныхъ губерніяхъ, въ содержаніи къ общему числу болѣзней представляетъ слѣдующія величины:

Случаевъ горячекъ было на 1000 больныхъ		
въ губерніяхъ:	Вяленской . . . . .	284
»	» Тобольской . . . . .	270
»	» Кіевской . . . . .	230
»	» Томской . . . . .	215
»	» Харьковской . . . . .	195
»	» Самарской . . . . .	190
»	» Архангельской . . . . .	180
»	» Казанской . . . . .	176
»	» Херсонской . . . . .	174
»	» Екатеринославской . . . . .	173
»	» Курляндской и Курской . . . . .	170
»	» Минской . . . . .	167
»	» Черниговской . . . . .	164
»	» С.-Петербургской . . . . .	156
»	» Вятской . . . . .	154
»	» Могилевской . . . . .	150
»	» Рязанской . . . . .	144
»	» Пензенской и Владимірской . . . . .	140
»	» Калужской . . . . .	136
»	» Новгородской, Тверской и Москов- ской . . . . .	135
»	» Иркутской . . . . .	134

въ губерніяхъ:	Эстляндской . . . . .	129
»	» Орловской . . . . .	126
»	» Вольнской и Астраханской . . . . .	124
»	» Подольской и Лифляндской . . . . .	120
»	» Олонекской . . . . .	118
»	» Псковской и Воронежской . . . . .	113
»	» Полтавской . . . . .	110
»	» Костромской и Таврической . . . . .	109
»	» Симбирской и Ковенской . . . . .	100
»	Области Бессарабской и Ярославской губерній . .	97
»	губерніяхъ: Гродненской . . . . .	93
»	» Вологодской . . . . .	88
»	» Тамбовской . . . . .	75
»	» Витебской . . . . .	72
»	» Оренбургской . . . . .	65
»	» Саратовской . . . . .	55

Смертность отъ горячекъ была вообще незначительна и колебалась между 0,3 и 5: 100; именно на 100 горячечныхъ случаевъ оканчивались смертію:

Въ губерніяхъ:	Симбирской, Иркутской и Харьковской . . . . .	0,3
»	» Воронежской и въ Одессѣ . . . . .	0,4
»	» Тобольской и Московской . . . . .	0,5
»	» Астраханской . . . . .	0,6
»	» С.-Петербургской . . . . .	0,7
»	» Владимирской и Екатеринославской . . . . .	1
»	» Таврической . . . . .	1,1
»	» Минской . . . . .	1,3
»	» Калужской, Архангельской и Томской . . . . .	1,5
»	» Курской . . . . .	1,6
»	» Орловской и Подольской . . . . .	2
»	» Киевской . . . . .	2,4



въ губерніяхъ:	Тамбовской . . . . .	2,7
»	» Казанской, Саратовской, Волын- ской, Тверской и области Бесса- рабской. . . . .	3
»	» Ярославской . . . . .	3,5
»	» Гродненской . . . . .	3,7
»	» Пензенской . . . . .	4,3
»	» Херсонской, Вятской и Витебской. 5	

## II. ТИФЪ.

*Тифозныя горячки* обнаруживались въ Имперіи особенно въ продолженіе первой половины года. Причинами, содѣйствовавшими ихъ развитію, были съ одной стороны невыгодныя діететическія и гігіеническія условія мѣстностей, близкихъ къ центру войны, и изъ нихъ особенно вынужденное необходимостію помѣщеніе огромнаго числа людей въ тѣсныхъ, иногда сырыхъ и холодныхъ, по большей части дурно устроенныхъ жилищахъ, съ другой — продолжительные переходы войскъ въ сырую, ненастную и холодную погоду. Среди невыгодъ, съ ними сопряженныхъ, въ постоянной притомъ борьбѣ съ стихіями, организмы изнурялись, питаніе ихъ ослабѣвало и соки дѣлались склонными къ разложенію и порчѣ. На этой-то почвѣ легко возникалъ поваральный тифъ; съ приходившими партіями онъ заносился во внутренность губерній и при извѣстной степени заразительности сообщался здоровымъ мѣстностямъ. Къ счастью этотъ послѣдній видъ развитія тифозныхъ горячекъ нигдѣ не достигалъ значительныхъ размѣровъ и почти повсемѣстно ограничивался заболѣваніемъ тѣхъ только изъ мѣстныхъ жителей, которые находились съ проходившими командами въ продолжительномъ и болѣе близкомъ соприкосновеніи. Отъ мѣстныхъ же условій въ теченіи отчетнаго

1856 года тифозныя эпидеміи вообще возникали рѣдко и не усиливались до значительнаго развитія.

Съ Декабря 1855 года повальный тифъ продолжался въ сильной степени въ Симферополѣ, гдѣ съ особенною жестокостію онъ свирѣствовалъ въ отдѣленіяхъ Военнаго госпиталя; скоро затѣмъ, при постоянныхъ движеніяхъ войскъ и перевозѣ больныхъ, онъ сообщился уѣздамъ Таврической губерніи Мелитопольскому, Дитровскому, Евпаторійскому и Ялтинскому. Отъ больныхъ нижнихъ воинскихъ чиновъ болѣзнь сообщалась прежде тѣмъ изъ мѣстныхъ жителей, которые болѣе другихъ были изнурены тяжкимъ трудомъ и чаще подвергались вредоноснымъ атмосфернымъ вліяніямъ: въ началѣ вошники тяжестей, погонщики и ямщики заболѣвали ранѣе другихъ сословіи, но уже въ Февралѣ и Мартѣ 1856 года, продолжая свирѣствовать, тифъ поражалъ и молодыхъ и крѣпкихъ людей, неизнуренныхъ тяжелыми трудами. Въ Апрѣлѣ, когда мало по малу возстановились пути сообщенія, тифозныя горячки въ Таврической губерніи начали ослабѣвать и приходять въ границы спорадической болѣзни. Всего, по свѣдѣніямъ Управы, заболѣло ими въ поименованныхъ уѣздахъ 2474 человека, изъ которыхъ умерло 665, что равняется содержанію 1: 3, 7; а во всей Таврической губерніи больныхъ тифомъ гражданского вѣдомства было 2900, умерло 760.

Въ то же самое время заразительный тифъ былъ силенъ въ южной части Херсонской губерніи и особенно въ Одессѣ съ уѣздомъ ея. Въ самомъ городѣ онъ обнаруживался современно съ эпидемическимъ катарромъ и у многихъ начинался подъ катарральною формою, скоро уступавшею свое мѣсто тифознымъ явленіямъ. Самое сильное развитіе тифозной эпидеміи въ Одессѣ было въ Мартѣ; въ Апрѣлѣ начала она ослабѣвать и въ Іюнѣ вовсе прекратилась. Въ Октябрѣ тифъ вновь началъ возни-



катъ въ Одессѣ. Въ продолженіе года въ самомъ городѣ	
заболѣло тифомъ. . . . .	1103
въ колоніяхъ. . . . .	3884
— уѣздѣ Одесскомъ . . . . .	10031
	всего же 15018

человѣкъ, изъ которыхъ умерло 1823, что составляетъ отношеніе 1: 8, 2. Въ остальной части Херсонской губерніи держался пятнистый тифъ съ начала зимы въ однихъ только проходившихъ командахъ, но потомъ отъ стѣсненнаго помѣщенія распространился на мѣстныхъ жителей, особенно въ уѣздахъ Херсонскомъ, Ананьевскомъ, Тираспольскомъ, Александрійскомъ и Бобринецкомъ. Болѣзнь здѣсь чаще всего начиналась признаками гастрической или перемежающейся лихорадки, проходившихъ мало по малу въ тифъ. Въ Февралѣ тифозная эпидемія начала ослабѣвать, но въ уѣздахъ Ананьевскомъ, Тираспольскомъ и Бобринецкомъ продолжалась всю весну. Всего заболѣвшихъ отъ нея было 3318, изъ нихъ умерло 829, или 1 на 4.

Изъ Перекопа съ транспортами больныхъ и раненныхъ изъ Крыма пятнистый тифъ перешелъ въ Екатеринославскую губернію и продолжался эпидемически между мѣстными жителями и въ проходившихъ командахъ съ Декабря до Мая повсемѣстно въ губерніи и особенно на пути слѣдованія транспортовъ. Временное истощеніе мѣстныхъ запасовъ, стѣсненное помѣщеніе проходившихъ командъ въ стѣнныхъ селеніяхъ, накопленіе больныхъ по городамъ, дурное состояніе дорогъ, замедлявшее движеніе войскъ и перемѣчивая погода съ частыми и быстрыми переходами отъ оттепелей и дождей къ сильнымъ выогамъ и морозамъ были и здѣсь содѣйствовавшими причинами къ повальному заболѣванію тифомъ. Особенно часты были случаи его въ мѣстностяхъ, расположенныхъ около озеръ, болотъ и рѣчныхъ заливовъ;

сильнѣйшее развитіе его было въ Февралѣ и Мартѣ; къ концу Апрѣля эпидемія его начала уменьшаться и къ Іюню болѣзнь приняла въ границы спорадическаго обнаруженія, изъ которыхъ она не выступила и осенью. Всего болѣе пострадали отъ нея Екатеринославскій, Верхнеднѣпровскій и Новомосковскій уѣзды; всѣхъ же больныхъ тифомъ въ губерніи было 7826, изъ нихъ умерло 1199, или 1: 6, 5.

Въ Бессарабской области тифъ былъ сильно развитъ съ Марта по Іюль въ уѣздахъ Аккерманскомъ и Кагульскомъ и въ колоніяхъ Болгарскихъ и Нѣмецкихъ. Число заболѣвшихъ имъ въ продолженіе 4 мѣсяцевъ простиралось до 1400, изъ коихъ умерло 200 или 1: 7.

Въ Подольской губерніи тифъ показался зимою прежде всего въ Гайсинскомъ уѣздѣ, куда занесенъ былъ войсками II-го Пѣхотнаго корпуса, прибывшими изъ Крыма; затѣмъ въ Литинѣ, Винницѣ и Ямполѣ съ уѣздами ихъ, гдѣ развитію и распространенію его содѣйствовало передвиженіе войскъ и накопленіе ратниковъ и резервовъ. Самое большее число тифозныхъ больныхъ, пользовавшихся въ Подольской губерніи, поступило изъ резервныхъ Егерскихъ полковъ Симбирскаго и Низовскаго и изъ дружинъ Вологодскаго Ополченія. Въ Мартѣ тифъ началъ прекращаться въ ней и въ концѣ весны ограничивался спорадическими случаями. Мѣстами онъ имѣлъ сильное заразительное свойство, но вообще экстенсивное распространеніе его не достигло значительныхъ размѣровъ, такъ что во всей Подольской губерніи число тифозныхъ больныхъ ограничилось 4132, изъ которыхъ умерло 701, или 1: 5, 9.

Въ Кіевской губерніи тифъ показался съ Декабря, сначала въ Сквирскомъ уѣздѣ въ дружинахъ Ополченія, возвратившихся изъ Крыма, въ то же время въ Таращанскомъ и Радомысльскомъ и въ Апрѣлѣ въ Черкасскомъ



уѣздѣ, но вообще тифозныя эпидеміи въ 1856 году здѣсь были значительно слабѣе, чѣмъ въ предшествовавшіе годы, и продолжались недолго; въ Радомысльскомъ уѣздѣ, гдѣ болѣзнь по большей части развивалась изъ катаррально-ревматической горячки, эпидемія современно съ нею прекратилась въ концѣ Февраля, въ Таращанскомъ въ половинѣ Марта, а въ Сквирскомъ и Черкасскомъ въ Іюнѣ; всего же больныхъ тифомъ въ Кіевской губерніи во все продолженіе года было 2945, умерло изъ нихъ 491, что равняется содержанію 1: 6.

Въ Полтавской губерніи прилипчивый заносный тифъ ограничивался 7 городами, съ уѣздами ихъ, лежащими на пути слѣдованія воинскихъ командъ и рекрутскихъ партій. Какъ до начала перехода ихъ его не было, такъ и окончаніе его совпадаетъ съ выходомъ войскъ, послѣ котораго болѣзнь вновь приходитъ въ размѣры обыкновеннаго спорадическаго проявленія съ ограниченнымъ смертію. Въ Гадячскій уѣздъ тифъ занесенъ былъ еще осенью 1855 года воинскими командами, шедшими изъ Москвы, и держался здѣсь до половины лѣта; съ того же времени онъ показался въ Лубнахъ, сперва въ квартировавшемъ тамъ Малороссійскомъ казачьемъ полку, а потомъ между жителями уѣзда и въ проходившихъ затѣмъ командахъ; въ Константиноградѣ, Миргородѣ, Кременчугѣ, Зеньковѣ и Полтавѣ тифъ обнаружился въ Декабрѣ и продолжался всю зиму и весну; а въ Полтавѣ прекратился только осенью. Въ общемъ числѣ больныхъ тифомъ въ Полтавской губерніи самая большая часть была изъ проходившихъ чрезъ города и уѣзды воинскихъ командъ, дружинъ Ополченія, Малороссійскихъ казачьихъ полковъ, рекрутскихъ партій, пересыльных арестантовъ и судорабочихъ по Днѣпру. Въ Константиноградѣ и Лубнахъ тифъ обнаруживалъ сильное заразительное свойство, при которомъ, не смотря на всѣ предосторож-

ности, болѣзни сообщалась въ больницахъ прислугѣ и больнымъ другими болѣзнями. Всего тифозныхъ больныхъ въ продолженіе года въ Полтавской губерніи было пользовано 6089, изъ нихъ умерло 1103, или 1: 5, 5.

Въ Харьковской губерніи эпидемическій тифъ обнаружился съ Декабря 1855 года; самое большее число заболѣвшихъ имъ было между исходомъ Февраля и Мая, преимущественно въ Харьковѣ, Сумахъ и Лебедяни, съ уѣздами ихъ; къ Іюню эпидемія прекратилась и хотя затѣмъ встрѣчались еще тифозные больные въ проходившихъ чрезъ губернію воинскихъ командахъ и рекрутскихъ партіяхъ, но болѣзни не распространялась между мѣстными жителями, за исключеніемъ Купянска, гдѣ съ Іюня обнаружилась вновь въ слѣдствіе занесенія незначительная тифозная эпидемія, продолжавшаяся до Сентября. Въ Зміевѣ, Валкахъ, Старобѣльскѣ и Ахтыркѣ число тифозныхъ случаевъ ограничивалось больными изъ проходившихъ командъ. Всего же по губерніи пользовано отъ тифа 3608 человекъ и умерло изъ нихъ 664, или 1: 5, 4.

Въ Воронежской губерніи, въ самомъ Воронежѣ тифъ держался почти въ продолженіе цѣлаго года, не достигая впрочемъ сильнаго развитія; наибольшее обнаруженіе его было съ Февраля по Іюль; въ Іюлѣ и Августѣ случаи его были рѣже, но характеръ злокачественнѣе; а осенью они ограничивались одними воинскими командами, проходившими съ юга; въ нихъ онъ развивался на пути самаго слѣдованія. Въ уѣздахъ Воронежской губерніи тифъ былъ весьма слабъ и до эпидемическаго, впрочемъ весьма незначительнаго, развитія достигалъ только въ Задонскомъ уѣздѣ съ Августа по Ноябрь и то на ограниченномъ протяженіи.

Въ Курской губерніи прилипчивый тифъ показался съ Января въ Корочанскомъ уѣздѣ, сначала между сто-



являлись тамъ командами, а потомъ и мѣстными жителями; въ Февралѣ возвращавшіеся изъ Крыма погонщики и вошки тяжестей занесли его въ Новооскольскій уѣздъ, откуда онъ перешелъ въ Суджанскій, Фатежскій и Курскій. Но вообще экстенсивное развитіе тифа въ Курской губерніи въ этомъ году было много слабѣе предшествовавшаго и къ Маю мѣстные эпидеміи прекратились, не смотря на то, что во все продолженіе лѣта въ больницы губерніи доставлялись отдѣльные тифозные случаи, мѣстами съ заразительнымъ характеромъ, изъ проходившихъ чрезъ губернію воинскихъ командъ и особенно дружинъ Ополченія. Всего больныхъ тифомъ въ губерніи въ продолженіе года было пользовано 2097, изъ нихъ умерло 376, что составляетъ содержаніе 1: 5, 9.

Въ Черниговской губерніи тифъ началъ показываться еще въ Декабрѣ, развиваясь изъ перемежающейся лихорадки и простудныхъ горячекъ, особенно въ Остерскомъ и Черниговскомъ уѣздахъ, въ мѣстахъ расположенія воинскихъ командъ; въ Мартѣ онъ ослабѣлъ, но въ это же время случаи его начали чаще обнаруживаться въ Городнѣ, Стародубѣ и Борзнѣ, въ партіяхъ рекрутовъ и ратниковъ и между мѣстными жителями въ мѣстахъ расположенія послѣднихъ. Въ другихъ городахъ Черниговской губерніи тифъ ограничивался спорадическими случаями и къ Юнію окончился повсемѣстно. Всего больныхъ имъ по губерніи значится 3903 человека, изъ коихъ умерло 722, или 1: 5, 4.

Въ Орловской губерніи тифъ появился съ начала весны въ Ливенскомъ и Карачевскомъ уѣздахъ, развиваясь изъ гастритическихъ и катарральныхъ горячекъ отъ вредоносныхъ вліяній, неправильностей діеты, дурнаго содержанія больныхъ и пренебреженія врачебныхъ пособій. Распространеніе его сначала было незначительно: число тифозныхъ въ обоихъ уѣздахъ ограничивалось 420 чело-

вѣками, но въ Маѣ, Іюнѣ и Іюлѣ, при переходѣ чрезъ губернію рекрутскихъ партій и ратниковъ съ юга, оно значительно увеличилось во всѣхъ городахъ, кромѣ Ельца и Малоархангельска, гдѣ тифа вовсе не было; всего же въ продолженіе года пользовано въ Орловской губерніи 2438 тифозныхъ, изъ коихъ умерло 348, что равняется содержанію 1: 7.

Въ Московской губерніи тифъ обнаружился съ Января въ Дмитровскомъ и Московскомъ и съ Марта въ Богородскомъ уѣздѣ, первоначально между ратниками Вятскаго Ополченія, а потомъ и между мѣстными жителями. Въ Москвѣ число тифозныхъ больныхъ возрастало съ начала года до Іюля; въ Іюлѣ, Августѣ и Сентябрѣ оно уменьшилось, а въ Ноябрѣ вновь увеличилось. Въ продолженіе этого мѣсяца въ одну больницу чернорабочихъ поступило 499 больныхъ тифомъ; общая же цифра ихъ въ продолженіи года въ ней возрасла до 3429, что составляетъ  $\frac{1}{6}$  всего годового числа больныхъ, пользовавшихся въ этой одной больницѣ. Въ уѣздахъ Московской губерніи стационарный тифъ постоянно поддерживался случаями изъ проходившихъ командъ. Всего же въ Московской губерніи пользовано отъ тифа 8015 человекъ, изъ коихъ умерло 1168, или 1: 6, 9.

Въ губерніяхъ Вольнской, Мпнской, Могилевской, Тульской, Калужской, Рязанской, Тамбовской, Пензенской, Владимірской, Костромской, Нижегородской, Казанской, Симбирской и Саратовской мѣстныхъ тифозныхъ эпидемій въ продолженіе истекшаго года не было; тифъ попадался лишь въ видѣ спорадическихъ случаевъ, развивавшихся отъ мѣстныхъ невыгодныхъ условій жизни простаго народа, при неблагопріятномъ состояніи атмосферы и недостаточномъ врачебномъ пособіи въ болѣзняхъ лихорадочныхъ и горячечныхъ. Сверхъ того и въ этихъ губерніяхъ мѣстами число тифозныхъ случаевъ



увеличивалось больными изъ проходившихъ воинскихъ командъ и дружинъ Ополченія. Такимъ образомъ въ Мо-  
гилевскія больницы поступило много тифозныхъ въ Маѣ  
и Іюнѣ изъ Ярославскаго Ополченія въ Тамбовскія—изъ  
командъ, возвращавшихся съ береговъ Азовскаго моря  
въ Сентябрѣ и Октябрѣ;—въ Калужской губерніи боль-  
ницы въ продолженіе первой половины года призрѣвали  
много тифозныхъ изъ полковъ, проходившихъ изъ запад-  
ныхъ губерній, изъ рекрутскихъ партій Пермской губер-  
ніи и дружинъ Ополченія, возвращавшихся съ юга; тифъ  
возрождался въ нихъ, въ продолженіе переходовъ, изъ пе-  
ремежающихся лихорадокъ, кроваваго поноса и разно-  
родныхъ горячекъ. Въ больницы Калужской губерніи  
поступило 1132 тифозныхъ, что составляетъ болѣе  $\frac{1}{4}$  об-  
щаго числа больныхъ, пользовавшихся въ нихъ въ про-  
долженіе года, но между мѣстными жителями эпидемій  
вовсе не было. Медынь была первымъ городомъ въ Ка-  
лужской губерніи на пути слѣдованія чрезъ нее войскъ,  
въ ней и оставлена была большая часть тяжкихъ тифоз-  
ныхъ случаевъ, развившихся въ переходахъ; отъ нихъ  
въ самой больницѣ въ короткое время тифъ сообщился 67  
больнымъ другими болѣзнями. Въ концѣ Августа болѣзнь  
прекратилась. Въ Тульской губерніи осенью показалась  
въ легкой степени тифоподобная горячка, но скоро пре-  
кратилась, ограничившись однимъ западнымъ уѣздами.  
Во Владимірской губерніи было много тифозныхъ боль-  
ныхъ въ Мартѣ и Апрѣлѣ изъ проходившихъ дружинъ  
Вятскаго, въ Іюнѣ и Іюлѣ изъ возвратившихся дружинъ  
Владимірскаго Ополченія, а въ Сентябрѣ и Октябрѣ при  
вступленіи въ губернію на постоянныя квартиры 2-й  
Гренадерской дивизіи.—Въ Костромскую губернію тифъ  
былъ занесенъ возвратившимся Костромскимъ Ополче-  
ніемъ въ Августѣ и Сентябрѣ; весною и лѣтомъ его во-  
все не было, зимою онъ ограничивался рѣдкими спора-

дическими случаями. — Въ губерніяхъ Нижегородской и Казанской большая часть тифозныхъ были изъ дружинъ Вятскаго Ополченія, возвращавшихся весною на родину изъ Владимірской губерніи, — а между мѣстными жителями повальнаго распространенія тифа не было; нѣсколько чаще попадались случаи его въ Нижегородской губерніи въ Ардатовскомъ уѣздѣ въ Февралѣ и Мартѣ, весною между рабочими Илевскаго чугунно-плавильнаго завода и осенью, по окончаніи холеры, въ Нижнемъ-Новгородѣ, а въ Казанской — въ уѣздѣ Чистопольскомъ. Вообще мѣстное развитіе тифа въ этихъ двухъ губерніяхъ было особенно слабо, какъ въ эктенсивномъ, такъ и въ интенсивномъ отношеніи, что тѣмъ болѣе замѣчательно, что тифъ, занесенный въ нихъ изъ Владимірской губерніи, имѣлъ въ этой послѣдней довольно сильное заразительное свойство; доказательствомъ тому можетъ служить то, что въ самомъ началѣ скоро по вступленіи во Владимірскую больницу Приказа перваго транспорта больныхъ съ 100 тифозными, заразился въ ней 1 лекарскій ученикъ, 1 фельдшеръ, 2 служителя и 3 больныхъ; сверхъ того изъ сопровождавшихъ дружины врачей 3 заразились и 1 умеръ.

За тѣмъ въ восточной полосѣ Имперіи тифозныя эпидеміи обнаруживались отъ времени до времени въ уѣздахъ Сарапульскомъ, Глазовскомъ, Малмыжскомъ, Орловскомъ, Слободскомъ, Котельничскомъ и Елабужскомъ Вятской губерніи, но онѣ были вообще весьма слабы и поддерживались скопленіемъ рекрутскихъ партій въ городахъ зимою и сообщеніемъ жителей съ больными ратниками Вятскаго Ополченія, возвратившимися въ Маѣ на родину, и съ бурлаками, по возвращеніи ихъ осенью 1856 года съ Камскаго и Волжскаго промысла. Въ Астраханской губерніи тифъ развился послѣ холеры и былъ нѣсколько чаще прежнихъ лѣтъ особенно тамъ,



гдѣ послѣ значительныхъ наводненій остались большіе бассейны стоячей воды, но до эпидемическаго развитія онѣ не дошелъ, хотя на готовую для него почву были брошены сѣмена зараженія при вступленіи воинскихъ командъ, пришедшихъ изъ Крыма. Первые случаи были изъ нихъ, а потомъ между жителями городовъ и селъ въ Астраханскомъ и Черноярскомъ уѣздахъ.

Въ Ярославской и Вологодской губерніяхъ спорадическіе случаи тифа въ маломъ числѣ попадались въ продолженіи цѣлаго года; въ концѣ Мая съ приходомъ Вологодскаго Ополченія они сдѣлались нѣсколько чаще въ Вологдѣ и уѣздахъ Вологодскомъ, Грязовецкомъ и Тотемскомъ, но число ихъ вообще было весьма незначительно и эпидемія далѣе не распространилась. Въ Новгородской губерніи тифъ былъ очень слабъ и ограничивался первыми зимними мѣсяцами, когда послѣ сильныхъ морозовъ наступили оттепели. Въ Курляндской, Виленской, Эстляндской и Ковенской губерніяхъ тифъ обнаруживался весною въ весьма слабой степени, развиваясь по большей части изъ гастрическихъ и простудныхъ горячекъ и не достигая до эпидемическаго развитія. Въ Лифляндской губерніи въ Февралѣ онъ показался въ Венденскомъ и Валкскомъ уѣздахъ въ расположенныхъ тамъ дружинахъ Ополченія и держался въ Мартѣ и Апрѣлѣ, не сообщаясь жителямъ, за исключеніемъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ случаевъ зараженія. Въ Псковской губерніи тифъ показался зимою въ мѣстахъ расположенія запасныхъ Гренадерскихъ полковъ, какъ въ ихъ составѣ, такъ и между мѣстными жителями, въ уѣздахъ Псковскомъ, Порховскомъ и Островскомъ, гдѣ и продолжался всю весну. Лѣтомъ онъ прекратился почти совершенно между мѣстными жителями, но въ больницы губерніи поступали въ продолженіе цѣлаго года тифозные изъ про-

ходившихъ воинскихъ командъ, дружинъ Витебскаго, Тверскаго и Новгородскаго Ополченій, Малороссійскихъ полковъ и рекрутскихъ партій. Характеръ его былъ злокачественъ; смертность равнялась 1: 5.—Въ Смоленской губерніи тифъ также достигалъ эпидемическаго развитія; въ Февралѣ начали обнаруживаться случаи его въ одно время съ перемежающимися лихорадками; современно со вступленіемъ Гвардейскаго Корпуса они усилились и лѣтомъ почти вытѣснили всѣ другія болѣзни, за исключеніемъ перемежающейся лихорадки, сыпей и коклюша, въ Порѣчскомъ, Бѣльскомъ, Духовицкомъ и Дорогобужскомъ уѣздахъ; число тифозныхъ случаевъ въ губерніи еще увеличивалось поступавшими изъ проходившихъ командъ и ратниковъ Смоленскаго Ополченія. — Въ Витебской губерніи тифозныя эпидеміи обнаружались съ Января въ Велижскомъ уѣздѣ въ нѣкоторыхъ помѣщичьихъ имѣніяхъ; а въ началѣ весны почти повсемѣстно простудныя и гастрическія горячки принимали въ ней тифозный характеръ, который еще болѣе усилился при проходѣ Гвардейскихъ полковъ и дружинъ Тверскаго и Витебскаго Ополченій; продолжаясь все лѣто въ слабѣйшей степени, въ Сентябрѣ тифъ вновь достигъ эпидемическаго развитія въ Невельскомъ и сопредѣльныхъ съ нимъ уѣздахъ, гдѣ и держался всю осень, но характеръ его вообще въ этой губерніи не отличался особенною злокачественностію.—Въ Гродненской губерніи мѣстныя тифозныя эпидеміи начались зимою и продолжались почти цѣлый годъ; самое сильное развитіе ихъ было въ Февралѣ, Мартѣ и Апрѣлѣ; лѣтомъ сдѣлались онѣ слабѣе и только осенью прекратились. Особенно господствовали онѣ въ бѣдномъ классѣ мѣстныхъ жителей, въ слѣдствіе недостаточнаго и дурнаго питанія, но смертность отъ нихъ при томъ не была значительна. — Въ Тверскую губернію тифозныя горячки были занесены еще зимою



и продолжались въ Твери и уѣздахъ Тверскомъ, Ржевскомъ, Осташковскомъ, Вышневолоцкомъ, Новоторжскомъ и Старшцкомъ, поддерживаясь тѣснымъ помѣщеніемъ и невыгодными условіями жилищъ бѣдныхъ жителей и слѣдованіемъ чрезъ губернію дружинъ Ополченія и Малороссійскихъ казачьихъ полковъ. При слабомъ экстенсивномъ распространеніи тифъ въ Тверской губерніи былъ особенно злокачествененъ и во многихъ мѣстахъ обнаруживалъ заразительное свойство. Самое сильное развитіе его было въ Февралѣ и Мартѣ, современно со вступленіемъ казачьихъ полковъ; въ это время онъ былъ заразителенъ: отъ поступившихъ больныхъ въ короткое время заразились имъ въ Тверской больницѣ 1 аптекаръ, 8 служителей, 2 помощника смотрителя, 2 лекарскихъ ученика и 5 фельдшеровъ, изъ которыхъ одинъ умеръ. Въ Октябрѣ и Ноябрѣ тифозныя горячки въ Тверской губерніи вновь усилились. — Въ С.-Петербургской губерніи тифъ держался почти цѣлый годъ. Въ самомъ С.-Петербургѣ еще съ Декабря онъ началъ обнаруживаться въ артеляхъ чернорабочихъ и усиливался до половины Августа, — съ этого времени началъ убавляться, но не прекратился совершенно. Самое сильное развитіе его было съ 1 Мая по 1 Августа. О значительности общаго числа тифозныхъ въ столицѣ въ теченіи года можно приблизительно судить изъ того, что только въ двухъ отдѣленіяхъ больницы чернорабочихъ на годовую цифру 8,680 больныхъ было 2,921 тифозныхъ, что составляетъ болѣе  $\frac{1}{3}$  общаго числа. Изъ уѣздовъ въ Лугскомъ тифозная эпидемія была въ Маѣ и Іюнѣ, въ Ямбургскомъ въ Мартѣ и Апрѣлѣ и вновь въ Сентябрѣ и Октябрѣ. — На сѣверъ отъ С.-Петербургской губерніи тифъ былъ слабѣе: въ Олонецкой онъ держался въ видѣ стаціонарной болѣзни въ продолженіе первой половины года, не достигая сильнаго экстенсивнаго распростране-

нія, въ уѣздахъ Повѣнецкомъ, Каргопольскомъ, Пудожскомъ, Вытегорскомъ, Лодейнопольскомъ и Олонецкомъ и только въ Іюнѣ прекратился, но съ Октября вновь обнаружился въ послѣднихъ 5 уѣздахъ. Развитію болѣзни способствовали болотныя мѣстности, жестокіе холода зимою и быстрые переходы отъ стужи къ теплу. Тифъ являлся и въ самостоятельномъ видѣ и присоединялся къ другимъ болѣзнямъ, особенно перемежающейся лихорадкѣ, воспаленіямъ внутреннихъ органовъ, кровавому поносу и простуднымъ горячкамъ. — Въ Архангельской губерніи тифъ держался мѣстами спорадически въ продолженіе цѣлаго года; особенно между поселянами, рабочими на заводахъ и прибылыми изъ другихъ губерній и притомъ въ мѣстностяхъ, расположенныхъ у побережья моря, подлѣ рѣкъ и около болотъ; осенью онъ усилился въ Мезенскомъ уѣздѣ, но вообще нигдѣ въ губерніи не достигалъ значительныхъ размѣровъ. — Въ Пермской губерніи не значительное проявленіе эпидемическаго тифа было мѣстами въ Шадринскомъ уѣздѣ зимою; въ остальныхъ городахъ и уѣздахъ онъ ограничивался запосными случаями. Въ Сибирскихъ губерніяхъ тифъ въ экстенсивномъ отношеніи былъ развитъ слабѣе предшествовавшихъ лѣтъ: въ Иркутскомъ тюремномъ замкѣ онъ вообще не показывался, тогда какъ до сихъ поръ бывалъ ежегодно; въ самомъ Иркутскѣ встрѣчались случаи тифа въ Декабрѣ и Январѣ при сильныхъ морозахъ, въ бѣдномъ классѣ мѣстныхъ жителей отъ дурнаго помѣщенія и нездоровой пищи; притомъ иногда заболѣвали и цѣлыя семейства, но экстенсивное развитіе болѣзни не достигло значительныхъ размѣровъ; сверхъ того въ Августѣ тифъ показался въ Киренскомъ округѣ въ селеніяхъ по рѣкѣ Куглѣ, гдѣ и прекратился около 10 Сентября; въ Сентябрѣ же началъ слабо обнаруживаться въ Нижнеудинскомъ округѣ, какъ исходъ простудныхъ вос-



пазительныхъ горячекъ и въ Октябрѣ въ Иркутскомъ Военномъ госпиталѣ. — Въ Томской губерніи съ Марта случаи тифа начали появляться въ Алтайскомъ и нѣсколь-ко сильнѣе въ Томскомъ округѣ на промыслахъ, особен-но между переселенцами; онъ имѣлъ заразительное свой-ство и продолжался до конца Іюня; осенью вновь пока-зывались не рѣдкіе случаи его. — Въ Тобольской губер-ніи слабыя тифозныя эпидеміи были въ продолженіе лѣта въ Туринскомъ, а въ Забайкальской области—въ Верхне-удинскомъ округѣ.

Такимъ образомъ собственно эпидемическое распро-страненіе тифа въ теченіи истекшаго 1856 года зани-мало преимущественно двѣ полосы въ Имперіи: одна изъ нихъ на югѣ, имѣя центромъ Таврическую губернію и южную часть Херсонской, обхватывала остальное про-тяженіе послѣдней, область Бессарабскую и губерніи Екатеринославскую (кромѣ градоначальства Таганрог-скаго), Подольскую, Кіевскую, Полтавскую, Чернигов-скую, Курскую, Орловскую, Воронежскую и Харьков-скую. Въ этихъ 12 губерніяхъ число тифозныхъ боль-ныхъ, пользовавшихся въ больницахъ гражданского вѣ-домства и частной практикѣ, доходитъ до 57,453, съ смертностію изъ нихъ въ 9,477 случаяхъ, что соста-вляетъ содержаніе 1: 6. Другая полоса эпидемическаго распространенія тифа, начинаясь на сѣверозападѣ Им-періи С.-Петербургскою губерніею, обнимаетъ Псков-скую, Витебскую, Гродненскую, Тверскую, Смоленскую и чрезъ протяженіе Московской соединяется съ предъ-идущею; въ этихъ 7 губерніяхъ случаевъ тифа въ про-долженіе года въ гражданскихъ больницахъ и практикѣ было въ половину менше, именно до 28,670, изъ нихъ умерло 4,722, что равняется тому же содержанію 1: 6. Въ остальныхъ губерніяхъ, какъ расположенныхъ между этими двумя полосами сильнѣйшаго проявленія тифа,

такъ и лежащихъ на сѣверѣ и востокѣ отъ нихъ распро-  
страненіе тифа было значительно слабѣе: эпидеміи его  
встрѣчались рѣдко, были кратковременны и ограничи-  
вались небольшими протяженіями, бѣольшая же часть ти-  
фозныхъ случаевъ въ нихъ были заносные.

Содержаніе числа случаевъ тифа въ отдѣльныхъ гу-  
берніяхъ въ общемъ числѣ больныхъ по онимъ представ-  
ляетъ слѣдующія величины: на 1,000 больныхъ вообще  
было въ губерніяхъ: Херсонской. . . . . 318 тифозныхъ

»	»	Екатеринославской	283	»
»	»	Полтавской. . . . .	280	»
»	области:	Бессарабской . . . .	260	»
»	губерніяхъ:	Таврической. . . . .	237	»
»	»	Черниговской . . . .	150	»
»	»	С.-Петербургской .	141	»
»	»	Курской . . . . .	140	»
»	»	Тверской . . . . .	124	»
»	»	Псковской . . . . .	121	»
»	»	Орловской . . . . .	117	»
»	»	Витебской . . . . .	112	»
»	»	Гродненской. . . . .	103	»
»	»	Подольской. . . . .	100	»
»	»	Московской . . . . .	93	»
»	»	Харьковской. . . . .	91	»
»	»	Кіевской. . . . .	84	»
»	»	Воронежской . . . .	83	»
»	»	Тамбовской. . . . .	67	»
»	»	Ярославской и Пен-		
»	»	зенской. . . . .	64	»
»	»	Владимірской и Ка-		
»	»	лужской . . . . .	62	»
»	»	Рязанской и Волын-	»	»
»	»	ской. . . . .	61	»
»	»	Новгородской. . . .	56	»



въ губерніяхъ:	Казанской . . . . .	53	тифозныхъ
»	» Саратовской . . . . .	52	»
»	» Минской . . . . .	51	»
»	» Иркутской . . . . .	49	»
»	» Могилевской . . . . .	46	»
»	» Вятской и Пермской . . . . .	45	»
»	» Оренбургской . . . . .	44	»
»	» Олонекской . . . . .	38	»
»	» Астраханской . . . . .	37	»
»	» Симбирской и Архангельской . . . . .	34	»
»	» Вологодской . . . . .	32	»
»	» Виленской . . . . .	30	»
»	» Лифляндской . . . . .	26	»
»	» Ковенской . . . . .	23	»
»	» Самарской . . . . .	22	»
»	» Эстляндской . . . . .	19	»
»	» Курляндской . . . . .	15	»

Смертность отъ тифа представляла слѣдующія содержанія:

На 100 тифозныхъ умирало:

въ губерніяхъ:	Астраханской . . . . .	36,
»	» Вятской . . . . .	33,
»	» Таврической . . . . .	26,2
»	» Архангельской . . . . .	25,6
»	» Херсонской . . . . .	25,
»	» Казанской . . . . .	23,6
»	» Тверской . . . . .	23,4
»	» Костромской . . . . .	21,5
»	» Тобольской . . . . .	21,
»	» Псковской и Вольинской . . . . .	20,
»	» Владимірской . . . . .	19,2
»	» С.-Петербургской . . . . .	19,
»	» Черниговской и Ставропольской . . . . .	18,5

въ губерніяхъ:	Харьковской.....	18,4
»	» Курской.....	18,
»	» Новгородской.....	17,6
»	» Ковенской.....	17,3
»	» Подольской и Самарской.....	17,2
»	» Симбирской.....	17,
»	» Могилевской.....	16,7
»	» Кіевской.....	16,6
»	» Минской.....	16,5
»	» Томской.....	16,
»	» Рязанской.....	15,6
»	» Впленской.....	15,4
»	» Екатеринославской.....	15,2
»	» Тамбовской.....	14,9
»	Области Бессарабской.....	14,6
» губерніяхъ:	Московской и Полтавской.....	14,5
»	» Воронежской.....	14,4
»	» Орловской.....	14,2
»	» Калужской.....	12,9
»	Одесскомъ Градоначальствѣ.....	11,6
» губерніяхъ:	Пензенской.....	11,5
»	» Олонекской.....	11,4
»	» Эстляндской.....	11,3
»	» Гродненской.....	11,1
»	» Ярославской.....	11,
»	» Курляндской.....	9,5
»	» Витебской.....	9,3
»	» Лифляндской.....	8,8
»	» Иркутской.....	3,9

Такое различное содержаніе смертности отъ тифа, колебавшейся между 3,9 и 36 на 100. основывалось какъ на различіи характера самой болѣзни, такъ и на временныхъ и случайныхъ причинахъ, обнаруживавшихъ на него вліяніе. Самою большею смертностію отличался тифъ



въ Астраханской губерніи, недостигшій значительнаго экстенсивнаго распространенія, но обнаружившійся непосредственно послѣ холеры, при сильномъ господствѣ перемежающихся лихорадокъ, на почвѣ, находившейся продолжительное время подъ губительнымъ вліяніемъ болотистыхъ испареній отъ повсемѣстныхъ разливовъ рѣкъ. Въ Вятской губерніи высокой процентъ смертности отъ тифа основывался на томъ, что въ ней большую часть тифозныхъ больныхъ въ истекшемъ году составляли ратники Вятскаго Ополченія, возвратившіеся на родину изъ средины Россіи; уже въ Московской губерніи между ними обнаруживался повальный тифъ; расположеніе къ нему должно было усиливаться по мѣрѣ длительности похода, совершавшагося весной въ сырую, ненастную и холодную погоду, вмѣстѣ съ тѣмъ и отъ тѣхъ же условій слабѣли силы питанія организмовъ и развивалась та худосочная почва, на которой тифъ особенно губителенъ. Въ Архангельской и Тобольской губерніяхъ тифъ, слабо развитый въ экстенсивномъ отношеніи, имѣлъ мозговую форму и потому смертность отъ него была особенно значительна. Въ Казанской, Тверской и Костромской губерніяхъ большую часть тифозныхъ больныхъ составляли ратники Ополченія, прибывавшіе изъ далекихъ походовъ съ расположеніемъ къ адинаміи и разложенію соковъ. Затѣмъ смертность отъ тифа превосходила обыкновенную (20 : 100) въ губерніяхъ Таврической и Херсонской, гдѣ неблагоприятному ходу тифозныхъ эпидемій содѣйствовали во множествѣ случайныя и временныя причины. Изъ остальныхъ 36 губерній, доставившихъ положительныя свѣдѣнія, — въ двухъ только, именно въ Псковской и Вольнской тифъ сопровождался обыкновенною, а во всѣхъ прочихъ меньшею, чѣмъ обыкновенно, смертностію; различія степени ея основывались съ одной стороны на величинѣ разстоянія мѣстностей отъ центровъ

сильнѣйшаго развитія тифозныхъ эпидемій, съ другой — на степени вліянія на отдѣльныя губерніи тѣхъ условій, которыя особенно содѣйствовали общей болѣзненности въ истекшемъ 1856 году.

### III. ПЕРЕМЕЖАЮЩІЯСЯ ЛИХОРАДКИ.

Сырая и ненастная погода съ частыми оттепелями зимою и обильными дождями въ продолженіе весны и лѣта прошедшаго года, не могла остаться безъ вліянія на степень распространенія *перемежающихся лихорадокъ*. Еще въ продолженіе зимнихъ мѣсяцевъ онѣ начали показываться въ Астраханской, Саратовской, Самарской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Вольнской, Подольской, Курской, Московской, Тульской, Смоленской, Гродненской, Курляндской и Лифляндской губерніяхъ, ограничиваясь въ началѣ отдѣльными разсѣянными случаями и постепенно достигая болѣе сильнаго экстенсивнаго распространенія. Уже въ Февралѣ въ прибалтійскихъ губерніяхъ перемежающійся характеръ болѣзней былъ до того развитъ, что невралгій и ревматическія горячки принимали его и лихорадка, какъ эпидемія, поражала цѣлыя мѣстности; въ Тульской губерніи въ то же время она обнаруживалась даже на дѣтяхъ до 7 лѣтняго возраста. Типъ ея въ это время года былъ по большей части трехдневный; въ губерніяхъ Могилевской и Черниговской притомъ она нерѣдко переходила въ тифъ.

Весною перемежающіяся лихорадки сдѣлались повсемѣстно господствующею болѣзнію, не только въ южной и средней полосѣ Имперіи, гдѣ онѣ постоянно составляютъ эндемическую болѣзнь, но и въ губерніяхъ, расположенныхъ къ сѣверу. Въ Олонецкой губерніи въ Петрозаводскѣ и уѣздѣ его, гдѣ обыкновенно случаи этой болѣзни рѣдко нападаютъ, съ Марта до конца Іюля вра-



чебному наблюденію представилось до 286 случаевъ лихорадки, изъ которыхъ 8 окончились смертію; въ Новгородской, Псковской, Ярославской и Тверской губерніяхъ перемежающіяся лихорадки попадались несравненно чаще обыкновеннаго; въ Вятской съ весны начались онѣ въ болотныхъ мѣстностяхъ со времени таянія весенняго снѣга и продолжались все лѣто и осень; въ нѣкоторыхъ селеніяхъ, особенно въ Сарапульскомъ и Елабужскомъ уѣздахъ, больные лихорадкою встрѣчались въ каждомъ домѣ, что и продолжалось вплоть до наступленія морозовъ. Даже въ Томской губерніи при половодіи и медленномъ таяніи льда на Томи и Оби весною начали показываться въ большемъ числѣ случаи перемежающейся лихорадки и держались все лѣто. Въ С.-Петербургской губерніи перемежающаяся лихорадка обнаружилась съ Апрѣля и въ Маѣ достигла сильнаго развитія, затѣмъ продолжалась все лѣто и только въ Октябрѣ начала прекращаться, причемъ типъ ея терялъ свою правильность и исходъ въ горячки дѣлался болѣе частымъ явленіемъ.

Постепенно усиливаясь, перемежающіяся лихорадки достигли лѣтомъ высшаго своего развитія въ средней и южной полосѣ Имперіи, особенно въ прибрежныхъ и низменныхъ мѣстностяхъ. Онѣ сопровождались разнородными, чаще всего гастрическими и желчными, усложненіями и отличались склонностію къ рецидивамъ, къ периодическимъ перерожденіямъ железъ питательной системы, серозному криву крови и водянкамъ. Мѣстами сильнѣйшаго экстенсивнаго проявленія ихъ были губерніи Курляндская (по вѣдомостямъ въ ней одной пользовано въ продолженіе года до 20,000 больныхъ отъ перемежающейся лихорадки), Ковенская, Виленская, Ставропольская, Витебская, Могилевская, Курская, Лифляндская, Черниговская, Астраханская, Вольнская, Херсонская, Воронежская, Тамбовская, Новгородская, Минская, Мо-

сковская, Харьковская, Симбирская, Киевская, Полтавская, Таврическая, Самарская, Екатеринославская, Казанская, Нижегородская, Калужская, Рязанская, Подольская, Гродненская, Псковская, Орловская, Пензенская и Владимирская губернии и область Бессарабская. По мѣрѣ усиленія лихорадокъ типъ ихъ изъ трехъ-и четырехъ-дневнаго переходилъ въ ежедневный, характеръ становился злокачественнѣе и рецидивы дѣлались чаще и наступали отъ малѣйшей неосторожности, чему особенно содѣйствовало катаррально-ревматическое расположеніе, державшееся почти повсемѣстно цѣлый годъ. Притомъ отъ спльнаго развитія типознаго характера и другія болѣзни принимали нерѣдко перемежающійся типъ, — и лихорадка обнаруживалась даже у дѣтей. Во время ослабленія ея, послѣдовавшаго въ болѣйшей части мѣстностей въ Іюнѣ и слѣдовавшаго всюду замѣтнымъ въ Іюлѣ, являлся вновь преобладающимъ 3-хъ и 4-хъ дневный типъ; или типъ вообще становился неяснымъ, терялъ свою правильность и лихорадка переходила въ послабляющую горячку. Замѣчательно притомъ, что въ Августѣ и Сентябрѣ, не смотря на холодную и дождливую погоду, число больныхъ перемежающимися лихорадками начало уменьшаться и болѣзнь почти прекратилась на западѣ въ губерніяхъ: Курляндской, Эстляндской, Лифляндской, Виленской, Ковенской, Гродненской, Минской и Витебской. — Въ Херсонской, Таврической, Черниговской, Полтавской, Киевской и Харьковской губерніяхъ съ появленіемъ садовыхъ и огородныхъ овощей въ Іюнѣ и Іюлѣ перемежающаяся лихорадка стала показываться рѣже, а припадки ея начали усложняться гастрическими явленіями. Въ Черниговской губерніи въ числѣ ихъ мѣстами замѣчались рвота, поносъ и корчи. Въ Могилевской губерніи самое спльное развитіе лихорадки было въ концѣ Іюня и началѣ Іюля, современно съ появленіемъ



въ нѣкоторыхъ мѣстахъ губерній холеры; въ интенсивномъ отношеніи оно знаменовалось перѣднымъ появленіемъ злокачественныхъ формъ болѣзни; — ослабленіе же ея послѣдовало только въ Октябрѣ и совершенное прекращеніе къ Ноябрю. Въ бѣльшей части остальныхъ губерній, въ которыхъ перемежающаяся лихорадка достигала значительнаго развитія, лѣтомъ она ослабѣла, но не прекратилась совершенно, а осенью вновь усилилась, именно въ губерніяхъ: Псковской, Владимірской, Нижегородской, Казанской, Самарской, Тамбовской, Астраханской, Саратовской, Екатеринославской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Волынской, Херсонской, Ставропольской и Шемахинской. Тоже замѣчалось въ Вятской и С.-Петербургской губерніяхъ, гдѣ впрочемъ лихорадка не была такъ сильна, какъ въ перечисленныхъ губерніяхъ.

Что касается до отношеній перемежающихся лихорадокъ къ другимъ болѣзнямъ, то весною онѣ держались въ одно время съ воспаленіями, катарральными и ревматическими горячками и тифомъ, въ которыхъ мѣстами переходили, съ рожею, коклюшемъ и острыми сыпями; — лѣтомъ современно съ этими послѣдними, желчнымъ, катарральнымъ и кровавымъ поносомъ и спорадическою холерою, — осенью съ простудными горячками, катаррами, мѣстными воспаленіями, ревматизмами и рожею.

Число случаевъ перемежающейся лихорадки, подлежавшихъ врачебному наблюденію въ отдѣльныхъ губерніяхъ, представляло слѣдующія содержанія къ общему числу пользовавшихся въ нихъ больныхъ:

Случаевъ лихорадки было на 1,000 больныхъ:

Въ губерніяхъ:	Кутаисской . . . . .	391
»	» Курляндской . . . . .	346
»	» Ковенской . . . . .	286
»	» Эриванской . . . . .	285

въ губерніяхъ:	Виленской . . . . .	230
»	» Ставропольской . . . . .	226
»	» Витебской . . . . .	225
»	» Могилевской . . . . .	223
»	» Курской . . . . .	202
»	» Лифляндской . . . . .	200
»	» Черниговской . . . . .	183
»	» Астраханской . . . . .	175
»	» Волынской и Херсонской . . . . .	174
»	» Воронежской . . . . .	171
»	» Тифлиской . . . . .	165
»	» Тамбовской . . . . .	163
»	» Новгородской . . . . .	162
»	» Мпнской . . . . .	160
»	» Московской . . . . .	159
»	» Симбирской . . . . .	154
»	» Харьковской . . . . .	152
»	» Кіевской . . . . .	146
»	» Полтавской . . . . .	140
»	» Таврической . . . . .	139
»	» Самарской . . . . .	135
»	» Екатеринославской . . . . .	127
»	» Казанской и Нпжегородской . . . . .	126
»	» Калужской . . . . .	123
»	» Рязанской и Тульской . . . . .	122
»	» Подольской . . . . .	120
»	» Гродненской . . . . .	114
»	» Псковской и Смоленской . . . . .	110
»	» Орловской . . . . .	109
»	» Пензенской . . . . .	107
»	» Владимірской . . . . .	103
въ Области	Бессарабской . . . . .	100
» губерніяхъ:	Тверской . . . . .	98
»	» Эстляндской . . . . .	90



въ губерніяхъ:	Оренбургской . . . . .	84
»	» Вятской . . . . .	64
»	» Ярославской . . . . .	61
»	» Саратовской . . . . .	60
»	» Тобольской и Олонецкой . . . . .	56
»	» Костромской . . . . .	50
»	» С.-Петербургской . . . . .	40
»	» Вологодской . . . . .	37
»	» Томской . . . . .	31
»	» Архангельской . . . . .	28
»	» Иркутской . . . . .	23

#### IV. ХОЛЕРА.

*Холера* держалась въ С.-Петербургѣ въ продолженіе всего истекшаго года. Въ теченіе первыхъ трехъ мѣсяцевъ, при господствѣ воспалительныхъ болѣзней, сыпей и ревматизмовъ, она не выходила изъ размѣровъ своего распространенія, къ которымъ пришла осенью 1855 года; именно въ Декабрѣ заболѣло ею только 101, въ Январѣ 131 и въ Февралѣ 103 человека. Въ Мартѣ, современно съ усиленіемъ экстенсивнаго распространенія тифа, холерная эпидемія сдѣлалась сильнѣе и въ Апрѣлѣ достигла своего высшаго въ прошломъ году развитія. Число случаевъ заболѣванія холерою, равнявшееся 234 въ продолженіе Марта, въ теченіе Апрѣля было 761. Въ то же время въ столицѣ были сильно развиты горячки съ гастрическимъ характеромъ, перемежающаяся лихорадка, тифъ и поносы желчные, катарральные и кровавые. Въ Маѣ, Іюнѣ и Іюлѣ холерная эпидемія держалась почти на одной степени, представлявшей незначительное ослабленіе интенсивности: въ Маѣ случаевъ заболѣванія было 555, въ Іюнѣ 536 и въ Іюлѣ 619. Въ Августѣ, современно съ ослабленіемъ тифа, холера быстро начала

ослабѣвать, число новыхъ ея случаевъ въ этомъ мѣсяцѣ было только 152; еще замѣтиѣе сдѣлалось это осенью 1856 года, по мѣрѣ постепеннаго исчезанія желчнаго и гастрическаго характера болѣзней и замѣны его воспалительнымъ, ревматическимъ и катарральнымъ. Въ Сентябрѣ заболѣло холерою въ С.-Петербургѣ 106, въ Октябрѣ 121 и въ Ноябрѣ 91 человекъ. Въ Кроиштадтѣ эпидемическая холера обнаружилась съ 15 Мая и продолжалась въ довольно слабой степени до 28 Сентября. Въ уѣздахъ С.-Петербургской губерніи холерныхъ эпидемій не было; случаи этой болѣзни ограничивались людьми, прибывавшими изъ столицы, а всего таковыхъ было въ теченіе года 196, изъ коихъ умерло 104.

Въ первой половинѣ Мая эпидемическая холера вдругъ показалась въ двухъ противоположныхъ точкахъ Виленской губерніи, именно 8 Мая въ мѣстечкѣ Жосляхъ Трокскаго и 12 въ деревнѣ Кравчунахъ Дисненскаго уѣзда. Скоро потомъ, именно 30 Мая, обнаружилась она въ Виленскомъ уѣздѣ; 11 Іюня въ уѣздномъ городѣ Диснѣ, 12 въ Вильно и 12 Іюля въ уѣздѣ Вилейскомъ и Свенцянскомъ. Въ двухъ послѣднихъ прекратилась она между 1 и 6 Августа, продолжавшись только 3 недѣли; въ остальныхъ же мѣстностяхъ Виленской губерніи держалась все лѣто и всего долѣе въ мѣстахъ первоначальнаго своего обнаруженія, именно въ Троцкомъ уѣздѣ—до 1 Ноября, въ Дисненскомъ — до 20 Октября, въ Виленскомъ — до 26, въ Вильно—до 23 Сентября и въ Диснѣ—до 25 Августа. Въ двухъ остальныхъ уѣздахъ Виленской губерніи, въ Ошмянскомъ и Лидскомъ, холерной эпидеміи не было, а были одни спорадическіе случаи болѣзни, числомъ 8, между 20 Іюля и 1 Августа. Всего сильнѣе она была распространена въ Виленскомъ уѣздѣ, гдѣ на 1000 жителей заболѣвало ею 19, въ Дисненскомъ — 17 и въ Троцкомъ 9; въ остальныхъ мѣстностяхъ экстенсивное рас-




пространеніе ея было незначительно и въ Вильно въ продолженіе 3½ мѣсяцевъ заболѣло холерою только 280 человекъ. Вообще эпидемія была болѣе распространена по деревнямъ и поддерживалась сырою и холодною погодою, недостаткомъ здоровой пищи и употребленіемъ сырой, водянистой пищи. Предъ развитіемъ ея перемежающіяся лихорадки въ Виленской губерніи были очень сильны и уже въ концѣ Апрѣля начали усложняться водянистыми испражненіями низомъ. Смертность отъ холеры была значительно менѣе предшествовавшихъ лѣтъ, и ограничивалась 37 на 100; самый ходъ болѣзни отличался тѣмъ только, что исходъ въ тифъ послѣдовалъ гораздо рѣже.

29 Мая, среди повальной холеры, случаи эпидемической холеры начали обнаруживаться въ Ригѣ; достигая значительныхъ размѣровъ, она постепенно усиливалась и къ 20 Іюня дошла до высшаго своего развитія, послѣ 6 Іюля начала прекращаться и къ 14 Августа совершенно исчезла, поразивъ въ эти 2½ мѣсяца всего 391 человекъ, изъ коихъ умерло 181 (45, 80%). Въ концѣ Іюня въ Аренсбургѣ, на островѣ Эзелѣ, показалась холера съ прибытіемъ первыхъ прѣзжихъ на морскія купанья изъ С.-Петербурга. Первою жертвою болѣзни была прачка, мывшая бѣлье привезенное изъ столицы, затѣмъ умеръ отъ холеры мужъ ея. До Сентября было всего въ Аренсбургѣ 17 холерныхъ больныхъ, изъ которыхъ 10 умерло; съ Сентября холера не показывалась болѣе въ городѣ, но обнаружилась въ уѣздѣ, гдѣ до 12 Октября заболѣло ею 58 человекъ и умерло изъ нихъ 25. Этими двумя мѣстностями ограничивалось распространеніе холерныхъ эпидемій въ Лифляндской губерніи въ прошломъ году; въ остальныхъ частяхъ ея болѣзнь проявлялась въ видѣ заносныхъ и тамъ и сямъ спорадическихъ случаевъ и не достигала эпидемическаго развитія. Таковыхъ

было 8 въ купальняхъ Дуббельнъ и Карлсбадъ, находящихся въ безпрерывномъ непосредственномъ сообщеніи съ Ригю; 12 въ Венденѣ, изъ нихъ 5 случаевъ холеры прибыли въ больницу изъ проходившихъ дружинъ Ополченія, 2 развились между больными, находившимися въ это время въ Венденской больницѣ, и 5 случаевъ обнаружился на крестьянскомъ дворѣ Липденгофъ въ Венденскомъ приходѣ, затѣмъ ни въ городѣ, ни въ уѣздѣ случаевъ холеры не было; 9 случаевъ въ Лемзалѣ Вольмарскаго уѣзда, изъ нихъ 7 были нижніе воинскіе чины, прибывшіе изъ Риги и заболѣвшіе на пути ихъ слѣдованія; 4 въ уѣздѣ Верроскомъ и 1 въ Дерптѣ. Этимъ и ограничилось въ истекшемъ году развитіе холеры въ Лифляндской губерніи; свѣжая холодная погода лѣтомъ и раннее наступленіе морозовъ, начавшихся еще въ Августѣ, были повидимому причинами, остановившими ея развитіе. Въ самой Ригѣ эпидемія холеры не исключала другихъ болѣзней, чѣмъ и отличалась она отъ эпидеміи 1855 года, почти равной ей въ экстенсивномъ распространеніи. Простуда и вліяніе сыраго холода являлись одною изъ самыхъ частыхъ случайныхъ причинъ заболѣванія холерою въ Ригѣ; самое большее число больныхъ ею оказывалось въ классѣ людей, занимавшихся работою и промыслами на водѣ, или около ея.

Въ началѣ Іюня начали показываться случаи эпидемической холеры въ Лепельскомъ уѣздѣ Витебской губерніи въ смежности съ Дисненскимъ Виленской, гдѣ эпидемія въ то время уже была сильно развита. Скоро затѣмъ, во время слѣдованія 17-й Пѣхотной дивизіи въ Динабургъ чрезъ уѣзды Суражскій, Витебскій, Полоцкій и Дризенскій, начали и въ нихъ обнаруживаться случаи болѣзни между нижними воинскими чинами, заболѣвавшими на переходахъ еще прежде вступленія Дивизіи въ предѣлы Витебской губерніи. Первыми жертвами болѣзни





лѣзни были нижніе воинскіе чины Муромскаго, Симбирскаго, Ладожскаго, Низовскаго и Бѣлоозерскаго Пѣхотныхъ полковъ; но вскорѣ болѣзнь показалаь и между мѣстными жителями, именно около 20 Іюня въ уѣздѣ Суражскомъ, послѣ 1 Іюля въ Витебскомъ и самомъ Витебскѣ, въ первой половинѣ Іюля въ Полоцкѣ и уѣздѣ его и во второй въ уѣздѣ Дризенскомъ. Въ Себежскомъ уѣздѣ, лежащемъ вѣ пути слѣдованія войскъ, въ то время была сильная холерина; но при внезапной переѣмѣ погоды, сдѣлавшейся неожиданно холодною и сырою, начали и тамъ между мѣстными жителями обнаруживаться случаи эпидемической холеры. Болѣзнь довольно быстро распространилась по уѣзду и въ концѣ Іюля перешла въ уѣздный городъ Себежъ, а оттуда въ смежный съ нимъ Люцинскій уѣздъ, гдѣ была много слабѣе и скоро прекратилась. Холерныя эпидеміи въ отдѣльных мѣстностяхъ Витебской губерніи продолжались почти вездѣ по три мѣсяца, такъ что прекращеніе ихъ послѣдовало въ томъ же порядкѣ, какъ и постепенное развитіе по губерніи. Прежде всего освободился отъ болѣзни Лепельскій, затѣмъ Суражскій, Витебскій, Полоцкій, Себежскій, Дризенскій и послѣ всѣхъ Люцинскій уѣзды. Въ уѣздѣ Велижскомъ повальнаго развитія холеры не было; она ограничилась 11 случаями, въ отдѣльных мѣстахъ уѣзда послѣ 15 Августа. Къ концу Сентября вездѣ въ Витебской губерніи прекратилась эпидемія, не достигши значительнаго экстенсивнаго распространенія. Съ половины Іюля современно съ нею были сильно развиты желчные поносы со рвотою и быстрымъ упадкомъ силъ.

20 Іюня показались первые случаи эпидемической холеры въ Ковно между нижними чинами Гарнизоннаго баталіона и въ Вилькомірѣ между больными, находившимися въ больницѣ; скоро затѣмъ въ этихъ обоихъ го-

родахъ случаевъ заболѣванія холерою начали обнаруживаться и между мѣстными жителями. Въ Іюлѣ и Августѣ болѣзнь проникла въ уѣзды Ковенскій, Вилькомирскій и Новоалександровскій, а въ слѣдующіе мѣсяцы въ г. Шавли и уѣзды Шавельскій, Поневѣжскій и Россиенскій. Появленію эпидемической холеры въ Ковенской губерніи вездѣ предшествовали катарральные поносы; въ числѣ признаковъ ихъ предъ обнаруженіемъ мѣстныхъ эпидемій показывались иногда корчи конечностей и быстрое охлажденіе тѣла. Во время самыхъ эпидемій господствовавшія болѣзни не прекращались и потому не рѣдки были случаи, въ которыхъ холера развивалась какъ неблагоприятный исходъ другихъ болѣзней, особенно тифа, перемежающейся лихорадки и послабляющей горячки. Вообще же въ Ковенской губерніи эпидемическая холера прошлаго года была слаба въ экстенсивномъ отношеніи и отличалась медленностію въ распространеніи и длительностію продолженія по губерніи; еще въ началѣ Декабря показывались отдѣльные случаи болѣзни. Еще слабѣе были ограниченныя по мѣстности и числу заболѣвавшихъ мѣстныя холерныя эпидеміи въ Могилевской губерніи. Здѣсь съ 8 Іюля эпидемія обнаружилась въ помѣщичьихъ имѣніяхъ Сеннинскаго, за тѣмъ Оршанскаго и наконецъ Чаусовскаго уѣздовъ. Каждая изъ мѣстныхъ эпидемій продолжалась по 4 недѣли и къ 8 Сентября холера совершенно оставила Могилевскую губернію. Смертность отъ нея была менѣе обыкновенной.

Въ губерніяхъ сопредѣльныхъ съ вышеозначенными мѣстами проявленія холерныхъ эпидемій, въ теченіи истекшаго года, холера ограничивалась или отдѣльными спорадическими, или исключительно заносными случаями. Въ Курляндской губерніи таковыя встрѣчались въ ограниченномъ числѣ въ Фридрихштадтѣ, Митавѣ и Баускѣ, между нижними воинскими чинами, шедшими



изъ Риги, а въ Якобштадтѣ между рабочими на баркахъ, прибывавшихъ оттуда же; въ Вилдавѣ съ прибытіемъ нижнихъ воинскихъ чиновъ для морскихъ купаній появилась между ними холера и въ теченіи недѣли заболѣло ею 13 человекъ, изъ коихъ 9 умерло; дальнѣйшаго же распространенія болѣзни не достигла и ограничивалась затѣмъ легкими случаями холеры. Замѣчательно, что въ одно время съ холерою въ этой командѣ свирѣпствовала оспа, поражавшая одинаково сильно и тѣхъ, у кого были несомнѣнные признаки предохранительнаго прививанія. Взаимнаго вліянія этихъ двухъ эпидемическихъ болѣзней одной на другую, равно и случаевъ современнаго ихъ развитія на одномъ и томъ же субъектѣ не было замѣчено. Не смотря на эти заносные случаи холеры въ Курляндской губерніи, доходившіе числомъ до 52, съ смертельнымъ исходомъ въ 26, изъ мѣстныхъ жителей ея никто не заболѣлъ. Въ Гродненской губерніи въ Іюні и Іюлі было 88 случаевъ спорадической холеры, изъ нихъ 31 окончился смертію. — Въ Эстляндской губерніи было всего только 3 случая холеры въ Ревелѣ; въ томъ числѣ одинъ больной, прибывшій изъ Риги, женщина прѣзжавшая изъ С.-Петербурга и другая, жившая постоянно въ Ревелѣ; всѣ трое заболѣвшихъ умерли. — Въ Минской губерніи въ Новогрудкѣ и уѣздѣ его въ продолженіи Августа и Сентября оказалось 27 холерныхъ случаевъ и 16 изъ нихъ окончился смертію, дальнѣйшаго же затѣмъ распространенія болѣзни не было. — Въ Псковѣ съ 28 Августа начали показываться изрѣдка изолированные случаи холеры; число ихъ въ теченіи Сентября возросло до 39. — Изъ нихъ смерть послѣдовала въ 27 и тѣмъ ограничилось распространеніе болѣзни. — Въ Тверской губерніи въ Вышне-Волоцкой больницѣ было пользовано въ теченіи лѣта 15 холерныхъ случаевъ, въ томъ числѣ 6 изъ Гвардейскихъ полковъ и 9 изъ крестьянъ, прибыв-

шихъ изъ столицы; всѣ они заболѣли еще на пути слѣдованія и потому прежде поступленія въ больницу болѣзнь дошла уже до того развитія, при которомъ врачебная помощь безсильна. Изъ 15 больныхъ только двое остались въ живыхъ. Въ Твери число холерныхъ случаевъ ограничилось 24, болѣе половины изъ нихъ были прибывшіе изъ С.-Петербурга и Москвы и заболѣвшіе еще на дорогѣ. Въ остальныхъ мѣстахъ Тверской губернии въ теченіи года не было ни одного холернаго случая. — Въ Новгородской губернии мѣстныхъ холерныхъ эпидемій не было, но съ 11 Апрѣля по 8 Сентября изъ проходившихъ войскъ поступали постоянно въ Новгородскій госпиталь болѣвшіе холерою нижніе воинскіе чины. Число таковыхъ случаевъ было 232 и умерло изъ нихъ 129. Также въ Крестцахъ въ Іюлѣ, во время перехода 5-го и 6-го резервныхъ Гренадерскихъ полковъ изъ С.-Петербурга въ Москву, въ уѣздную больницу поступило до 30 заносныхъ случаевъ, съ смертельнымъ исходомъ въ 20 изъ нихъ. Наконецъ съ 28 Іюля показалось до 24 случаевъ эпидемической холеры въ Новгородскомъ уѣздѣ; 7 изъ нихъ принадлежали Округу пахатныхъ солдатъ. — Въ Смоленской губернии съ Іюня по Сентябрь попадались изрѣдка отдѣльные холерные случаи, разсѣянные на большомъ протяженіи, въ Порѣчьемъ и Рославльскомъ уѣздахъ; — число ихъ было 52, съ смертельнымъ исходомъ въ 20 изъ нихъ, — и тѣмъ ограничилось распространеніе болѣзни.

На сѣверъ непосредственно изъ С.-Петербурга эпидемическая холера въ истекшемъ годѣ не распространилась; но въ Вытегорскомъ уѣздѣ Олонецкой губернии въ Бадожской волости, что по Маринскому каналу, съ 11 Іюля при дождливой, сырой и туманной погодѣ начали показываться самостоятельные случаи болѣзни между судорабочими. Они прибывали сюда издалика, изъ гу-



берній Архангельской, Вятской, Симбирской, Тамбовской и Рязанской, проводивъ въ этомъ пути по нѣскольку мѣсяцевъ сряду, день и ночь на водѣ, подъ открытымъ небомъ, въ тяжелой и изнурительной тягѣ судовъ, при нездоровой и часто недостаточной пищѣ и скудномъ одѣяннѣ. Число холерныхъ случаевъ между прибылыми судорабочими было въ теченіи Іюля и Августа 154, большая часть изъ нихъ были случаи запущенные, безъ врачебной помощи по два и по три дня отъ начала болѣзни; умерло изъ нихъ 74, выздоровѣло 80. Всѣ больные нашли приютъ и помощь въ временныхъ больницахъ, которыя для этой цѣли были немедленно устроены по каналу; въ окрестныя селенія болѣзнь не проникла. Съ 20 Августа прибыло еще 7 холерныхъ больныхъ по Маринскому каналу въ Вытегру также исключительно изъ судорабочихъ, шедшихъ изъ Бѣлозерска Новгородской губерніи; въ самой же Вытегрѣ между городскими жителями не было ни одного холернаго случая.

Въ Москвѣ эпидемическая холера держалась съ Мая по Декабрь, не достигая впрочемъ сильнаго развитія. Появленію ея предшествовали желчные и нутужные поносы, усложнявшіеся иногда отдѣльными холерными признаками; въ Іюнѣ, Іюлѣ и Августѣ они продолжались современно съ нею и прекратились только въ Сентябрѣ, когда и холерные случаи стали показываться значительно рѣже. II въ индивидуальныхъ случаяхъ по большей части развитію холеры въ Москвѣ предшествовала холерина. Въ то же время держались и другія повальныя болѣзни, въ особенности гастрическія горячки, перемежающаяся лихорадка, тифъ, коклюшъ и корь. Въ уѣздахъ Московской губерніи эпидемической холеры не было; только въ Богородскѣ въ проходившихъ командахъ встрѣтилось 3 случая ея, между 5 и 16 Сентября. Общая смертность отъ холеры въ Москвѣ въ прошедшемъ году

была менѣе обыкновенной и не превышала 35 случаевъ на 100.

Въ восточной части Имперіи эпидемическая холера обнаружилась прежде всего въ Нижнемъ-Новгородѣ: 10 Іюня между судорабочими на Волгѣ показались первые случаи, обнаружившіеся затѣмъ и въ самомъ городѣ. Въ Іюлѣ и Августѣ эпидемія достигла высшаго развитія, въ Сентябрѣ начала ослабѣвать, въ Октябрѣ было только 2 случая ея. Вообще экстенсивное распространеніе холеры не было здѣсь сильно; число заболѣвшихъ въ цѣломъ городѣ ограничилось 230, изъ коихъ умерло 138. Обнаруженію болѣзни постоянно содѣйствовали вліяніе простуды и несоблюденіе предосторожностей въ пищѣ и питъѣ. Во всѣхъ случаяхъ катаральный поносъ предшествовалъ болѣзни, какъ указаніе для предупредительнаго врачебнаго пособія, при помощи котораго и ограничилось распространеніе эпидеміи. Только въ концѣ ея и то на короткое время обнаружилось вліяніе холерной мiasmы на ходъ другихъ болѣзней: въ больницѣ показалось довольно много случаевъ заболѣванія холерою между разнородными больными, лежавшими отдѣльно и далеко отъ холерныхъ, что тѣмъ болѣе было замѣчательно, что зданіе больницы расположено въ верхней части Нижняго Новгорода, гдѣ холера вовсе не господствовала. Въ уѣздахъ Нижегородской губерніи холерныхъ эпидемій не было; отдѣльные же, по большей части заносные, случаи холеры встрѣчались только при вступленіи дружинъ Ополченія; ихъ было въ Семеновѣ 15, въ Макарьевѣ 5, въ Балахнѣ 1, въ Горбатовѣ 1 и въ Ардатовѣ 12, всего 34; изъ нихъ окончилась смертію 16.

11 Іюля холерная эпидемія показалась въ Самарѣ; здѣсь предшествовали ей жары, доходившіе до  $+ 24^{\circ}$  и смѣнившіеся въ самый день начала эпидеміи сильною грозою съ дождемъ и ураганомъ, а затѣмъ проливными



дождями, продолжавшимися десять дней сряду и потомъ часто возвращавшимися. Во все 50-ти дневное продолженіе эпидеміи барометръ въ Самарѣ стоялъ высоко при облачномъ небѣ и 32 дня не опадалъ съ  $29^{\circ}$  въ Р. д.; въ атмосферѣ замѣтна была особенная тишина и въ продолженіе 28 дней было совершенное безвѣтріе. Холера ограничилась одною Самарою и даже на окрестности ея не распространилась. Въ числительномъ отношеніи эпидеміи не была значительна, но отличалась особенною смертностію, доходившею до  $71\frac{9}{10}$ , что отчасти зависѣло отъ того, что въ числѣ больныхъ было много запущенныхъ случаевъ съ судовъ, прибывавшихъ по Волгѣ и Самарѣ. Въ концѣ Августа эпидемія прекратилась.

Съ 24 Іюля эпидемическая холера показала въ Астрахани. Къ этому времени уже совершенно сбыла вода, разлившаяся во время наводненія по улицамъ города и вліяніе мiasmатическихъ испареній было во всей силѣ. Притомъ погода была знойная, съ рѣзкими переходами къ охлажденію воздуха, слѣдовавшему особенно по ночамъ. Изъ болѣзней предшествовали эпидеміи упорные нутужные, кровавые и водянистые поносы, часто переходившіе въ тифъ и особенно губительные для дѣтей. Сверхъ того предъ самымъ появленіемъ ея, равно какъ и во все время ея продолженія, у многихъ мѣстныхъ жителей показывались сильныя головныя боли, со слабостію, упадкомъ силъ и обмороками, но безъ всякаго пораженія пищеварительныхъ органовъ. Первые случаи холеры въ сильнѣйшей степени въ числѣ 3 показали въ ночи на 24 Іюля въ 3-хъ отдѣльныхъ Армянскихъ домахъ, находящихся въ одномъ кварталѣ, но на разныхъ улицахъ и во все не имѣвшихъ сообщенія другъ съ другомъ. Въ слѣдъ затѣмъ начали ежедневно обнаруживаться случаи болѣзни во всѣхъ возрастахъ и обоемъ полахъ, особенно же въ мужскомъ; на 1,000 жителей поражалось около 8,5, пре-

преимущественно изъ вновь прибывавшихъ въ Астрахань и подвергавшихся нарушеніямъ діеты и вліянію простуды. Холера этого года отличалась здѣсь особенно быстрымъ теченіемъ, — которое отчасти и обусловливало значительную смертность ея, превосходившую на 6% смертность 1853 года. Замѣчательно, что этимъ обѣимъ эпидеміямъ предшествовала повальная смертность рѣчной и даже красной рыбы; и въ прошедшемъ, какъ въ 1853 году, на берегахъ Каспійскаго моря, особенно около Кизляра, значительныя пространства были покрыты мертвою рыбою. Холера въ Астрахани прекратилась къ 10 Сентября, современно съ значительнымъ пониженіемъ температуры воздуха. Но съ 23 Сентября, съ прибытіемъ войскъ съ Кавказа, вплоть до 1 Ноября вновь показывались sporadические случаи ея. Въ окрестныхъ, около Астрахани, деревняхъ и въ степи между кочующими встрѣчались не многіе отдѣльные случаи болѣзни, а эпидеміи не было. Изъ остальныхъ уѣздовъ она не проникла въ Красноярскій и Енотаевскій, но обнаружилась въ слабой степени въ началѣ Сентября въ одной изъ слободъ Царевского и въ половинѣ Сентября въ Малодербетевскомъ уездѣ Чернопярскаго уѣзда, — гдѣ и продолжалась по 15 Октября.

Изъ пограничныхъ съ Астраханскою губерніей въ Саратовской случаи эпидемической холеры попадались съ 9 Августа до начала Октября, преимущественно въ Саратовѣ между мѣстными жителями отъ употребленія въ пищу незрѣлыхъ овощей и плодовъ и охлажденія желудка холоднымъ питьемъ при разгоряченномъ тѣлѣ. Въ дѣтскомъ и старческомъ возрастѣ эти случаи попадались особенно часто, но большая часть изъ нихъ знаменовалась слабыми признаками болѣзни, какъ бы останавливавшейся на степенн сильной холерыны; случаевъ же совершенно развитой холеры было всего 50, и умерло изъ нихъ 36. Изъ уѣздныхъ городовъ Саратовской губерніи



въ то же время въ Камышинѣ встрѣчались холерные случаи между судорабочими, по большей части отъ простуды, невождности и употребленія въ пищу не зрѣлыхъ овощей. — Въ Оренбургской губерніи съ 13 Августа по 1 Октября было 20 холерныхъ случаевъ, изъ которыхъ 13 окончились смертію; въ Казанской въ Козьмодемьянскомъ уѣздѣ 6; изъ нихъ умерло 5.

Въ остальной части Имперіи холерные случаи попадались особенно рѣдко. Въ числѣ ихъ замѣчательны слѣдующія обнаруженія этой болѣзни:

Въ Житомирѣ во второй половинѣ Іюля у нѣсколькихъ жителей въ городѣ въ одно и то же время показались нѣкоторые холерные явленія и у одного, послѣ купанья въ рѣкѣ, развилась холера со всѣми свойственными ей явленіями; больной выздоровѣлъ и болѣзнь болѣе не обнаруживалась.

Въ Городнѣ Черниговской губерніи въ Іюлѣ и Августѣ показалось нѣсколько спорадическихъ случаевъ холеры съ особенно быстрымъ теченіемъ одинъ за другимъ и въ Суражѣ одинъ случай.

Въ Херсонѣ въ продолженіе Іюня и Іюля встрѣчались спорадическіе случаи холеры и въ Августѣ въ продолженіе короткаго времени ихъ было 12; всѣ послѣдніе были въ партіи погонщиковъ, состоявшихъ при войскахъ, возвращавшихся изъ Крыма. Причинами, содѣйствовавшими обнаруженію болѣзни между ними, были утомленіе отъ пути въ жаркое время года и употребленіе въ пищу сырыхъ, незрѣлыхъ плодовъ. Болѣзнь отлпчалась особенно быстрымъ ходомъ, при которомъ альгидное состояніе у нѣкоторыхъ наступало чрезъ нѣсколько часовъ отъ начала первыхъ ея признаковъ. Въ Николаевѣ былъ всего одинъ случай болѣзни.

Въ Нижнеудинскомъ округѣ Иркутской губерніи въ Ноябрь 1856 года, во время быстрыхъ переходовъ отъ

сиѣга къ дождю и теплой погодѣ наблюдаемо было 5 случаевъ сильной холерныи, со рвотами и поносомъ.

Въ Кавказскихъ губерніяхъ въ теченіи 1856 года вплоть до конца осени холерныхъ эпидемій не было, хотя съ самаго начала его холера держалась въ пограничныхъ Персидскихъ провинціяхъ. Въ Ноябрѣ же съ возвращеніемъ изъ Кярбелая богомольцевъ показалось нѣсколько случаевъ болѣзни въ пограничныхъ деревняхъ, расположенныхъ по теченію рѣки Аракса и съ 26 Ноября въ Эриванской губерніи въ селеніи Нахичеванскаго уѣзда Таза-кентѣ начали показываться одинъ за другимъ холерные случаи. Эта мѣстная эпидемія продолжалась 3 недѣли, и ограничилась 40 заболѣвшими, изъ коихъ умерло 26 человекъ; въ тоже время нѣсколько холерныхъ случаевъ было въ деревняхъ Неграмъ-Шахтахты и въ концѣ Декабря въ городѣ Ордубатѣ.

Такимъ образомъ въ теченіи истекшаго 1856 года эпидемическая холера продолжалась въ С.-Петербургѣ, совершая *четвертый* годъ своего неопредѣленнаго и исключительно долгаго цикла въ этомъ городѣ. Изъ него, не смотря на постоянно живое сообщеніе со всѣми пунктами Имперіи, болѣзнь не вышла ни однимъ заноснымъ случаемъ ни зимою, ни въ первой половинѣ весны. Только съ половины Апрѣля и въ Маѣ заносные изъ С.-Петербурга случаи холеры начали показываться въ ближайшихъ къ нему губерніяхъ. Лѣтомъ же эпидемическая холера вновь самостоятельно развилась въ сѣверо-западной части Имперіи: въ Ригѣ и губерніяхъ Виленской, Витебской и Ковенской, изъ которыхъ въ весьма слабой степени эпидемія отразилась въ Могилевской и Гродненской губерніяхъ. Далѣе на югъ эпидемія въ прошломъ году не распространялась и въ пограничныхъ губерніяхъ, Минской, Смоленской, Псковской, Курляндской и Эстляндской болѣзнь ограничивалась спорадическими



или исключительно заносными случаями. Таковые же были и на разстоянии между С.-Петербургомъ и Москвою, въ губерніяхъ Новгородской и Тверской; въ Москвѣ холера уже вышла изъ спорадическихъ размѣровъ, но изъ нея не распространилась не только на сосѣднія губерніи, но и на уѣзды Московской. На сѣверъ отъ С.-Петербурга ограниченная, не только по мѣсту, но и по промыслу и роду жизни заболѣвавшихъ, холерная эпидемія показала въ Олонецкой губерніи. На востокъ Имперіи эпидемическая холера распространялась по видимому по теченію Волги, выступавшей особенно сильно въ истекшемъ году изъ береговъ своихъ; обнаружившись незначительными проявленіями въ Ярославской и Костромской губерніяхъ, болѣзнь развилась въ видѣ слабой эпидеміи въ Нижнемъ-Новгородѣ, затѣмъ въ Самарѣ и Астрахани; съ этого пути слабыя спорадическія отраженія эпидеміи были замѣтны въ Саратовской и Оренбургской губерніяхъ. Въ остальныхъ мѣстностяхъ Имперіи холерныя эпидеміи не развивались, хотя въ нѣкоторыхъ изъ нихъ и обнаруживались признаки, грозившіе развитіемъ ихъ. Вообще распространеніе холерныхъ эпидемій въ продолженіи отличалось въ истекшемъ году особенною медленностію.

Въ постепенномъ обнаруженіи ихъ замѣтна была нѣкоторая послѣдовательность во времени; по мѣрѣ удаленія отъ запада къ востоку они начинались позднеѣ: появившись съ 8 Мая въ Виленской губерніи холера показала только 8 Іюня въ Витебской, 10 Іюня въ Нижнемъ-Новгородѣ, 11 Іюля въ Самарѣ, 24 въ Астрахани, 9 Августа въ Саратовѣ и 13 въ Оренбургской губерніи.

Въ эстенсивномъ отношеніи холера истекшаго года была слабо развита. Всего, по вѣдомостямъ управъ, случаевъ ея было:

		изъ нихъ выздоров.	умерло.	осталось
Въ Виленской губерніи..	5629	3523	2106	
» С.-Петербургъ и губ.	3985	1846	2107	32
» Витебской.....	2451	1620	831	
» Москвѣ.....	1379	890	489	
» Ковенской.....	746	461	285	
» Ригѣ и Лифляндской губерніи.....	492	266	226	
» Астраханн.....	439	242	197	
» Новгородъ и губерніи.	286	123	163	
» Самарѣ.....	266	76	190	
» Нижнемъ Новгородѣ и губерніи.....	249	100	149	
» Вытегрѣ Олонецкой губерніи.....	161	84	77	
» Могилевской.....	151	100	51	
» Гродненской.....	88	57	31	
» Смоленской.....	52	32	20	
» Курляндской.....	52	26	26	
» Саратовской.....	50	14	36	
» Эриванской.....	40	26	14	
» Псковской.....	39	12	27	
» Тверской.....	39	12	27	
» Владимірской.....	32	14	18	
» Костромской.....	31	25	6	
» Херсонской.....	30	23	7	
» Минской.....	27	11	16	
» Ярославской.....	21	7	14	
» Оренбургской.....	20	7	13	
» Симбирской.....	7	3	4	
» Казанской.....	6	1	5	
» Эстлянской.....	3	»	3	

Всего же въ Имперіи 16771 9601 7138  
осталось къ 1 Дек. 1856 въ одномъ С.-Петербургѣ 32.



Особенною смертностію, 71: 100, отличалась холерная эпидемія въ Самарѣ, — нѣсколько менѣе, именно 60: 100, была она въ Нижнемъ-Новгородѣ и 52: 100 въ С.-Петербургѣ. Изъ остальныхъ мѣстъ эпидемическаго проявленія холеры умерло :

46:	100	въ Лифляндской губерніи,	
44,8:	100	» Астраханн,	»
38,2:	100	» Ковенской,	»
37,4:	100	» Виленской,	»
35,4:	100	» Москвѣ,	»
33,9:	100	» Витебской,	» и
33,7:	100	» Могилевской.	

Содержаніе смертности отъ холеры въ остальныхъ губерніяхъ зависѣло отъ случайныхъ причинъ и особенно того, въ какомъ періодѣ и степени болѣзни поступали во врачебное пользованіе заносные случаи, составлявшіе большинство общаго числа встрѣчавшихся въ нихъ холерныхъ случаевъ.

## V. ПОНОСЪ ЖЕЛЧНЫЙ И КРОВАВЫЙ.

Поносы какъ желчные и катарральные, такъ и кровавые вообще обнаруживались слабо во все продолженіе истекшаго года и рѣдко достигали эпидемическаго распространенія. На сѣверѣ развитіе ихъ было весьма незначительно; въ губерніяхъ Олонецкой, Архангельской, Пермской, Вятской, Вологодской, Костромской, Ярославской, Тверской, Эстляндской и Псковской желчные поносы попадались спорадически, кровавый же поносъ въ слабой степени держался только въ Олонецкомъ, Лодейнопольскомъ и Каргопольскомъ уѣздахъ съ Іюля по Октябрь. Въ Томской губерніи, въ Іюнѣ, Іулѣ и Августѣ поносы катарральные и ревматическіе встрѣчались нѣсколько чаще, отличались особенною упорностію и не-

рѣдкими переходами въ кровавый поносъ и держался преимущественно на низменныхъ и прибрежныхъ мѣстахъ. Въ прочихъ Сибирскихъ губерніяхъ поносы желчные были также слабо развиты; кровавый же поносъ ограничивался спорадическими случаями, даже въ Омскомъ округѣ и Южной части Иркутской губерніи съ градоначальствомъ Кяхтинскимъ, гдѣ онъ ежегодно обнаруживается повально. Въ С.-Петербургской губерніи, при постоянномъ господствѣ холеры, простые и кровавые поносы начали обнаруживаться съ Апрѣля, но уже въ Маѣ ослабѣли и лѣтомъ попадались менѣе часто, чѣмъ въ другіе годы. Кровавый поносъ сильнѣе, чѣмъ въ остальныхъ частяхъ губерніи, былъ развитъ въ Шлиссельбургскомъ уѣздѣ въ Апрѣлѣ. Смертность отъ него вообще по губерніи равнялась 20 : 100. Въ губерніи Новгородской мѣстные эпидеміи его въ лѣтніе мѣсяцы ограничивались Боровичскимъ и Устюжскимъ уѣздами, въ Ярославской—Ярославскимъ и Угличскимъ. Въ Курляндской губерніи случаи кроваваго поноса изрѣдка показывались во все продолженіе весны и лѣта, число ихъ было незначительно, и до самостоятельнаго эпидемическаго развитія кровавый поносъ не дошелъ, но расположеніе къ нему обнаруживалось довольно сильно въ исходныхъ періодахъ другихъ болѣзней, изъ которыхъ онъ нерѣдко присоединялся къ воспаленіямъ легкихъ, тифу, водянкамъ, перемежающейся лихорадкѣ и венерической болѣзни. Въ Лифляндской губерніи катарральный желчный поносъ начался съ Мая, современно съ холерою; кровавый же, показывавшійся спорадически съ Февраля, въ Іюлѣ, когда ослабѣвала холера, достигъ довольно сильнаго эпидемическаго развитія и съ незначительною смертностію господствовалъ особенно въ Рижскомъ и сопредѣльныхъ съ нимъ уѣздахъ до конца Сентября. Въ послѣднее время, когда уже холерная эпидемія совер-



шенно прекратилась, и некоторые случаи катаррального поноса сопровождались признаками холеринны. Въ Виленской и Ковенской губерніяхъ желчные поносы предшествовали эпидемической холерѣ и сопровождали ее, какъ равно въ Витебской и мѣстами въ Гродненской губерніяхъ. Въ Минской довольно сильная эпидемія кроваваго поноса, съ смертностію 12, 5 : 100, ограничивалась Борисовскимъ уѣздомъ, гдѣ она длилась въ продолженіе всего лѣта. Въ Смоленской губерніи простой и кровавый поносы обнаруживались въ Іюлѣ и Августѣ; послѣдній сильнѣе, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ, господствовалъ въ Духовщинскомъ уѣздѣ; принявши по возвращеніи дружинъ Ополченія эпидемическій характеръ, онъ перѣдко даже присоединялся къ другимъ болѣзнямъ. Въ Московской губерніи поносы также довольно сильно, но слабѣе предшествовавшихъ лѣтъ, были развиты въ концѣ весны и лѣтомъ; въ самой Москвѣ они сопутствовали холерѣ и въ отдѣльных случаяхъ по большей части ей предшествовали. Смертность отъ кроваваго поноса здѣсь равнялась 11 : 100. Въ сопредѣльныхъ губерніяхъ Тульской, Рязанской, Нижегородской и Владимірской поносы не достигали эпидемическаго развитія; большая же часть случаевъ кроваваго поноса на протяженіи ихъ встрѣчались въ проходившихъ воинскихъ командахъ. Въ Казанской губерніи довольно сильная въ интенсивномъ отношеніи эпидемія кроваваго поноса была въ Іюнѣ, Іюлѣ и Августѣ, въ уѣздахъ Царевококшайскомъ, Козьмодемьянскомъ и Цивильскомъ; смертность отъ нея равнялась содержанію 24 : 100. Въ Калужской губерніи катарральный поносъ съ особенною силою продолжался все лѣто, а кровавый показался съ половины Іюня и особенно усилился въ Медынскомъ, Малоярославецкомъ, Тарускомъ и Боровскомъ уѣздахъ, при проходѣ войскъ изъ Крыма и западныхъ губерній, современно съ тифомъ. Здѣсь

мѣстами онъ обнаруживалъ заразительное свойство. Въ Орловской губерніи съ Мая до Августа продолжались довольно сильныя эпидеміи катаррального поноса на дѣтяхъ, а кровавый поносъ показался съ Іюня и длился все лѣто, съ смертностію 10,5:100. Въ Курской губерніи поносы показались съ Апрѣля, современно съ эпидеміями острыхъ сыней и рожею, и продолжались вплоть до осени. Осенью и зимою случаи кроваваго поноса нерѣдко обнаруживались въ проходившихъ чрезъ губернію воинскихъ командахъ и дружинахъ Ополченія. Въ Саратовской губерніи какъ простой, такъ и кровавый поносы удержались въ границахъ спорадической болѣзни, но въ самомъ Саратовѣ съ начала Мая до конца Августа катаррально-желчный поносъ господствовалъ на дѣтяхъ до 5 лѣтнаго возраста въ такой сильной степени, что въ одномъ городѣ умерло отъ него до 619 младенцевъ.

Въ южной полосѣ Имперіи, гдѣ лѣто вообще было прохладно, эпидемическій кровавый поносъ въ истекшемъ году также не былъ силенъ и ограничивался по большей части незначительными протяженіями. Высшее эпидемическое развитіе его было въ Августѣ и Сентябрѣ въ Кременчугскомъ уѣздѣ Полтавской и въ Кременецкомъ — Волынской, въ Іюлѣ въ Ананьевскомъ уѣздѣ — Херсонской губерніи и въ Астрахани непосредственно послѣ наводненія. Изъ нихъ особенною злокачественностію отличались мѣстныя эпидеміи въ Херсонской и Волынской губерніяхъ; въ первой смертность отъ кроваваго поноса равнялась 23,8:100, а въ послѣдней 20:100. Въ Тифлиской губерніи эпидемія кроваваго поноса была въ Августѣ и Сентябрѣ въ Осетинскомъ округѣ; въ самомъ же Тифлисѣ кровавый поносъ держался въ Январѣ, Февралѣ, Мартѣ, Іюнѣ, Октябрѣ и Декабрѣ, не усиливаясь до эпидемическаго развитія. Въ Кутаисскомъ уѣздѣ онъ показался съ Августа и скоро принявъ



эпидемическую форму, распространился въ Озургетскій и Шарапанскій уѣзды, гдѣ продолжался всю осень, удерживаясь преимущественно въ болотистыхъ и лѣсныхъ мѣстностяхъ. Катаррально-воспалительный характеръ его не отличался особенною злокачественностію и смертность ограничивалась содержаніемъ 5,7:100. За исключеніемъ этихъ ограниченныхъ мѣстностей вообще въ южной части Имперіи кровавый поносъ не достигалъ эпидемическаго развитія, а ограничивался спорадическимъ проявленіемъ. Чаше прочихъ мѣстностей встрѣчался онъ въ Одессѣ въ Декабрѣ 1855 и Январѣ 1856 г., а потомъ вновь въ Ноябрѣ, лѣтомъ же вовсе не показывался; въ Таврической губерніи въ Іюлѣ и Августѣ, когда тифъ почти совершенно прекратился; въ Кіевской въ Маѣ и Іюнѣ, преимущественно въ воинскихъ командахъ; въ Екатеринославской съ Мая; въ Харьковской и Воронежской, особенно въ проходившихъ войскахъ, съ Іюня, когда началъ ослабѣвать тифъ. На почвѣ, приготовленной имъ и перемежающимися лихорадками къ воспріятію міазмы, кровавый поносъ, слабый въ экстенсивномъ распространеніи, мѣстами дѣлался злокачественнымъ и знаменовался смертностію въ содержаніи 20:100. Въ губерніяхъ Кіевской, Подольской, Воронежской и въ области Бессарабской она была какъ 12,5:100, въ градоначальствѣ Одесскомъ 9:100, а въ Полтавской губерніи не болѣе, какъ 1,6:100. Желчные, катарральные и ревматическіе поносы на югѣ Имперіи въ истекшемъ году также обнаруживались въ незначительной степени; хотя мѣстами и возрождались они при неурожаѣ плодовъ и овощей, но до степени эпидеміи нигдѣ не возвышались, что отчасти основывалось и на томъ, что въ продолженіе лѣта жары не достигали почти нигдѣ сильнаго развитія. Только въ Тифлисѣ, гдѣ лѣто было довольно знойное, повальный поносъ желчнаго свойства съ холерическими

явленіями господствовалъ во все продолженіе этого времени года на грудныхъ младенцахъ и въ одномъ Тифлисѣ сопровождался 150 смертными случаями.

## VI. НАТУРАЛЬНАЯ ОСПА И ВИДОИЗМѢНЕНІЯ ЕЯ (VARIOLOIS И VARICELLA).

Повѣтрія оспы въ продолженіе истекшаго года господствовали почти постоянно на большей части протяженія Имперіи. Начавшись съ осени 1855 года, натуральная оспа еще продолжалась въ Декабрѣ въ Дерптскомъ уѣздѣ Лифляндской и Богучарскомъ Воронежской губерній, но въ началѣ Января она прекратилась. Въ то же время начали появляться случаи натуральной оспы и ея видоизмѣненій въ сопредѣльной съ Лифляндскою Эстляндской губерніи, гдѣ продолжались они спорадически весну и лѣто, а съ Августа начали обнаруживаться повально, особенно въ Ревелѣ и уѣздахъ Эрвенскомъ, Вискскомъ и Гарріенскомъ; здѣсь эпидемія продолжалась всю осень, поражая особенно тѣхъ изъ мѣстныхъ жителей, которые не подвергались предохранительному прививанію. Въ-стѣ съ тѣмъ во всей сѣверной полосѣ Имперіи съ начала зимы начали обнаруживаться случаи натуральной оспы, скоро за тѣмъ усилившейся до повальнаго распространенія. Въ Олонецкой губерніи они встрѣчались въ продолженіе цѣлаго года и нерѣдко даже между людьми, подвергавшимися въ дѣтствѣ предохранительному оспопрививанію. Замѣчательно притомъ наблюденіе, сдѣланное нѣсколько разъ въ теченіе этой эпидеміи: въ нѣсколькихъ случаяхъ зараженія на людяхъ, имѣвшихъ несомнѣнные знаки предохранительнаго прививанія, обнаруживалась настоящая оспа, а у тѣхъ, которые ему вовсе не подвергались, повѣтріе иногда ограничивалось варіолоидомъ. Въ Вологодской губерніи эпидемическое развитіе



оспы послѣдовало съ Марта въ Вельскомъ и Устюгскомъ уѣздахъ, преимущественно въ селеніяхъ казенныхъ крестьянъ. Нѣсколько позднѣе проникла эпидемія въ Архангельскую губернію: съ Мая начали тамъ показываться случаи натуральной оспы въ Пинежскомъ уѣздѣ, затѣмъ въ приморскихъ селеніяхъ Онежскаго, откуда она сообщалась Кемскому уѣзду, гдѣ и держалась все лѣто и осень 1856 года. Развитіе ея въ Архангельской губерніи совпадаетъ во времени съ усиленіемъ послабляющихъ горячекъ и воспаленій внутреннихъ органовъ, простуднаго происхожденія, отъ холодной и сырой погоды прошлаго лѣта. Въ Ярославской губерніи случаи оспы встрѣчались въ Январѣ и Февралѣ, но были по большей части запозные, и ограничивались прибывшими изъ западныхъ губерній рекрутами и нижними воинскими чинами. Въ Тверской губерніи оспа обнаружилась съ Января и въ Останковскомъ уѣздѣ приняла эпидемическій характеръ; въ то же время проникла она въ Тихвинскій уѣздъ, гдѣ продолжалась по Апрѣль съ особенною силою; оттуда перешла въ остальные уѣзды Новгородской губерніи и длилась въ нихъ до Іюля, а въ Ноябрь вновь показалась особенно въ Кириловскомъ уѣздѣ. Повѣтріе оспы поражало и тѣхъ, которые имѣли несомнѣнные знаки предохранительнаго прививанія; оспины по большей части были сливныя и показывались нерѣдко на слизистой оболочкѣ глазъ, рта, дыхательнаго горла и пищепріемника; притомъ смертность отъ нея была весьма значительна (22 : 100). Въ С.-Петербургской случаи натуральной оспы не прекращались всю весну и лѣто и начали учащаться съ половины Августа, современно съ усиленіемъ рожевиднаго процесса, ослабленіемъ холерной эпидеміи и началомъ кори и scarlatины. Въ Аппляндской губерніи ограниченная эпидемія натуральной и вѣтреной оспы обнаружилась вновь въ Августѣ и

продолжалась до половины Октября, особенно въ Перновскомъ уѣздѣ. Въ Исковской, Смоленской, Витебской, Гродненской, Ковенской, Виленской, Минской, Московской, Владимірской, Костромской, Казанской, Калужской, Тульской и Орловской губерніяхъ оспа ограничивалась спорадическими, но большей части заносными случаями, встрѣчавшимися во всѣ времена года и особенно весною и осенью; незначительное же повальное обнаруженіе вѣтреной оспы встрѣчалось въ продолженіе зимнихъ мѣсяцевъ на ограниченныхъ протяженіяхъ мѣстами въ Тульской, Московской и въ уѣздахъ Сѣвскомъ и Елецкомъ Орловской губерніи. Въ Самарской губерніи слабыя оспенныя эпидеміи были въ Февралѣ въ Ипколевскомъ и въ Іюлѣ въ Ставропольскомъ уѣздѣ. Въ Пензенской эпидемія показала въ Сентябрѣ и продолжалась всю осень, ограничиваясь уѣздами Нижнеомовскимъ и Наровчатскимъ, но сопровождаясь притомъ значительною смертностію (43:100).

Въ южной части Имперіи оспа во многихъ мѣстахъ также достигала эпидемическаго распространенія, именно:

Въ Черниговской губерніи, начавшись съ Декабря 1855 года, она держалась цѣлый годъ, подъ формою натуральной оспы и варіолоида, особенно въ уѣздахъ: Черниговскомъ, Стародубскомъ, Нѣжинскомъ, Мглинскомъ, Новозыбковскомъ и Городненскомъ.

Въ Полтавской губерніи оспа показала въ Полтавѣ и Константиноградѣ съ Января и держалась до Мая, поражая и тѣхъ, кто имѣлъ прививную; въ то же время въ Полтавѣ и сверхъ того въ Гадячѣ и Переяславскомъ уѣздѣ продолжалась повально вѣтреной оспы; въ Іюлѣ оспенная эпидемія проникла въ Ромны, гдѣ и длилась всю осень; въ уѣздѣ же Роменскомъ, равно какъ и въ Хорольскомъ, былъ современно съ нею варіолоидъ.

Въ Харьковской губерніи натуральная оспа показы-



валась съ Декабря въ уѣздахъ Ахтырскомъ между рекрутами и Зміевскомъ на мѣстныхъ жителяхъ, изъ коихъ многіе имѣли прививную оспу, но не достигнувъ значительнаго экстенсивнаго распространенія, скоро прекратилась, съ половины же Августа вновь показала въ многихъ мѣстахъ губерніи въ размѣрахъ спорадической болѣзни.

Въ Тамбовской губерніи натуральная и вѣтрная оспа началась зимою въ Кирсановскомъ и Борисоглебскомъ уѣздахъ и въ Апрѣлѣ проникла въ Липецкій уѣздъ; вообще же эпидемія продолжалась въ губерніи до Мая. Изъ сопредѣльныхъ съ Тамбовскою губерніею въ Воронежской эпидемическая оспа показала въ Іюлѣ въ уѣздахъ: Богучарскомъ, Воронежскомъ, Бирючинскомъ, Нижнедѣвницкомъ и Землянскомъ, гдѣ и держалась до осени, а въ Октябрѣ проникла въ Аткарскій уѣздъ Саратовской губерніи. Въ числѣ больныхъ оспою нерѣдко попадались и такіе, у которыхъ были несомнѣнные знаки предохранительнаго прививанія. Въ Курской губерніи также только осенью начали проявляться случаи вѣтрной и натуральной оспы.

Въ Екатеринославской губерніи повальная натуральная оспа обнаружилась съ Марта и продолжалась до Іюля въ уѣздахъ Екатеринославскомъ, Ново-Московскомъ, Верхнедніпровскомъ и Александровскомъ между мѣстными жителями и рекрутами, прибывшими изъ Вѣлкороссійскихъ губерній.

Въ Астраханской губерніи эпидемія натуральной оспы началась съ половины Декабря 1855 года въ Царевскомъ уѣздѣ, гдѣ и продолжалась до половины Марта. Въ концѣ Января она проникла въ Станицы Малодербетовскаго улуса и тамъ съ большою силою и особенною смертностію свирѣпствовала по 8 Сентября. Отсюда еще въ Іюлѣ натуральная оспа сообщила въ Калмыцкія кочевья и въ Пятигорскій уѣздъ Ставропольской губерніи, гдѣ

продолжалась до осени, знаменуясь также сильною смертною. Въ началѣ осени эпидемическая натуральная оспа распространилась въ Тифлискомъ, Сигнахскомъ и Горійскомъ уѣздахъ Тифлиской губерніи и въ самомъ Тифлисѣ; но при усиленныхъ врачебно-полицейскихъ мѣрахъ въ Октябрѣ начала постепенно ослабѣвать и скоро потеряла свой эпидемическій характеръ, такъ что въ концѣ отчетнаго года уже рѣдко попадались даже отдѣльные случаи оспы. Преимущественно поражала она взрослыхъ и въ особенности выходцевъ изъ Имеретіи и Мингреліи, не подвергавшихся въ дѣтствѣ предохранительному прививанію. Но вообще смертность отъ нея была относительно менѣе, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ.

По мѣрѣ удаленія на западъ въ южной полостъ Имперіи оспенное повѣтріе дѣйствовало слабѣе: въ Кіевской губерніи оно обнаружилось только осенью 1856 года и ограничилось небольшимъ протяженіемъ Кіевского уѣзда; въ Херсонской—весною показались случаи натуральной оспы въ Ананьевскомъ уѣздѣ исключительно въ Еврейскомъ населеніи, но повѣтріе не распространилось далѣе и только вновь осенью въ слабой степени оспа обнаружилась въ Одессѣ; въ Таврической губерніи съ Марта до Іюля попадались случаи сильного заболѣванія ею въ Бердянскомъ и Мелитопольскомъ уѣздахъ, но число ихъ было весьма незначительно (не болѣе 87); въ Ноябрѣ же вновь показались случаи оспы, занесенной изъ Екатеринославской губерніи. Въ Волынской и Подольской губерніяхъ натуральная оспа вовсе не показывалась и отраженіе повѣтрія ея изъ сосѣднихъ губерній ограничивалось спорадическими случаями варіолы, встречавшимися весною и лѣтомъ и то изрѣдка; наконецъ въ Бессарабской области оспа попадалась весною въ одномъ Сорокинскомъ уѣздѣ, въ крайне-ограниченномъ числѣ спорадическихъ случаевъ.



Такимъ образомъ, какъ видно изъ вышеизложеннаго, оспенныя эпидеміи въ истекшемъ году съ бѣльшею силою распространенія господствовали въ восточной половинѣ Европейской части Имперіи, гдѣ были они отъ сѣверныхъ до самыхъ южныхъ предѣловъ; въ западной же половинѣ развитіе ихъ было менѣе значительно и притомъ почти ограничивалось сѣвѣрною и частію средней полосы ея. Въ Сибири оспенныхъ эпидемій не было вовсе.

Смертность отъ оспы равнялась:

въ губерніяхъ Астраханской . . . . .	50:100
» » Пензенской . . . . .	43:100
» » Ставропольской . . . . .	30:100
» » Таврической . . . . .	28:100
» » Тверской, С.-Петербургской и	
» » Орловской . . . . .	20:100
» » Олонецкой, Черниговской и	
Новгородской . . . . .	16,6:100
» » Архангельской . . . . .	14,3:100
» » Эстляндской, Лифляндской и	
Екатеринославской . . . . .	12,5:100
» » Московской . . . . .	11,5:100
» » Харьковской . . . . .	11,1:100
» » Воронежской . . . . .	10,5:100
» области Бессарабской . . . . .	10:100
въ губерніяхъ Тамбовской . . . . .	9,9:100
» » Одессѣ . . . . .	8,3:100
» » Тифлиской . . . . .	7,5:100
» » Подольской . . . . .	6,6:100
» » Полтавской . . . . .	6:100

## VII. КОРЬ.

Въ теченіи 1856 года корь показывалась повально на бѣльшей части протяженія Имперіи. Съ самаго начала

зимы, отличавшейся многократными и быстрыми измѣненіями температуры и степени сырости воздуха, повальная корь показала въ губерніяхъ: Вологодской, Костромской, С.-Петербургской и Олонецкой. Постепенно распространяясь въ экстенсивномъ отношеніи и переходя изъ одного уѣзда въ другой, она держалась въ нихъ всю зиму и большую часть весны, не достигая впрочемъ особенной злокачественности. Въ Январѣ корь проникла въ губерніи Гродненскую, Московскую, Тульскую, Орловскую, Тамбовскую, Кіевскую, Полтавскую, Подольскую, Херсонскую и Таврическую до Симферополя; въ Февралѣ она обнаружилась въ губерніяхъ Витебской и Ковенской; въ Мартѣ—въ Курляндской, Псковской, Смоленской, Калужской и области Бессарабской; въ Апрѣлѣ—въ губерніи Курской и на Кавказѣ въ Дербентской; въ Маѣ—въ Екатеринбургской, Владимірской и на Кавказѣ въ Кутаисской; въ Іюнѣ — въ Тверской, Ставропольской, Нижегородской, Казанской и Оренбургской; въ Іюлѣ — въ Тобольской и Новгородской; въ Августѣ—въ Харьковской, Воронежской и на Кавказѣ въ Шемахинской; въ Сентябрѣ — въ Тифлиской и Могилевской и въ Ноябрьѣ—въ Черниговской и Астраханской губерніяхъ.

При такомъ неодновременномъ обнаруженіи эпидеміи кори продолжались неодинаково долго. Всего долѣе держались зимнія эпидеміи въ сѣверныхъ губерніяхъ: въ С.-Петербургской болѣзнь длилась цѣлый годъ, только лѣтомъ сдѣлалась слабѣе, а въ Сентябрѣ вновь усилилась; въ губерніи Олонецкой эпидемическая корь продолжалась 7 мѣсяцевъ и только прекратилась къ 26 Іюня; въ Вологодской и Костромской она длилась 5 мѣсяцевъ и исчезла только къ Маю. Затѣмъ особенною длительностію отличалась эпидемія кори въ Гродненской губерніи, гдѣ случаи ея встрѣчались весь годъ и только въ Августѣ и Сентябрѣ начали дѣлаться рѣже. Изъ остальныхъ губерній



въ средней и южной полосѣ Имперіи зимнія эпидеміи кори продолжались 4 недѣли въ Кіевской, 2 мѣсяца въ Таврической и Херсонской, 3 мѣсяца въ Московской, Тульской и Витебской, 4 мѣсяца въ Подольской, 5 мѣсяцевъ въ Полтавской и Орловской и 6 мѣсяцевъ въ Тамбовской губерніяхъ. Прекращеніе ихъ послѣдовало къ Февралю въ Кіевской, къ Марту — въ Таврической и Херсонской, къ Апрѣлю — въ Московской и Тульской, къ Маю — въ Витебской и Подольской, къ Іюню — въ Полтавской и Орловской и къ Іюлю — въ Тамбовской губерніяхъ. Весеннія эпидеміи кори были вообще значительно слабѣе зимнихъ и срокъ ихъ продолженія былъ менѣе: при менѣе значительномъ экстенсивномъ распространеніи онѣ продолжались только по 4 недѣли въ Курляндской и Екатеринославской и по 2 мѣсяца въ Калужской и Владимірской губерніяхъ; но въ Бессарабской Области и губерніяхъ Курской, Смоленской и Псковской онѣ длились въ продолженіе 3 мѣсяцевъ и прекратились только къ 1 Іюня. Вообще съ наступленіемъ лѣтняго времени корь значительно ослабѣла и на большей части протяженія Имперіи прекратилась вовсе, а тамъ, гдѣ еще продолжалась или куда вновь проникла, была замѣтно слабѣе въ экстенсивномъ распространеніи своемъ. Начавшись съ Іюня въ Нижегородской и Казанской губерніяхъ, она ограничилась въ нихъ 6-ти недѣльнымъ срокомъ продолженія, а въ Новгородской и Тверской губерніяхъ держалась въ слабой степени въ теченіи 2-хъ мѣсяцевъ. Только въ Ставропольской губерніи, при повсемѣстномъ распространеніи, незначительномъ впрочемъ по численности больныхъ, корь продолжалась вплоть до Октября. Осенью эпидеміи ея обнаружались въ губерніяхъ: Могилевской, Черниговской, Харьковской, Воронежской, Астраханской, на Кавказѣ въ Тифлисской и Шемахинской и вновь откры-

лись въ Псковской, Тамбовской, Курской и Полтавской губерніяхъ.

Степень мѣстнаго распространенія эпидемій кори была различна: въ нѣкоторыхъ губерніяхъ случаи ея были повсемѣстно разсѣяны, въ другихъ она ограничивалась небольшими протяженіями одного или нѣсколькихъ уѣздовъ. Изъ мѣстностей послѣдней категоріи въ Херсонской губерніи корь въ 1856 году ограничилась однимъ Херсонскимъ уѣздомъ и Одессою, въ Черниговской — Нѣжинскимъ, въ Екатеринославской — Екатеринославлемъ и уѣздомъ его, въ Нижегородской — уѣздомъ Лукояновскимъ, въ Кіевской — Радомысльскимъ, въ Смоленской — Сычевскимъ, въ Астраханской — Малодербетевскимъ улусомъ, въ Таврической — городомъ Симферополемъ, въ Новгородской — уѣздомъ Устюжскимъ, въ Тверской и въ Воронежской губерніями городами съ ихъ уѣздами, въ Орловской — уѣздомъ Елецкимъ, въ Бессарабской Области Кишиневскимъ и Бендерскимъ, въ Калужской губерніи — Жиздринскимъ, въ Тамбовской — губернскимъ городомъ и его уѣздомъ, а также Лебедянскимъ и Моршанскимъ.

Самое свойство эпидемической кори было также не одинаково: въ слабой степени интенсивнаго развитія она обнаруживалась въ Одессѣ и Симферополѣ, а также въ губерніяхъ: Кіевской, Орловской, Черниговской, Витебской, Минской, Московской, Воронежской, Екатеринославской, Тифлиской, Псковской, Курляндской, Новгородской, Олонецкой, Тверской, Курской, Могилевской и Костромской. Особою злокачественностію отличались эпидеміи кори въ Бессарабской области и губерніяхъ: Нижегородской, Калужской, Херсонской (кроме Одессы), Полтавской, Шемахинской, Гродненской, С.-Петербургской, Подольской и Ровенской. Смертность отъ нихъ представляла слѣдующія содержанія:



На 100 больныхъ умерло		
въ губерніяхъ:	Нижегородской . . . . .	50
»	» Калужской . . . . .	43
» области	Бессарабской . . . . .	25
» губерніяхъ:	Херсонской . . . . .	14,3
»	» Полтавской . . . . .	12,5
»	» Шемахинской . . . . .	11,5
»	» Гродненской . . . . .	11,1
»	» Подольской, С.-Петербургской и Ко- венской . . . . .	9,9
»	» Тобольской . . . . .	8,3
»	» Кутапской . . . . .	7,7
»	» Тамбовской, Ставропольской и Смо- ленской . . . . .	7,1
»	» Харьковской и Владимірской . . . . .	5,3
»	» Новгородской, Олонецкой и Тверской . . . . .	4,5
»	» Курляндской . . . . .	4
»	» Тифлиской . . . . .	3
»	» Воронежской . . . . .	2,9
»	» Московской . . . . .	2,5
»	» Минской . . . . .	2
»	» Витебской . . . . .	1,8
»	» Орловской и Таврической . . . . .	1,7
»	» Кіевской . . . . .	1,6
»	» Одессѣ . . . . .	1,4

Вовсе не показывались эпидеміи кори въ губерніяхъ Архангельской, Ярославской, Пермской, Вятской, Симбирской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Рязанской, Вольнской, Виленской, Эстляндской, Лифляндской и въ Сибири въ Томской и Иркутской.

## VIII. СКАРЛАТИНА.

Скарлатина началась въ видѣ разсѣянныхъ спорадическихкихъ случаевъ еще въ Декабрѣ 1855 года въ уѣздахъ

Эрвенскомъ Эстляндской и Валкскомъ и Венденскомъ Лифляндской губерніи. Постепенно усиливаясь при ненастной и переменчивой погодѣ, уже въ Январѣ 1856 года она скоро приняла размѣры эпидемической болѣзни и распространилась преимущественно въ послѣдней губерніи, гдѣ сверхъ двухъ вышеозначенныхъ уѣздовъ заняла въ одно время Рижскій, Вольмарскій, Верроскій и Лемзальскій. Почти въ то же время показалась она въ С.-Петербургской, затѣмъ въ Вологодской и Костромской, а въ Февралѣ въ Курляндской и въ слабой степени въ Олонецкой губерніяхъ. При значительномъ экстенсивномъ распространеніи скарлатина продолжалась въ нихъ до наступленія теплаго весенняго времени; въ Маѣ она начала исчезать и совершенно прекратилась въ Эстляндской, Вологодской и Костромской губерніяхъ, но въ С.-Петербургской, Курляндской и Лифляндской мѣстами во все лѣто продолжалась въ ограниченномъ числѣ разсѣянныхъ притомъ довольно рѣдкихъ случаевъ. Съ особеннымъ упорствомъ она держалась въ Лемзалѣ, въ Венденскомъ и Рижскомъ уѣздахъ Лифляндской и на всемъ протяженіи Курляндской губерній, кромѣ 3-хъ уѣздовъ, а именно: Фридрихштатскаго, Илуктскаго и Виндавскаго, въ которыхъ ея вовсе не было. Но не смотря на большую численность больныхъ, эпидеміи скарлатины въ этихъ двухъ губерніяхъ не отличались особенною злокачественностію; смертность отъ нихъ доходила до 14,3 : 100 въ Курляндской и 12,5 : 100 въ Лифляндской губерніяхъ. Въ числѣ характеристическихъ особенностей эпидемической скарлатины замѣчалась склонность къ частымъ и раннимъ исходамъ ея въ водянку.

Осенью и особенно съ Октября случаи скарлатины начали вновь учащаться въ С.-Петербургской, Эстляндской, Курляндской и Лифляндской губерніяхъ и показались въ Псковѣ.



Въ среднеполосныхъ и южныхъ губерніяхъ скарлатина въ теченіи истекшаго года появлялась въ слабой степени. Зимою проникла она изъ С.-Петербурга въ Москву и въ слѣдъ затѣмъ показалось нѣсколько разсѣянныхъ случаевъ ея въ Тульской губерніи въ Мартѣ и Апрѣлѣ, одновременно съ корью, потомъ въ Орловской, Смоленской и Курской, а въ Маѣ въ Витебской губерніи, вмѣстѣ съ оспою, но спорадическими случаями и ограничилось ея распространеніе по этимъ губерніямъ. Въ Кіевской губерніи также съ начала Мая показалась скарлатина съ тифознымъ характеромъ, но ограничилась однимъ Кіевскимъ уѣздомъ и въ половинѣ Іюля прекратилась совершенно. Въ концѣ Августа при неблагоприятныхъ атмосферныхъ условіяхъ скарлатинная эпидемія, давно небывавшая, обнаружилась во Владимірѣ и Переяславлѣ Владимірской губерніи; здѣсь она продолжалась всю осень и при незначительномъ экстенсивномъ распространеніи знаменовалась сильною смертностію 20 : 100. Въ общемъ числѣ мѣстныхъ случаевъ нерѣдко встрѣчались такіе, въ которыхъ вовсе сыпь не показывалась и болѣзнь ограничивалась страданіемъ горла и опухолью подчелюстныхъ железъ. На исходъ въ водянку и смертность отъ болѣзни эта разность не имѣла, повидимому, никакого вліянія. Въ другихъ мѣстахъ Владимірской губерніи скарлатины притомъ вовсе не было. Въ Сентябрѣ скарлатина въ слабой степени появилась въ Могилевской губерніи и въ Пензѣ, въ Ноябрѣ — въ Шѣжинскомъ уѣздѣ Черниговской губерніи съ совершенно доброкачественнымъ характеромъ, въ Октябрѣ же вновь въ Москвѣ. Разсѣянные спорадическіе случаи скарлатины встрѣчались сверхъ того зимою 1855—1856 г. и весною въ Одессѣ и въ Подольской, а съ половины Августа въ Харьковской губерніяхъ; — они ограничивались весьма незначительнымъ числомъ больныхъ и слабымъ развитіемъ болѣзненнаго процесса.

Въ восточной части Имперіи скарлатина не показывалась вовсе до Іюля; въ теченіи этого мѣсяца начали появляться спорадическіе случаи ея въ Казанской губерніи, съ половины его слабая скарлатинная эпидемія обнаружилась въ Красноуфимскомъ уѣздѣ Пермской, а въ концѣ Іюля въ Черноярскомъ уѣздѣ Астраханской и въ разныхъ мѣстахъ Ставропольской губерніи. Эти эпидеміи продолжались до Октября. Характеръ ихъ былъ различенъ: тогда какъ въ Ставропольской губерніи смертность отъ скарлатины не превосходила содержанія 5,8:100, въ Астраханской оно равнялось 40:100. Въ этой последней губерніи скарлатина поражала даже грудныхъ младенцевъ, а въ нѣсколькихъ случаяхъ обнаружилась на совершенно-лѣтнихъ. Въ числѣ признаковъ ея самымъ постояннымъ было страданіе горла, нерѣдко усложнявшееся опухолью подчелюстныхъ железъ. Слученіе кожицы и водянка въ періодъ кризовъ были у всѣхъ, начинались обыкновенно на 10—12 сутки и продолжались дней 10. Полное теченіе болѣзни длилось по большей части 4 недѣли; горячка, сопровождавшая сыпь, имѣла первичный характеръ, а потому мозговые явленія и бредъ не рѣдко были весьма сильны. Въ числѣ случаевъ несчастнаго исхода встрѣчалось нѣсколько съ омертвѣніемъ сильно распухавшихъ подчелюстныхъ железъ и съ обнаженіемъ глубокихъ мышцъ и сосудовъ шеи. Предъ прекращеніемъ скарлатинной эпидеміи во всемъ Черноярскомъ уѣздѣ показался сильный гриппъ.

Въ Сибири распространеніе скарлатины ограничивалось въ истекшемъ году одною Иркутскою губерніею и Кяхтинскимъ градоначальствомъ. Въ Кяхтѣ спорадическіе случаи ея появлялись всю зиму, современно съ эпидемическимъ развитіемъ красухи, жабъ и воспаления предъушныхъ железъ. Въ Иркутской губерніи они начали показываться съ Февраля, въ Сентябрѣ же болѣзнь



усилилась до эпидемическаго развитія въ Нижнеудинскомъ округѣ. Здѣсь въ числѣ первыхъ признаковъ являлись кашель и насморкъ, вмѣстѣ съ опухолью железъ, затруднявшею глотаніе; затѣмъ выступала по тѣлу сыпь, иногда на лицѣ, шеѣ, туловищѣ и конечностяхъ, иногда только на лицѣ и шеѣ. Бывали случаи, въ которыхъ сыпи вовсе не показывалось, что также перѣдко замѣчалось въ осенней эпидеміи прошлаго года въ Владимірской и Курляндской губерніяхъ. При томъ у иныхъ вмѣстѣ съ обнаруженіемъ скарлатинныхъ пятенъ появлялись на тѣлѣ пузырьки, наполненные слизистою жидкостью. Горячка у всѣхъ больныхъ имѣла нервный характеръ. Въ періодѣ пеходовъ ни у одного больного не замѣчалось водянки, что составляетъ замѣчательную разность съ скарлатинными эпидеміями 1856 года въ Европейской части Имперіи. Смертность отъ эпидемической скарлатины въ Иркутской губерніи равнялась 20 : 100; прекращеніе ея послѣдовало около 9 Октября.

Изъ прочихъ видовъ острыхъ сыпей показывались въ видѣ мѣстныхъ ограниченныхъ эпидемій красуха въ Одессѣ зимою и въ Эстляндской губерніи въ Октябрѣ и Ноябрѣ, просянка (*miliaria*) зимою въ Иркутской и весною въ Смоленской губерніяхъ и крапивная сыпь (*urticaria*) въ Тульской въ Январѣ и въ Курляндской губерніи въ Маѣ. — *Remphigus* встрѣчался довольно часто въ продолженіе Октября въ Эстляндской губерніи, современно съ красухою, скарлатиною и оспой.

## IX. РОЖА.

Рожѣ въ продолженіе зимы истекшаго года эпидемически нигдѣ не обнаруживалась; но съ Марта случаи ея начали часто появляться въ Калужской, при сильномъ господствѣ простудныхъ воспалительныхъ болѣзней и

ревматизмовъ, и въ Ковенской губерніи, современно съ корью и началомъ перемежающихся лихорадокъ. Въ Апрѣлѣ рожа обнаружилась въ Курской губерніи, гдѣ въ то время были уже довольно сильны перемежающіяся лихорадки и желчные поносы; параллельно съ ними и при усиленіи ревматизмовъ она продолжалась здѣсь все лѣто. Въ Таврической губерніи также въ началѣ весны и особенно въ Апрѣлѣ часто встрѣчались случаи рожи, преимущественно на нижнихъ конечностяхъ. Въ Іюнѣ, по прекращеніи кори, рожа часто показывалась въ Екатеринославской губерніи, что продолжалось до Августа, современно съ сильнымъ развитіемъ перемежающейся лихорадки и кроваваго поноса. Здѣсь мѣстный болѣзненный процессъ обыкновенно локализовался на лицѣ и верхнихъ конечностяхъ. Въ Іюлѣ и Августѣ при знойныхъ дняхъ и холодныхъ ночахъ рожа обнаруживалась довольно сильно въ Харьковской губерніи; въ Сентябрѣ и Октябрѣ случаи ея сдѣлались рѣже, а въ Ноябрѣ вновь чаще, при чемъ нерѣдко замѣчалось появленіе ея на субъектахъ, страдавшихъ другими болѣзнями и удаленныхъ отъ вліянія паружныхъ причинъ, которыя бы могли содѣйствовать ея происхожденію. Осенью случаи рожи особенно часто встрѣчались въ губерніяхъ Саратовской и Гродненской, при замѣтномъ въ то же время преобладаніи гастрическаго и желчнаго характера болѣзней; въ Минской и Нижегородской, непосредственно по прекращеніи холерныхъ случаевъ и въ Курской вновь въ Ноябрѣ, современно съ усиленіемъ кроваваго поноса.

## Х. КРУПЪ ЗѢВА И ДЫХАТЕЛЬНАГО ГОРЛА.

Простудныя воспаленія зѣва, гортани и дыхательнаго горла встрѣчались повсемѣстно въ продолженіе зимняго, весенняго и осенняго времени года, нерѣдко усп-



ливаясь до повального распространения. Характеръ ихъ повсюду былъ по преимуществу катарральнымъ. Мѣстами только онъ возвышался до дифтерического, притомъ въ сопровожденіи съ горячкою адинамического свойства. Въ этомъ видѣ встрѣчались повальныя, ограничившіяся небольшимъ экстенсивнымъ распространениемъ, крупозныя жабы зимою въ Витебской и Курской губерніяхъ, съ Сентября въ Лифляндской и затѣмъ въ сопредѣльныхъ съ нею Курляндской, Ковенской и Гродненской губерніяхъ, гдѣ и продолжались всю осень. Развитію ихъ въ Гродненской и Лифляндской губерніяхъ предшествовали частые случаи повальной плѣсневки (*Soor, stomatitis exsudativa*) и рожи у дѣтей, появлявшіяся особенно часто въ Рижскомъ уѣздѣ. Въ Ковно и Шавляхъ предъ обнаруженіемъ дифтерического характера жабъ развилось въ сильной степени эпидемическое воспаленіе подъязычныхъ, предъшнихъ и подчелюстныхъ железъ. Смертность отъ дифтерическихъ жабъ была:

4,5 : 100	въ Витебской губерніи,
12,5 : 100,	» Лифляндской »
15,3 : 100,	» Курляндской »
и 22,2 : 100,	» Ковенской »

Крупозныя воспаленія дыхательнаго горла встрѣчались зимою въ Тульской губерніи, въ Каширскомъ уѣздѣ, въ видѣ мѣстной эпидеміи и спорадически въ губерніяхъ Гродненской, Вологодской и Курляндской. Въ послѣдней крупъ господствовалъ современно съ скарлатиною, въ Гродненской въ одно время съ корью, въ Вологодской губерніи вмѣстѣ съ обѣими сыпями. Въ Подольской губерніи крупъ господствовалъ на дѣтяхъ съ особенною жестокостію въ Мартѣ и Апрѣлѣ, во время таянія снѣговъ и вновь появился въ Октябрѣ и Ноябрѣ. Въ Маѣ, Іюнѣ, Іюлѣ и вновь въ Октябрѣ разсѣянные случаи его встрѣчались нерѣдко въ сопредѣльной съ Подольскою

Волынской губерніи. Съ Іюня повѣтріе его показалось въ уѣздахъ Могилевскомъ, Быховскомъ и Мстиславскомъ Могилевской губерніи, гдѣ оно держалось до зимы; въ Сентябрѣ и Октябрѣ — въ Лифляндской губерніи и въ Ноябрѣ — въ губерніи Ковенской, особенно въ Ковно и Шавляхъ. Здѣсь эпидемія крупа продолжалась 6 недѣль, современно съ дифтерическими жабами. Число больныхъ въ этихъ обоихъ городахъ дошло до 267, изъ нихъ умерло 120.

Содержаніе смертности отъ крупа было:

въ губерніяхъ:	Ковенской	.....	45,4 : 100
»	»	Подольской	..... 38,4 : 100
»	»	Гродненской	..... 28,5 : 100
»	»	Тульской	..... 25 : 100
»	»	Курляндской	..... 20 : 100
»	»	Лифляндской	..... 16,6 : 100

## XI. ПОВѢТРЕННОЕ ВОСПАЛЕНІЕ ПРЕДЪУШНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (MUMPS, PAROTITIS EPIDEMICA).

При постоянно холодной и сырой погодѣ воспаленіе предъушной железы въ продолженіе цѣлаго года часто показывалось въ Томской губерніи, по большей части въ усложненіи съ жабами и воспалительною опухолью подчелюстныхъ и иногда паховыхъ железъ. Въ Кяхтинскомъ градоначальствѣ оно продолжалось въ видѣ повальной болѣзни въ теченіи Декабря 1855 и Января 1856 года и сверхъ того въ то же время разсѣянные перѣдкіе случаи его встрѣчались въ Олонецкой и Гродненской губерніяхъ. Въ Апрѣлѣ повѣтренное воспаленіе предъушной железы начало часто показываться въ Тульской, какъ спутникъ въ то время господствовавшихъ ревматическихъ горячекъ, и въ Эстляндской губерніи въ Гарріенскомъ уѣздѣ. Въ послѣдней оно обыкновенно сопровож



далось признаками раздраженія мозговыхъ оболочекъ, иногда усложнялось воспаленіемъ яичекъ у мужчинъ и нерѣдко притомъ обнаруживало склонность къ тифозному характеру. Въ Маѣ и лѣтомъ воспаленіе предъушной железы составляло довольно частый спутникъ повальныхъ жабъ во Владимірской губерніи, современно съ развитіемъ кори и предшествуя скарлатинной эпидеміи. Въ Сентябрѣ и Октябрѣ повѣтрешное воспаленіе предъушныхъ, подчелюстныхъ и подязычныхъ железъ было сильно развито въ Ковенской губерніи, преимущественно въ Ковно и Шавляхъ. Ему подвергались не одинъ дѣтскій, но всѣ возрасты; въ обоихъ городахъ было до 277 случаевъ этой болѣзни; только 5 изъ нихъ окончилась смертію. Въ то же время повѣтріе его вновь распространилось въ сопредѣльной съ Ковенскою Гродненской губерніи, одновременно съ усиленіемъ жабъ, рожи и кори. Въ Ноябрь воспаленіе предъушной железы встрѣчалось часто въ Харьковской губерніи, гдѣ въ то же время были сильно развиты гриппъ, жаба и рожа.

## ХII. КОКЛЮШЪ.

Коклюшъ обнаруживался въ теченіи истекшаго года во многихъ мѣстахъ Имперіи и съ особенною силою и длительностію въ западной половѣ ея. Зимою случаи судорожнаго кашля встрѣчались въ губерніяхъ Ярославской, Костромской, Орловской и Курской, но въ концѣ ея прекратились, не достигши эпидемическаго распространенія. Въ это же время года коклюшъ показался въ Вольнской губерніи, гдѣ продолжался всю зиму, весну и лѣто вплоть до Сентября. Въ концѣ зимы онъ распространился по Гродненской губерніи и съ особенною силою продолжался въ Мартѣ, Апрѣлѣ, Маѣ, Августѣ и Сентябрѣ, слабѣе въ Іюнѣ и Іулѣ, прекратился же только

въ Октябрѣ. Смертность отъ него равнялась 7,7: 100. Затѣмъ въ Мартѣ эпидемія коклюша сообщилась Курляндской и Минской губерніямъ. Въ первой она заняла города Митаву, Баускъ, Илукстъ, Гробинь и уѣзды Гробинскій и Тукумскій, гдѣ и продолжалась до Іюля, а въ Ноябрѣ вновь возвратилась; въ Минской же губерніи эпидемія держалась повально на всемъ ея протяженіи и во все продолженіе истекшаго года. Такого сильнаго коклюша никто въ этихъ губерніяхъ не запомнитъ; заболѣваніе имъ не ограничивалось одними дѣтьми, но обнаруживалось во всѣхъ возрастахъ и даже старческомъ. Смертность отъ него доходила до 13,5: 100 въ Минской и до 5,5: 100, въ Курляндской губерніи. Въ Маѣ коклюшъ сообщилась Ковенской губерніи и продолжался въ ней съ особенною силою въ Ковно и Шавляхъ, все лѣто и осень до конца Ноября. Число больныхъ имъ въ губерніи простиралось до 1,075, умерло же изъ нихъ 59, что составляетъ содержаніе 5,5: 100. Также въ Маѣ коклюшъ показался въ Смоленской губерніи, но былъ слабо развитъ и ограничился одними лѣтними мѣсяцами. Въ Іюлѣ эпидемія коклюша появилась въ Эстляндской губерніи исключительно въ Эрвенскомъ уѣздѣ; она продолжалась недолго и не была злокачественна; въ то же время изъ Смоленской губерніи коклюшъ проникъ въ Московскую и Рязанскую, гдѣ держался все лѣто и осень въ ограниченныхъ размѣрахъ и вовсе не сопровождаясь смертностію. Въ Сентябрѣ эпидемія коклюша распространилась по Лифляндской въ уѣздахъ Лемзальскомъ, Венденскомъ, Черновскомъ, Верроскомъ и Рижскомъ, по Могилевской и въ слабой степени обнаружилась въ Псковской, а также въ одномъ, именно въ Каширскомъ, уѣздѣ Тульской губерніи. Въ Лифляндской губерніи коклюшъ не прекратился до зимы; смертность отъ него при значительномъ экстенсивномъ распространеніи рав-



нялась 3,7:100; въ Могилевской губерніи численность заболѣвавшихъ имъ была вдвое менѣе, но смертность отъ него была значительна и доходила до содержанія 13,5:100. Въ концѣ осени разсѣянные случаи коклюша, сверхъ вышепоименованныхъ губерній, гдѣ еще продолжались эпидеміи его, начали обнаруживаться въ Иркутской и въ Симферополь Таврической губерніи.

Въ продолженіе 1856 года въ гражданскихъ больницахъ движеніе цифры больныхъ было слѣдующее:

*1) въ Архангельской губерніи:*

Въ больницахъ:	пользов.	выздор.	умерло.	остал.
Архангельской.....	322	256	42	24
Кемской.....	98	80	5	13
Мезенской.....	51	44	4	3
Онежской.....	85	68	8	9
Пинежской.....	49	44	3	2
Холмогорской.....	67	52	8	7
Шенкурской.....	87	78	4	5
Всего	759	622	74	63

*2) въ Астраханской губерніи:*

Въ больницахъ:				
Астраханской.....	745	506	143	96
Центрального Каранти- на въ Астрахани.....	145	131	4	10
Енотаевской.....	118	93	15	10
Красноярской.....	65	50	7	8
Царевской.....	79	72	5	2
Черноярской.....	194	170	12	12
Всего	1,346	1,022	186	138

3) въ Бессарабской области:

Въ больницахъ:	пользо.	выздор.	умерло.	остат.
Кишиневской городской.	901	729	101	71
» Еврейской.	351	274	44	33
Акерманской.....	270	223	19	28
Всего	1,522	1,226	164	132

4) въ Виленской губернии:

Въ больницахъ:				
Виленской Савичъ.....	1,395	1,108	209	78
» Св. Іакова...	797	584	86	127
» Еврейской..	2,946	2,433	388	125
Вилейской.....	707	595	44	68
Дисненской.....	315	241	42	32
Лидской.....	564	471	53	40
Ошмянской.....	855	735	32	88
Свенцянской.....	889	738	43	108
Трокской.....	312	243	40	29
Всего	8,780	7,148	937	695

5) въ Витебской губернии:

Въ больницахъ:				
Витебской.....	367	275	44	48
Велижской.....	144	111	11	22
Городокской.....	172	141	18	13
Дризенской.....	469	378	72	19
Депельской.....	239	187	25	27
Люцинской.....	276	246	20	10
Невельской.....	347	308	22	17
Полоцкой.....	870	752	93	25
Рѣжницкой.....	626	500	108	18
Себежской.....	193	160	21	12
Суражской.....	145	127	12	6
Всего	3,848	3,185	446	217



6) въ Владимірской губерніи:

Въ больницахъ:	пользов.	выздор.	умерло.	остат.
Владимірской . . . . .	1,654	1,350	203	101
Александровской . . . . .	160	146	6	8
Вязниковской . . . . .	332	291	28	13
Гороховецкой . . . . .	199	162	28	9
Ковровской . . . . .	182	152	15	15
Меленковской . . . . .	52	39	7	6
Муромской . . . . .	199	163	26	10
Переяславской . . . . .	238	189	40	9
Покровской . . . . .	413	329	67	17
Судогодской . . . . .	67	55	8	4
Суздальской . . . . .	146	126	14	6
Шуйской . . . . .	185	151	9	25
Юрьевской . . . . .	83	67	9	7
Всего	3,910	3,220	460	230

7) въ Вологодской губерніи:

Въ больницахъ:				
Вологодской . . . . .	1,408	1,203	147	58
Вельской . . . . .	78	65	6	7
Грязовецкой . . . . .	62	50	6	6
Кадниковской . . . . .	115	97	9	9
Никольской . . . . .	70	60	8	2
Сольвычегодской . . . . .	65	56	5	4
Тотемской . . . . .	109	87	14	8
Устюгской . . . . .	168	136	24	8
Устьсысольской . . . . .	118	98	8	12
Яренской . . . . .	72	58	5	9
Всего	2,265	1,910	232	123

8) въ Волынской губерніи:

Въ больницахъ:				
Житомирской . . . . .	839	659	97	83
Владимірской . . . . .	506	418	55	33

	пользо.	выздор.	умерло.	остал.
Дубенской . . . . .	497	427	45	25
Заславльской . . . . .	258	215	23	20
Ковельской . . . . .	353	307	31	15
Кременецкой . . . . .	544	467	39	38
Луцкой . . . . .	149	111	23	15
Новоградволинской . . .	751	642	95	14
Овручской . . . . .	207	176	22	9
Острогской . . . . .	614	500	75	39
Ровенской . . . . .	322	264	33	25
Староконстантиновской.	756	643	81	32
Всего	5,796	4,829	619	348

9) въ Воронежской губернии:

Въ больницахъ:				
Воронежской . . . . .	7,424	6,333	422	669
Бирючской . . . . .	408	385	16	7
Бобровской . . . . .	228	211	11	6
Богучарской . . . . .	376	340	31	5
Валуйской . . . . .	221	205	10	6
Задонской . . . . .	310	293	16	1
Землянской . . . . .	133	111	14	8
Коротоякской . . . . .	192	151	10	31
Нижнедѣвницкой . . . . .	242	224	15	3
Новохоперской . . . . .	295	240	44	11
Острогожской . . . . .	367	309	18	40
Павловской . . . . .	260	244	12	4
Всего	10,456	9,046	619	791

10) въ Вятской губернии:

Въ больницахъ:				
Вятской . . . . .	2,819	2,525	136	158
Глазовской . . . . .	364	343	14	7
Елабужской . . . . .	393	354	26	13



	пользо- ван.	выздор.	умерло.	остал.
Котельничской . . . . .	231	205	19	7
Малмыжской . . . . .	583	503	55	25
Нолинской . . . . .	239	211	16	12
Орловской . . . . .	249	219	14	16
Сарапульской . . . . .	382	330	32	20
Слободской . . . . .	235	215	12	8
Уржумской . . . . .	149	133	14	2
Яренской . . . . .	301	244	42	15
Всего	5,945	5,282	380	283

*11) въ Гродненской губернии:*

*Въ больницахъ:*

Гродненской . . . . .	522	421	44	57
Бѣлостокской . . . . .	274	209	39	26
Бѣльской . . . . .	736	616	95	25
Брестской . . . . .	180	112	53	15
Волковыжской . . . . .	1,095	862	198	35
Кобринской . . . . .	691	462	179	50
Пружанской . . . . .	256	198	27	31
Слонимской . . . . .	850	675	98	77
Сокольской . . . . .	200	166	15	19
Всего	4,804	3,721	748	335

*12) въ Екатеринославской губернии:*

*Въ больницахъ:*

Екатеринославской . . . . .	3,039	2,541	241	257
Таганрогской . . . . .	734	588	71	75
Александровской . . . . .	1,005	784	158	63
Бахмутской . . . . .	1,402	1,150	160	92
Верхнеднѣпровской . . . . .	894	780	89	25
Новомосковской . . . . .	1,467	1,343	107	17
Павлоградской . . . . .	1,137	924	172	41

	пользо- в.	выздор.	умерло.	остал.
Ростовской (открытойсь 1 Апрѣля 1856 г.) . . .	194	116	42	36
Славяносербской . . . . .	700	564	58	78
Всего	10,572	8,790	1,098	684

13) въ Забайкальской области:

Въ больницахъ:				
Верхнеудинской . . . . .	359	307	27	25
Нерчинской . . . . .	154	133	9	12
Туркннской . . . . .	33	28	4	1
Всего	546	468	40	38

14) въ Иркутской губернии:

Въ больницахъ:				
Иркутской . . . . .	746	573	97	76
Киренской . . . . .	95	73	11	11
Ижнеудинской . . . . .	352	307	29	16
Троицкосавской . . . . .	112	93	9	10
Всего	1,305	1,046	146	113

15) въ Казанской губернии:

Въ больницахъ:				
Казанской . . . . .	1,653	1,366	176	111
Козьмодемьянской . . . . .	98	82	12	4
Лаишевской . . . . .	117	99	14	4
Мамадышской . . . . .	69	56	9	4
Свияжской . . . . .	137	122	9	6
Спасской . . . . .	50	41	7	2
Тетюшской . . . . .	36	34	1	1
Царевококшайской . . . . .	101	84	15	2
Цивильской . . . . .	89	75	10	4
Чебоксарской . . . . .	476	409	38	29
Чистопольской . . . . .	378	337	22	19
Ядринской . . . . .	93	80	3	10
Всего	3,297	2,785	316	196



16) въ Калужской губернии:

Въ больницахъ:	пользов.	выздор.	умерло.	остал.
Калужской . . . . .	3,413	2,884	233	296
Боровской . . . . .	206	158	36	12
Жиздринской . . . . .	199	172	13	14
Козельской . . . . .	851	741	99	11
Лихвинской . . . . .	396	353	22	21
Малоярославцевой . . . .	600	526	64	10
Масальской . . . . .	507	459	33	15
Медынской . . . . .	381	263	97	21
Мещовской . . . . .	232	177	38	17
Перемышльской . . . . .	584	533	44	7
Тарусской . . . . .	377	344	29	4
Всего	7,746	6,610	708	428

17) въ Киевской губернии:

Въ больницахъ:				
Киевской . . . . .	2,758	2,095	424	239
Васильковской . . . . .	892	746	102	44
Звенигородской . . . . .	1,000	831	105	64
Каневской . . . . .	413	355	25	33
Липовецкой . . . . .	788	680	82	26
Радомысльской . . . . .	949	789	129	31
Сквирской . . . . .	2,186	1,826	299	61
Таращанской . . . . .	544	457	63	24
Черкасской . . . . .	727	608	94	25
Чигиринской . . . . .	366	315	35	16
Всего	10,623	8,702	1,358	563

18) въ Ковенской губернии:

Въ больницахъ:				
Ковенской . . . . .	679	532	74	73
Вилькомырской . . . . .	776	650	60	66

	пользо.	выздор.	умерло.	остал.
Новоалександровской . .	665	543	75	47
Поневѣжской . . . . .	954	810	48	96
Россиенской . . . . .	1,203	1,039	42	122
Тельшевской . . . . .	852	723	28	101
Шавельской . . . . .	962	662	48	252
Всего	6,091	4,959	375	757

19) въ Костромской губернии:

Въ больницахъ:

Костромской . . . . .	1,751	1,469	153	129
Ветлужской . . . . .	104	78	13	13
Галичской . . . . .	176	121	43	12
Кинешемской . . . . .	176	141	22	13
Кологривской . . . . .	75	65	5	5
Макарьевской . . . . .	82	70	9	3
Нерехтской . . . . .	145	120	18	7
Солигаличской . . . . .	47	39	5	3
Чухломской . . . . .	67	56	5	6
Юрьевецкой . . . . .	105	86	16	3
Всего	2,728	2,245	289	194

20) въ Курляндской губернии:

Въ больницахъ:

Митавской . . . . .	3,567	3,125	235	207
Бауской . . . . .	256	218	27	11
Виндавской . . . . .	387	348	29	10
Газенпотской . . . . .	304	267	20	17
Гольдингенской . . . . .	428	356	53	19
Либавской . . . . .	633	554	50	29
Туккумской . . . . .	205	147	26	32
Фридрихштатской . . . . .	336	277	45	14
Якобштадтской . . . . .	390	326	45	19
Всего	6,506	5,618	530	358



21) въ Курской губернии:

Въ больницахъ:	пользо.	выздор.	умерло.	остал.
Курской . . . . .	2,572	2,116	223	233
Бѣлгородской . . . . .	1,238	1,068	110	60
Грайворонской . . . . .	161	135	9	17
Дмитріевской . . . . .	121	99	6	16
Короченской . . . . .	653	579	43	31
Льговской . . . . .	310	272	22	16
Обоянской . . . . .	1,193	1,058	104	31
Путивльской . . . . .	382	334	34	14
Рыльской . . . . .	522	446	39	37
Старооскольской . . . . .	680	590	60	30
Суджанской . . . . .	681	585	76	20
Тимской . . . . .	240	220	19	1
Фатежской . . . . .	334	299	22	13
Щигровской . . . . .	410	378	22	10
Всего	9,497	8,179	789	529

22) въ Лифляндской губернии:

Въ больницахъ:				
Рижской . . . . .	541	385	45	114
Аренсбургской . . . . .	298	251	16	31
Валкской . . . . .	843	741	80	22
Венденской . . . . .	642	536	69	37
Верроской . . . . .	573	498	55	20
Вольмарской . . . . .	343	277	42	24
Дерптской . . . . .	1,036	903	55	78
Лемзальской . . . . .	151	137	13	1
Перновской . . . . .	532	464	34	34
Феллинской . . . . .	51	39	8	4
Всего	5,010	4,231	417	362

23) въ Минской губернии:

Въ больницахъ:	пользо-	выздор.	умерло.	остал.
Минской . . . . .	780	675	61	44
» Благотворитель-				
наго Общества.	321	286	18	17
» Еврейской . . . .	1,158	1,027	69	62
Борисовской . . . . .	946	780	111	55
Игуменской . . . . .	752	671	31	50
Мозырской . . . . .	698	579	37	82
Новогрудской . . . . .	1,362	1,181	88	93
Пинской . . . . .	482	389	59	34
Рѣчицкой . . . . .	557	461	65	31
Слуцкой . . . . .	641	481	109	51
Всего	7,697	6,530	648	519

24) въ Могилевской губернии:

Въ больницахъ:				
Могилевской Городской.	2,125	1,757	179	189
» Еврейской.	421	360	36	25
Быховской . . . . .	175	144	17	14
Бѣлицкой . . . . .	349	301	33	15
Климовецкой . . . . .	77	61	8	8
Копысской . . . . .	81	67	7	7
Мстиславской . . . . .	140	123	10	7
Оршанской . . . . .	592	454	86	52
Рогачевской . . . . .	703	584	79	40
Сенненской . . . . .	136	120	10	6
Чаусовской . . . . .	72	59	9	4
Чириковской . . . . .	312	268	37	7
Всего	5,183	4,298	511	374

25) въ Московской губернии:

Въ больницахъ:				
Московской для черно-				
рабочихъ . . . . .	18,692	16,057	1,520	1,115



	пользо.	выздор.	умерло.	оста.л.
Богородской . . . . .	450	363	80	7
Бронницкой . . . . .	596	476	80	40
Верейской . . . . .	209	180	15	14
Волоколамской . . . . .	100	89	7	4
Дмитровской . . . . .	78	67	11	»
Звенигородской . . . . .	201	162	28	11
Клинской - Лепенкинск.	362	315	35	12
Коломенской-Городской	708	649	28	31
» Инвалидн.	317	245	45	27
Можайской . . . . .	371	310	51	10
Подольской . . . . .	387	318	58	11
Рузской . . . . .	160	145	5	10
Серпуховской . . . . .	719	609	87	23
Всего	23,350	19,985	2,050	1,315

26) въ Нижегородской губернии:

Въ больницахъ:

Нижегородской . . . . .	4,221	3,414	468	339
Ардатовской . . . . .	84	74	8	2
Арзамасской . . . . .	139	106	19	14
Балахнинской . . . . .	71	54	10	7
Васильской . . . . .	222	187	27	8
Горбатовской . . . . .	117	93	13	11
Княгининской . . . . .	55	50	1	4
Лукояновской . . . . .	84	67	9	8
Макарьевской . . . . .	213	181	13	19
Семеновской . . . . .	71	56	10	5
Сергачской . . . . .	75	73	1	1
Всего	5,352	4,355	579	418

27) въ Новгородской губернии:

Въ больницахъ:

Новгородской . . . . .	516	388	90	38
Боровицкой . . . . .	340	282	43	15

	пользо.	выздор.	умерло.	остат.
Бѣлозерской.....	103	77	23	3
Валдайской.....	589	495	81	13
Кириловской.....	149	128	13	8
Крестецкой.....	506	399	81	26
Тихвинской.....	153	127	18	8
Устюженской.....	157	121	23	13
Череповецкой.....	76	65	8	3
Всего	2,589	2,082	380	127

28) въ Олонецкой губернии:

Въ больницахъ:

Петрозаводской.....	960	847	42	71
Вытегорской.....	202	177	18	7
Каргопольской.....	131	113	8	10
Лодейнопольской.....	184	136	24	24
Олонецкой.....	85	70	5	10
Повѣнецкой.....	74	62	2	10
Пудожской.....	71	61	6	4
Всего	1,707	1,466	105	136

29) въ Оренбургской губернии:


Въ больницахъ:

Уфимской.....	396	350	21	25
Белебеевской.....	289	273	9	7
Бирской.....	131	116	9	6
Мензелинской.....	348	330	14	4
Стерлитамакской.....	331	319	7	5
Челябинской.....	288	248	17	23
Всего	1,783	1,636	77	70

30) въ Орловской губернии:

Въ больницахъ:

Орловской.....	3,429	2,845	317	267
Болховской.....	289	260	21	8





	пользо.	выздор.	умерло.	остат.
Дмитровской.....	219	179	29	11
Елецкой.....	316	267	32	17
Карачевской.....	237	192	28	17
Кромской.....	289	238	37	14
Ливенской.....	203	182	10	11
Малоархангельской.....	80	68	7	5
Мценской.....	269	211	35	23
Сѣвской.....	423	340	63	20
Трубчевской.....	200	183	10	7
Всего	5,954	4,965	589	400

31) въ Пензенской губернии:

Въ больницахъ:

Пензенской.....	1,781	1,522	117	142
Городищенской.....	80	67	5	8
Инсарской.....	88	85	1	2
Керенской.....	64	48	9	7
Краснослободской.....	87	72	3	12
Мокшанской.....	108	101	4	3
Наровчатской.....	74	61	3	10
Нижнеомовской.....	109	103	3	3
Саранской.....	107	85	9	13
Чембарской.....	105	100	5	»
Всего	2,603	2,244	159	200

32) въ Пермской губернии:

Въ больницахъ:

Пермской.....	1,145	1,053	51	41
Верхотурской.....	103	88	5	10
Екатеринбургской.....	457	408	26	23
Ирбитской.....	134	120	6	8
Камышловской.....	181	163	9	9
Красноуфимской.....	214	194	13	7

	пользо.	выздор.	умерло.	остат.
Кунгурской.....	56	50	1	5
Оспинской.....	48	40	1	7
Оханской.....	181	152	11	18
Солякамской.....	86	84	2	»
Чердынской.....	77	64	3	10
Шадринской.....	212	194	4	14
Всего	2,894	2,610	132	152

33) въ Подольской губернии:

Въ больницахъ:

Каменецъ-Подольской..	989	778	100	111
Балтской.....	503	386	54	63
Брацлавской.....	592	516	53	23
Винницкой.....	1,110	965	110	35
Гайсинской.....	384	335	34	15
Летической.....	395	345	38	12
Литинской.....	411	334	68	9
Могилевской.....	466	395	36	35
Ново-Ушицкой.....	431	366	47	18
Ольгопольской.....	739	635	91	13
Проскуровской.....	641	549	57	35
Ямпольской.....	528	414	50	64
Всего	7,189	6,018	738	433

34) въ Полтавской губернии:

Въ больницахъ:

Полтавской.....	5,494	4,731	409	354
Гадячской.....	1,166	969	182	15
Зеньковской.....	733	643	74	16
Золотоношской.....	900	718	145	37
Кобелякской.....	618	539	50	29
Константиноградской..	1,726	1,497	190	39
Кременчугской.....	2,681	2,105	359	217



	пользо.	выздор.	умерло.	остал.
Лохвицкой .....	617	522	67	28
Лубенской .....	1,769	1,526	202	41
Миргородской .....	1,953	1,692	207	54
Переяславской .....	230	175	29	26
Пирятинской .....	1,093	883	183	27
Прилуцкой .....	338	293	25	20
Роменской .....	1,051	885	87	79
Хорольской .....	2,420	2,055	248	117
Всего	22,789	19,233	2,457	1,099

35) въ Псковской губернии:

Въ больницахъ:

Псковской .....	5,134	4,224	691	219
Великолукской .....	403	334	45	24
Новоржевской .....	140	119	18	3
Опочецкой .....	426	357	38	31
Островской .....	894	667	181	46
Порховской .....	771	664	77	30
Торопецкой .....	241	190	30	21
Холмской .....	326	288	23	15
Всего	8,335	6,843	1,103	389

36) въ Рязанской губернии:

Въ больницахъ:

Рязанской .....	2,647	2,267	159	221
Данковской .....	139	121	15	3
Егорьевской .....	99	82	11	6
Зарайской .....	174	133	28	13
Касимовской .....	164	140	15	9
Михайловской .....	105	82	14	9
Пронской .....	80	70	5	5
Раненбургской .....	115	94	14	7

	пользов.	выздор.	умерло.	остал.
Рязской.....	199	173	15	11
Сапожковской.....	61	50	2	9
Скопинской.....	158	123	22	13
Спасской.....	126	99	17	10
Всего	4,067	3,434	317	316

37) въ Самарской губернии:

Въ больницахъ:

Самарской.....	1,607	1,368	137	102
Бугульминской.....	275	252	15	8
Бугурусланской.....	340	314	20	6
Бузулуцкой.....	316	295	17	4
Николаевской.....	293	278	11	4
Новоузенской.....	177	163	5	9
Ставропольской.....	434	415	16	3
Всего	3,442	3,085	221	136

38) въ С.-Петербургской губернии:

Въ обоихъ мужскихъ Отдѣленіяхъ больницы для черно-  
рабочихъ въ С.-Пбурѣ. 8,680 6,214 2,015 451

Въ больницахъ:

Гдовской.....	249	218	21	10
Лугской.....	951	774	149	28
Ново-Ладогской.....	514	371	109	34
Шлиссельбургской.....	169	109	48	12
Ямбургской.....	247	181	42	24
Всего	10,810	7,867	2,384	559

39) въ Саратовской губернии:

Въ больницахъ:

Саратовской.....	2,662	2,217	256	189
Аткарской.....	252	210	16	26



	пользов.	выздор.	умерло.	остал.
Балашиовской . . . . .	322	279	33	10
Вольской . . . . .	178	163	7	8
Дубовской . . . . .	116	90	18	8
Камышинской . . . . .	261	232	20	9
Кузнецкой . . . . .	250	230	13	7
Петровской . . . . .	219	196	18	5
Сердобской . . . . .	380	359	14	7
Хвальинской . . . . .	411	368	32	11
Царницынской . . . . .	311	277	21	13
Всего	5,362	4,621	448	293

40) въ Симбирской губернии:

Въ больницахъ:

Симбирской . . . . .	3,106	2,735	141	230
Алатырской . . . . .	173	157	11	5
Ардатовской . . . . .	301	269	23	9
Бупинской . . . . .	273	257	11	5
Карсунской . . . . .	451	416	24	11
Курмышинской . . . . .	141	129	5	7
Сенгилейской . . . . .	259	233	17	9
Сызранской . . . . .	459	415	29	15
Всего	5,163	4,611	261	291

41) въ Смоленской губернии:

Въ больницахъ:

Смоленской . . . . .	777	600	77	100
Бѣльской . . . . .	217	170	37	10
Вяземской . . . . .	417	307	75	35
Гжатской . . . . .	378	287	75	16
Дорогобужской . . . . .	588	466	71	51
Духовицкой . . . . .	251	204	34	13
Ельнинской . . . . .	240	179	43	18

	пользо.	выздор.	умерло.	остал.
Краснинской.....	260	202	49	9
Порѣчьской.....	239	210	26	3
Рославльской.....	751	580	96	75
Сычевской.....	185	164	15	6
Юхновской.....	347	272	62	13
Всего	4,650	3,641	660	349

42) въ Ставропольской губернии:

Въ больницѣ Ставропольской.....	306	262	18	26
------------------------------------	-----	-----	----	----

43) въ Таврической губернии:

Въ больницахъ:

Симферопольской.....	2,113	1,632	386	95
Мелитопольской.....	2,306	1,877	375	54
Перекопской.....	185	149	33	3
Оеодосійской.....	75	56	10	9
Всего	4,679	3,714	804	161

44) въ Тамбовской губернии:

Въ больницахъ:

Тамбовской.....	2,939	2,483	199	257
Борисоглѣбской.....	149	130	11	8
Елатомской.....	133	121	5	7
Кирсановской.....	191	165	16	10
Козловской.....	341	289	28	24
Лебедянской.....	172	150	14	8
Липецкой.....	286	254	23	9
Моршанской.....	261	213	26	22
Спасской.....	203	170	14	19
Темниковской.....	134	110	20	4
Усманской.....	190	166	20	4
Шацкой.....	225	200	13	12
Всего	5,224	4,451	389	384



45) въ Тверской губернии:

Въ больницахъ:	пользо.	выздор.	умерло.	остал.
Тверской . . . . .	3,011	2,418	381	212
Бѣжецкой . . . . .	270	214	44	12
Весьегонской . . . . .	124	108	14	2
Вышневолоцкой . . . . .	756	569	164	23
Зубцовской . . . . .	199	165	21	13
Кализинской . . . . .	159	135	17	7
Кашинской . . . . .	309	251	44	14
Корчевской . . . . .	211	170	37	4
Новоторжской . . . . .	423	337	60	26
Осташковской . . . . .	244	212	19	13
Ржевской . . . . .	427	341	60	26
Старицкой городской . .	249	198	38	13
Старицкой Генералъ-Ма- іора Тутолмина . . . . .	189	154	17	18
Всего	6,571	5,272	916	383

46) въ Тифлиской губернии:

Въ больницѣ				
Тифлиской . . . . .	522	402	82	38

47) въ Тобольской губернии:

Въ больницахъ:				
Тобольской . . . . .	417	316	44	57
Березовской . . . . .	105	85	16	4
Ишимской . . . . .	158	141	8	9
Курганской . . . . .	126	112	9	5
Омской . . . . .	483	445	21	17
Сургутской . . . . .	30	27	2	1
Тарской . . . . .	27	19	3	5
Туринской . . . . .	137	120	12	5

	пользо.	выздор.	умерло.	остал.
Тюменской. . . . .	44	36	5	3
Ялуторовской. . . . .	237	206	19	12
Всего	1,764	1,507	139	118

48) въ Томской губернии:

Въ больницахъ:				
Томской. . . . .	292	222	40	30
Капнской. . . . .	564	498	31	35
Нарымской. . . . .	4	4	»	»
Всего	860	724	71	65

49) въ Тульской губернии:

Въ больницахъ:				
Тульской. . . . .	3,542	2,956	300	286
Алексинской. . . . .	170	141	16	13
Богородицкой. . . . .	268	247	15	6
Бѣлевской. . . . .	496	423	42	31
Веневской. . . . .	174	157	13	4
Елпфанской. . . . .	100	85	10	5
Ефремовской. . . . .	386	339	35	12
Каширской. . . . .	218	184	25	9
Крапивенской. . . . .	311	281	20	10
Новоспльской. . . . .	102	85	7	10
Одоевской. . . . .	209	187	15	7
Чернской. . . . .	426	372	39	15
Всего	6,402	5,457	537	408

50) въ Харьковской губернии:

Въ больницахъ:				
Харьковской. . . . .	2,435	1,884	252	299
Ахтырской. . . . .	685	566	78	41
Богодуховской. . . . .	473	421	38	14



	пользов.	выздор.	умерло.	остал.
Валковской. . . . .	885	781	84	20
Волчанской. . . . .	256	242	11	3
Зміевской. . . . .	398	352	39	7
Изюмской. . . . .	1,013	877	91	45
Купянской. . . . .	486	432	26	28
Лебединской. . . . .	487	429	40	18
Славянской. . . . .	145	130	12	3
Старобѣльской. . . . .	344	307	25	12
Сумской. . . . .	843	702	112	29
Всего	8,450	7,123	808	519

51) въ Херсонской губернии:

Въ больницахъ:

Херсонской. . . . .	842	689	99	54
Одесской городской . . .	5,312	3,891	710	711
» Еврейской. . . . .	690	513	102	75
» Карантинной . . . . .	402	387	4	11
Александрійской. . . . .	1,369	1,108	225	36
Ананьевской. . . . .	2,863	2,562	254	47
Бериславской. . . . .	605	504	64	37
Бобринецкой. . . . .	871	743	111	17
Дубоссарской. . . . .	145	110	9	26
Николаевской. . . . .	181	157	17	7
Всего	13,280	10,664	1,595	1,021

52) въ Черниговской губернии:

Въ больницахъ:

Черниговской. . . . .	4,236	3,633	350	253
Борзенской. . . . .	327	250	35	42
Глуховской. . . . .	820	614	125	81
Городненской. . . . .	402	347	44	11
Козелецкой. . . . .	986	784	123	79
Конотопской. . . . .	755	657	87	11

	ПОЛЪЗОВ.	ВЫЗДОР.	УМЕРЛО.	ОСТАЛ.
Кролевецкой . . . . .	764	675	54	35
Мглинской . . . . .	443	381	43	19
Новгородсѣверской . . .	766	599	63	104
Новозыбковской . . . . .	530	468	34	28
Нѣжинской . . . . .	1,709	1,293	210	206
Остерской . . . . .	733	646	68	19
Сосницкой . . . . .	585	519	46	20
Стародубской . . . . .	1,095	906	86	103
Суражской . . . . .	208	180	16	12
Всего	14,359	11,952	1,384	1,023

53) въ Эстляндской губерніи:

Въ больницахъ:

Ревельской . . . . .	624	469	54	101
Везенбергской . . . . .	324	281	18	25
Вейсенштейнской . . . .	168	138	17	13
Гапсальской . . . . .	168	159	4	5
Всего	1,284	1,047	93	144

54) въ Ярославской губерніи:

Въ больницахъ:

Ярославской . . . . .	2,755	2,324	192	239
Даниловской . . . . .	95	68	16	11
Любимской . . . . .	67	59	6	2
Мологской . . . . .	122	93	19	10
Мышкинской . . . . .	139	117	12	10
Пошехонской . . . . .	115	93	13	9
Романово - Борисоглѣб- ской . . . . .	192	158	21	13
Ростовской . . . . .	312	244	45	23
Рыбинской . . . . .	466	373	60	33
Угличской . . . . .	188	146	25	17
Всего	4,451	3,675	409	367



А во всѣхъ гражданскихъ больницахъ въ продолженіе 1856 года

пользовано.....	312,423.
выздоровѣло.....	260,618.
умерло.....	31,995.
осталось.....	19,810.

Сравнительно съ 1855 годомъ, цифра больныхъ, пользовавшихся въ гражданскихъ больницахъ Имперіи, была менѣе почти на  $\frac{1}{10}$ ; за исключеніемъ изъ нея числа больныхъ, пользовавшихся въ истекшемъ году въ 11 больницахъ, не вошедшихъ въ отчетность 1855 года \*), оказывается, что въ однихъ и тѣхъ же больницахъ въ 1856 году

пользовано.....	29,154.
выздоровѣло.....	16,901.
умерло.....	5,787 п
осталось.....	6,466

менѣе, чѣмъ въ 1855 году.

Въ общемъ числѣ больныхъ, пользовавшихся въ продолженіе отчетнаго 1856 года въ гражданскихъ больницахъ, было случаевъ:

		изъ нихъ выздоров.	умерло.	осталось.
Горячекъ катарраль- ныхъ, ревматическихъ и гастрическихъ . . . .	39,154	36,452	678	2,024
Тифа . . . . .	44,960	34,184	9,450	1,326
Перемежающейся ли- хорадки . . . . .	37,626	35,985	357	1,284
Холеры . . . . .	2,740	1,247	1,468	25
Кроваваго поноса. . . .	7,725	5,159	2,375	191
Рожъ . . . . .	2,783	2,418	136	229

\*) Больницы для чернорабочихъ въ Москвѣ и С.-Петербургѣ, Еврейской въ Кишиневѣ, больницы центрального карантина въ Одессѣ и Астрахани и уѣздныхъ въ Пинежѣ Архангельской, Орловѣ Вятской, Ростовѣ Екатеринославской, Гдовѣ С.-Петербургской, Везенбергѣ Эстляндской и Коломнѣ (для Инвалидовъ) Московской губерніи.

		изъ нихъ выздоров.	умерло.	осталось.
Острыхъ сыней . . . . .	2,550	2,197	191	162
Зараженія отъ живот- ныхъ . . . . .	10	6	4	»
Ревматизма . . . . .	18,044	16,633	191	1,220
Воспаленій мозга . . . . .	848	551	270	27
» глазъ . . . . .	6,795	6,290	29	476
» предъушной желѣзы . . . . .	467	417	17	33
Жабы . . . . .	2,140	1,946	62	132
Дифтерическаго воспа- ленія горла и зѣва . . . . .	57	42	10	5
Крупа . . . . .	205	158	42	5
Воспаленія плейры и легкихъ . . . . .	17,224	13,945	2,312	967
Воспаленія сердца и большихъ сосудовъ . . . . .	184	141	32	11
Воспаленія венъ . . . . .	81	64	8	9
» брюшины . . . . .	1,110	844	216	50
» желудка и кишекъ . . . . .	442	311	107	24
Заворота кишекъ . . . . .	24	5	18	1
Воспаленія печени и се- лезенки . . . . .	961	812	104	45
Воспаленія почекъ . . . . .	139	118	13	8
» матки вооб- ще и родильной го- рячки . . . . .	239	191	27	21
Катарра дыхательныхъ органовъ . . . . .	5,063	4,603	188	272
Катарра желудка и ки- шекъ . . . . .	9,730	8,087	1,235	408
Катарра мочевыхъ пу- тей . . . . .	193	158	9	26



		изъ нихъ выздоров.	умерло.	осталось.
Катарра рукава матки.	31	28	»	3
Апоплексія и паралича.	1,723	865	679	179
Амауроза . . . . .	119	98	3	18
Эпилепсiи . . . . .	954	745	74	135
Болѣзней спиннаго мозга . . . . .	457	331	86	40
Болѣзней судорожныхъ.	200	184	3	13
Судорожнаго кашля. . .	221	206	2	13
Невралгiи . . . . .	1,427	1,306	48	73
Болѣзней психическихъ	3,055	1,570	357	1,129
Запойной горячки . . . .	561	508	31	22
Водобоязни . . . . .	76	49	23	4
Болѣзней сердца и большихъ сосудовъ. . . . .	549	380	140	29
Хроническихъ страданiй дыхательнаго аппарата, эмфиземы легкихъ и разныхъ видовъ одышки. . . . .	2,237	1,597	398	242
Кровохарканiя. . . . .	727	522	162	43
Болѣзней печени и селезенки. . . . .	2,735	2,229	354	152
Болѣзней почекъ. . . . .	70	39	29	2
Неправильностей отдѣленiя мочи. . . . .	197	178	8	11
Болѣзней матки. . . . .	168	140	17	11
Неправильностей отдѣленiя мѣсячнаго очищенiя . . . . .	292	263	6	23
Кровотеченiя изъ матки	232	200	16	16
Неправильностей пищеваренiя . . . . .	496	431	45	20
Гипстозъ . . . . .	450	412	8	30

	пользов.	выздор.	умерло.	остал.
Гемороя . . . . .	597	544	7	46
Подагры . . . . .	131	110	7	14
Каменной болѣзни . . . . .	79	58	15	6
Золотухи . . . . .	2,343	2,021	60	262
Туберкулѣза . . . . .	8,164	3,324	4,274	566
Рака внутреннихъ орга- новъ . . . . .	126	59	55	12
Рака наружныхъ частей . . . . .	340	237	64	39
Хроническихъ сыпей . . . . .	1,701	1,561	19	121
Чесотки . . . . .	5,050	4,766	6	278
Венерической болѣзни . . . . .	24,109	20,994	167	2,948
Скорбута . . . . .	3,196	2,793	267	136
Гангрены . . . . .	446	218	190	38
Водянки . . . . .	6,870	3,510	2,852	508
Анэміи . . . . .	182	148	21	13
Истощенія . . . . .	448	197	211	40
Отравленія . . . . .	30	27	3	»

Болѣзней ушнаго про- хода . . . . .	894	834	10	50
Болѣзней полости рта и зѣва . . . . .	592	532	20	40
Болѣзней полости носа . . . . .	116	103	»	13
Катаракты . . . . .	114	95	1	18
Язвъ . . . . .	10,685	9,288	181	1,216
Карбункула . . . . .	100	88	7	5
Нарывовъ . . . . .	4,371	3,864	115	392
Рагъ . . . . .	3,610	3,180	149	281
Ушибовъ . . . . .	2,294	2,104	42	148
Переломовъ . . . . .	885	699	60	126
Вывиховъ . . . . .	345	315	1	29
Коксалгіи . . . . .	254	196	17	41



	пользо-	выздор.	умерло.	остал.
Травматическихъ вос-				
паленій . . . . .	654	587	27	40
Отмороженій . . . . .	1,453	1,300	73	80
Обжоговъ . . . . .	465	392	33	40
Костоѣды . . . . .	618	437	77	104
Искривленій . . . . .	289	266	1	22
Выпаденій . . . . .	183	159	8	16
Грыжъ . . . . .	433	386	31	16
Опухолей . . . . .	1,240	1,105	30	105
	съ благополуч.			
	исходовъ.			
Беременности и родовъ	446	406	12	28
		изъ нихъ вы-		осталось подъ
		пущено.		наблюденіемъ.
Притворныхъ болѣзней.	378	364	»	14
Недостаетъ свѣдѣній по				
неполнотѣ нѣкото-				
рыхъ отчетовъ о . . .	9,721	8,106	844	771
Всего же	312,423	260,618	31,995	19,810

Такимъ образомъ въ общемъ числѣ пользованныхъ въ гражданскихъ больницахъ случаевъ было въ теченіи 1856 года

	изъ нихъ	умерло.	осталось.
	выздоров.		
а) разныхъ видовъ горячекъ . . . . .	155,592	134,281	14,850
б) воспаленій (со включеніемъ офтальміи).	30,916	25,835	3,267
в) Катарра . . . . .	15,017	12,876	1,432
г) мѣстныхъ хроническихъ болѣзней внутреннихъ органовъ . . . . .	15,723	12,657	1,959
е) худосочій и болѣзней питанія . . . . .	48,762	35,801	8,212
ф) болѣзней нервныхъ	2,657	2,284	148
			225

	пользо- в.	выздор.	умерло.	остал.
g) болѣзней психиче- скихъ . . . . .	3,616	2,078	388	1,150
h) болѣзней наруж- ныхъ . . . . .	29,595	25,930	883	2,782
i) случаевъ беремен- ности и родовъ . .	446	406	12	28
k) болѣзней притвор- ныхъ . . . . .	378	364	»	14
	302,702	252,512	31,151	19,039
а съ	9,721	8,106	844	771
Всего	312,423	260,618	31 99	19,810.

Общее содержаніе смертности въ гражданскихъ больницахъ въ продолженіе истекшаго года было 1:9,8 въ 1855 году оно равнялось . . . . . 1:8,5 и въ 1854 году . . . . . 1:9,6

Представляя въ сравненіи съ 1855 годомъ нѣсколько выгоднѣйшее содержаніе, что почти исключительно основывалось на несравненно меньшемъ числѣ холерныхъ случаевъ, пользовавшихся въ прошломъ году въ гражданскихъ больницахъ, смертность въ нихъ достигала такого же, какъ и въ 1854 году содержанія. Причинами, содѣйствовавшими такой значительной смертности въ гражданскихъ больницахъ, были какъ и прежде тѣ невыгодныя условія, въ которыя необходимо поставлены они почти повсемѣстно въ отношеніи видовъ и степени болѣзненныхъ случаевъ, поступающихъ въ нихъ для пользованія. По малому своему объему и крайне ограниченному числу кроватей, въ немногихъ уѣздныхъ городахъ доходящему до 20, гражданскія больницы должны нерѣдко ограничиваться исключительнымъ призрѣніемъ болѣе трудныхъ и опасныхъ больныхъ, изъ каковыхъ и составляется большая часть ежегодно пользуемыхъ въ оныхъ случаевъ.



И въ прошломъ году, какъ изъ прилагаемой вѣдомости видно, около  $\frac{1}{4}$  общаго числа больныхъ, пользовавшихся въ гражданскихъ больницахъ, страдали тифомъ, холерою, кровавымъ поносомъ, воспаленіемъ мозга, болѣзнями сердца, апоплексіею, бугорчатою чахоткой, ракомъ, антоновымъ огнемъ, водяною, кровохарканіемъ, старческимъ изнуреніемъ, водобоязнію, заворотомъ кишекъ и разными видами одышки отъ хроническихъ расстройствъ въ органахъ дыханія и кровообращенія (78,187 : 302,702). На эту цифру случаевъ тяжкихъ и нерѣдко неизлечимыхъ недуговъ умерло въ больницахъ 22,661, что составляетъ болѣе  $\frac{7}{10}$  общей годовой ихъ смертности (22,661 : 31,151. При томъ, какъ число богадѣленъ ограничивается почти одними губернскими городами, то въ больницы гражданского вѣдомства поступаетъ въ теченіи года не малое число дряхлыхъ и удрученныхъ многолѣтними, по большей части неизлечимыми недугами, больныхъ, въ видахъ простаго призрѣнія. Пользованіе ихъ по необходимости ограничивается палліативнымъ облегченіемъ страданій и въ не рѣдкихъ случаяхъ слишкомъ поздняго ихъ поступленія лишь эвтаназическими пособіями. Въ общей годовой цифрѣ встрѣчаются нерѣдко больные старѣе 60 лѣтъ; такъ въ Иркутской губернской больницѣ изъ 97 смертныхъ исходовъ въ 14 возрастъ больныхъ былъ отъ 65 до 108 лѣтъ отъ роду; въ Омскую поступило въ теченіи года четверо больныхъ старше 95 лѣтъ; въ одной изъ уѣздныхъ больницъ Симбирской губерніи пользовано было двое больныхъ, старше 100 лѣтъ, и подобныхъ частныхъ примѣровъ можно бы привести весьма много; въ общемъ выводѣ средній возрастъ умершихъ по больницамъ гражданского вѣдомства старѣе 40 лѣтъ, что почти совпадаетъ съ среднимъ срокомъ наступленія естественной смерти. — Наконецъ для правильной оцѣнки содержанія смертности по боль-

ницамъ гражданскаго вѣдомства должно быть обращено вниманіе и на то обстоятельство, что въ оныя доставляются повсемѣстно для подавія помощи всѣ скоропостижные случаи въ городахъ, иногда за нѣсколько часовъ до неизбежной смерти.

Въ больницахъ отдѣльныхъ губерній содержаніе смертности представляло различныя величины, колебавшіяся между 1:4,3 и 1:23. Именно число умершихъ къ числу пользовавшихся содержалось, какъ

- |        |  |   |
|--------|--|---|
| 1: 4,3 | въ отдѣленіяхъ С.-Петербургской больницы для               |   |
|        | чернорабочихъ,   |   |
| 1: 5,2 | » Астраханской губернской больницы,                        |   |
| 1: 5,4 | » Симферопольской, »                                       | » |
| 1: 5,7 | » Новгородской »   | » |
| 1: 5,8 | » уѣздныхъ больницахъ С.-Петербургской губерніи,           |   |
| 1: 6   | уѣздныхъ больницахъ Гродненской,                           |   |
| 1: 6,1 | » » » Таврической,   |   |
| 1: 6,3 | » Тифлисской больницы,                                     |   |
| 1: 6,5 | » Кіевской губернской больницы,                            |   |
| 1: 6,6 | » уѣздныхъ больницахъ Тверской и Смоленской губерніи,      |   |
| 1: 6,7 | » Еврейской больницы въ Одессѣ,                            |   |
| 1: 7,1 | » уѣздныхъ больницахъ Новгородской и Костромской губерніи, |   |
| 1: 7,3 | » Томской губернской больницы,                             |   |
| 1: 7,4 | » Псковской » и Одесской городской,                        |   |
| 1: 7,6 | » Архангельской и Виленскихъ губернскихъ больницахъ,       |   |
| 1: 7,7 | » Иркутской и уѣздныхъ Псковской губерніи,                 |   |
| 1: 7,8 | » уѣздныхъ Ярославской губерніи,                           |   |
| 1: 7,9 | » Тверской губернской больницы,                            |   |
| 1: 8,1 | » Владимірской губернской »                                | , |
| 1: 8,3 | » Витебской »  | » |



- 1: 8,4 въ уѣздныхъ больницахъ Кіевской и Полтавской губерніи,
- 1: 8,5 » Херсонской губернской и въ уѣздныхъ больницахъ Екатеринославской губерніи,
- 1: 8,6 » губернскихъ Кишиневской и Житомирской и уѣздныхъ больницахъ Витебской губерніи,
- 1: 8,8 » » » Херсонской » ,
- 1: 9 » губернскихъ Ковенской и Нижегородской и уѣздныхъ больницахъ Рязанской, Могилевской, Московской и Владимирской губерніи,
- 1: 9,1 » уѣздныхъ Калужской губерніи,
- 1: 9,2 » » Орловской » ,
- 1: 9,4 » Казанской губернской,
- 1: 9,5 » Тобольской » и въ уѣздныхъ Волынской губерніи,
- 1: 9,6 » губернскихъ больницахъ Харьковской и Вологодской,
- 1: 9,7 » уѣздныхъ Подольской и Черниговской губерніи,
- 1: 9,9 » губернской Каменецъ-Подольской больницѣ,
- 1: 10, » » Смоленской и въ уѣздныхъ больницахъ Вологодской и Курляндской губерніи,
- 1: 10,1 » уѣздныхъ больницахъ Нижегородской » ,
- 1: 10,4 » губернской Саратовской больницѣ,
- 1: 10,8 » » Орловской больницѣ и въ уѣздныхъ больницахъ Харьковской и Минской губерніи,
- 1: 11,4 » губернской Костромской и въ уѣздныхъ больницахъ Иркутской губерніи,
- 1: 11,5 » губернскихъ Ревельской и Курской,
- 1: 11,7 » » Самарской и въ уѣздныхъ больницахъ Казанской губерніи,
- 1: 11,8 » губернскихъ Тульской и Гродненской и въ уѣздныхъ больницахъ Олонецкой губерніи,
- 1: 12, » губернскихъ Рижской и Могилевской и въ

- уѣздныхъ больницахъ Тульской, Лифляндской  
и Тамбовской губерніи,
- 1:12,1 въ губернской Черниговской,  
1:12,2 » уѣздныхъ больницахъ Курской губерніи,  
1:12,3 » Московской больницѣ для чернорабочихъ,  
1:12,6 » губернской Екатеринославской больницѣ,  
1:12,8 » уѣздныхъ больницахъ Вятской губерніи,  
1:13,4 » губернской Полтавской больницѣ,  
1:13,6 » уѣздныхъ больницахъ Архангельской губер-  
ніи и Забайкальской области,
- 1:14 » уѣздныхъ больницахъ Астраханской и Сара-  
товской губерніи,
- 1:14,1 » уѣздныхъ больницахъ Тобольской губерніи,  
1:14,2 » Акерманской больницѣ,  
1:14,3 » губернской Ярославской больницѣ,  
1:14,7 » Тамбовской и Калужской боль-  
ницахъ,
- 1:15,1 » губернской Митавской больницѣ,  
1:15,2 » » Минской и Пензенской больницахъ,  
1:15,3 » уѣздныхъ больницахъ Воронежской губерніи,  
1:16,6 » губернской Рязанской больницѣ,  
1:17 » Ставропольской и въ уѣздныхъ больницахъ  
Эстляндской губерніи,
- 1:17,1 » уѣздныхъ больницахъ Симбирской губерніи,  
1:17,5 » губернской Воронежской больницѣ,  
1:18 » уѣздныхъ больницахъ Ковенской губерніи,  
1:18,3 » » Томской » ,  
1:19 » губернской больницѣ Уфимской,  
1:19,5 » уѣздныхъ больницахъ Пензенской губерніи,  
1:20,2 » » Виленской »  
1:20,7 » губернской больницѣ Вятской,  
1:21,6 » уѣздныхъ больницахъ Пермской »  
1:21,8 » » Самарской »  
1:22 » губернской Симбирской больницѣ,



- 1:22,4 въ губернской Пермской больницѣ,  
 1:22,8 » » Петрозаводской » ,  
 1:23 » уѣздныхъ больницахъ Оренбургской губер-  
 нии.

Въ больницахъ С.-Петербургской и Московской для чернорабочихъ, губернскихъ Астраханской, Повгородской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Тверской и Виленскихъ, равно въ уѣздныхъ больницахъ Витебской губернии содержаніе смертности въ нѣкоторой степени увеличивалось холерными случаями. За исключеніемъ таковыхъ оно представляетъ слѣдующія величины:

- 1: 5 въ отдѣленіяхъ С.-Петербургской больницы для  
 чернорабочихъ;  
 1: 6 » Астраханской губернской больницѣ,  
 1: 7,4 » Повгородской » »  
 1: 8,9 » Тверской » » ,  
 1: 9 » Виленскихъ » » .  
 1: 9,8 » уѣздныхъ больницахъ Витебской губернии;  
 1:12 » Саратовской губернской больницѣ,  
 1:12,7 » Нижегородской » » ,  
 1:12,9 » Московской больницѣ для чернорабочихъ;  
 1:15,4 » Самарской губернской больницѣ.

Въ Астраханской губернской больницѣ холерныхъ случаевъ призывалось незначительное число, едва увеличивавшее смертность на  $\frac{8}{10}\%$ . Главнѣйшія же причины ея лежали въ мѣстныхъ климатическихъ условіяхъ Астрахани, постоянно обусловливающихъ замѣчательную смертность. Тогда какъ тахітит ея въ Европѣ въ послѣднее десятилѣтіе, при холерѣ, тифѣ и неурожаяхъ, доходило до 19:1000, въ Астрахани постоянно отъ однихъ климатическихъ причинъ умираетъ въ годъ 30:1000 а при эпидеміяхъ 36:1000. Въ 1855 году изъ 42,000 мѣстныхъ жителей города умерло 1,110, въ 1856 году 1,372; въ томъ числѣ всего болѣе гибнетъ изъ вновь при-

бывающихъ, до акклиматизаціи, отъ тифа и перемежающейся лихорадки.

Въ Кіевской губернской больницѣ замѣчательно-большая смертность въ прошломъ году основывалась отчасти на томъ, что въ общей годовой цифрѣ больныхъ заключены 70 скоропостижныхъ случаевъ, окончившіеся смертію по истеченіи 1—48 часовъ. За исключеніемъ ихъ общее годовое содержаніе смертности въ Кіевской больницѣ равняется 1:7,6.

Отъ тифа пользовано въ теченіи истекшаго года въ больницахъ гражданскаго вѣдомства губернскихъ и уѣздныхъ городовъ 44,960 человекъ. Эта огромная цифра, составляющая болѣе  $\frac{1}{7}$  всего годового числа больныхъ, находившихся въ больничныхъ учрежденіяхъ (44,960 : 302,702), была распредѣлена въ различномъ содержаніи: именно число тифозныхъ случаевъ составляло около  $\frac{1}{3}$  всего годового числа больныхъ въ С.-Петербургской больницѣ для чернорабочихъ;

$\frac{2}{3}$  въ больницахъ Вологодской губерніи;

$\frac{1}{4}$  » » Орловской и Полтавской губерній,

$\frac{1}{5}$  » » Владимірской, Гродненской, Костромской, Московской, Нижегородской, Тверической и Черниговской губерній,

$\frac{2}{11}$  Ярославской губерніи,

$\frac{1}{6}$  » » Екатеринославской, Курской, Псковской и Херсонской губерній,

$\frac{2}{13}$  » » Смоленской и Тамбовской губерній,

$\frac{1}{7}$  » » Калужской, Кіевской, Подольской, Тверской, Тульской и Харьковской губерній,

$\frac{1}{8}$  » » Воронежской, Вятской и Нижегородской губерній,



$\frac{1}{9}$	въ	больницахъ	Витебской, Архангельской и Казанской губерній,
$\frac{1}{12}$	»	»	Олонецкой, Оренбургской и Рязанской губерній,
$\frac{1}{15}$	»	»	Ковенской и Лифляндской губерній,
$\frac{1}{16}$	»	»	Бессарабской области и Саратовской губерній,
$\frac{1}{17}$	»	»	Виленской, Мѣиской, Пермской, Астраханской и Симбирской губерній,
$\frac{1}{18}$	»	»	Волынской губерній,
$\frac{1}{19}$	»	»	Могилевской губерній и
$\frac{1}{20}$	»	»	Пензенской и Самарской губерній.

Всего менѣе призравалось тифозныхъ въ больницахъ Курляндской, Тифлиской, Тобольской и Эстляндской губерній.

Въ общемъ числѣ пользовавшихся отъ тифа въ гражданскихъ больницахъ несравненно бѣльшая часть была изъ бывшихъ въ передвиженіи воинскихъ командъ, дружинъ Ополченія и рекрутскихъ партій; тифъ развивался въ нихъ во время переходовъ съ одного мѣста на другое и притомъ по большей части изъ другихъ болѣзней, принимавшихъ, отъ невыгодъ діететическаго и гигиеническаго содержанія больныхъ на пути слѣдованія, не правильное теченіе и динамическій характеръ. Обстоятельство это особенно важно въ двухъ отношеніяхъ: съ одной стороны оно объясняетъ ту значительную смертность, которою характеризовался тифъ въ прошломъ году, особенно въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ; съ другой — такое происхожденіе тифа бросаетъ особенный свѣтъ на его видъ, характеръ и множество особенностей, какъ въ признакахъ, такъ и въ самомъ ходѣ болѣзненнаго процесса, которыми онъ отличался въ истекшемъ году.

Періодъ тифозной инкубаціи обыкновенно продолжался долго. Появленію тифозныхъ симптомовъ по боль-

шей части предшествовало продолжительное разнемоганіе, основывавшееся или исключительно на медленномъ и постепенномъ ослабленіи питанія организма отъ продолжительнаго вліянія вредоносныхъ причинъ и образованія притомъ болѣзненнаго крѣпа крови, или на развитіи съ тѣмъ вмѣстѣ въ больномъ какой нибудь другой болѣзни, но большей части лихорадочнаго или горячечнаго свойства и на продолжительной съ нею, перѣдко безпомощной, борьбѣ организма, потрясеннаго и ослабленнаго вѣшними условіями жизни. Больные еще до обнаруженія тифозныхъ симптомовъ носили на себѣ всѣ признаки изнуренія и дурнаго питанія; тѣло ихъ по большей части представлялось худощавымъ и тощимъ, мускулатура вялою и блѣдною, выраженіе лица задумчивымъ и печальнымъ, цвѣтъ его мутно-блѣднымъ, матовымъ, землистымъ, — глаза глубоколежащими въ орбитахъ и окруженными темнымъ кольцомъ отъ исхуданія клѣтчатки. При этомъ замѣчались общая слабость, усталость, тупость чувствъ и понятій и совершенное равнодушіе ко всему окружающему. Такое состояніе, иногда вовсе безъ признаковъ какого-либо мѣстнаго страданія, у многихъ продолжалось довольно долго предъ обнаруженіемъ первыхъ ясно выраженныхъ тифозныхъ явленій. Притомъ пульсъ больныхъ былъ обыкновенно малъ, слабъ и въ началѣ незначительно ускоренъ; языкъ особенно блѣденъ и какъ бы вялъ, иногда суховатъ и рѣдко нечистъ; кожа суха, недѣятельна и только по вечерамъ нѣсколько горячѣе обыкновеннаго; жажда умѣренная и совершенная потеря аппетита. Совокупность этихъ явленій встрѣчалась по большей части, какъ длительный періодъ предвѣстниковъ тифа, въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ онъ развивался самостоятельно, отъ медленной и постепенной порчи питанія, безъ участія другихъ предшествовавшихъ ему болѣзней, которыхъ исходомъ онъ дѣлался въ другой болѣ-



шей части случаевъ. Въ числѣ ихъ чаще прочихъ медленное разнемоганіе тифомъ развивалось постепенно изъ горячечныхъ и лихорадочныхъ болѣзней. Въ такихъ случаяхъ еще за долго до тифа у больного замѣчались усталость и слабость, боли и круженіе головы, потеря аппетита, безпокойный сонъ, зябкость и летучій жаръ, смѣняемый ознобами. Въ обнаруженіи этихъ явленій замѣчались явные послабленія и иногда столь чистыя перемежки, что болѣзнь легко было принять за перемежающуюся лихорадку. Ежедневное возобновленіе озноба въ началѣ каждодневнаго усиленія припадковъ еще болѣе могло поддерживать эту мысль въ отдѣльныхъ случаяхъ. Только послѣ озноба рѣдко появлялся повсемѣстный потъ, съ облегченіемъ явленій и притомъ постоянно, какъ во время такихъ ежедневныхъ пароксизмовъ, такъ и послѣ нихъ, пульсъ оставался ускореннымъ, а необыкновенная слабость и усталость держалась все время постоянно. Вмѣстѣ съ тѣмъ мало по малу развивались у больныхъ признаки разстройства пищеваренія, языкъ дѣлался особенно блѣднымъ и покрывался бѣловатою слизью, нерѣдко появлялись тошноты и рвоты желчью, сопровождаемыя болью, раздутіемъ и напряженіемъ праваго подреберья. На этой степени болѣзнь держалась иногда довольно долго и при удаленіи вредоносныхъ вліяній, покоѣ, діетѣ и правильномъ пользованіи обыкновенно проходила. Въ противномъ случаѣ пароксизмы постепенно дѣлались продолжительнѣе, свободное между ними время становилось короче и развивалось болѣе постоянное горячечное состояніе, въ которомъ мало по малу начинали возникать одинъ за другимъ признаки пораженія нервной системы. Нерѣдко случалось, что и они долго останавливались на степени слабого развитія и ограничивались болѣе легкими явленіями, какъ-то дрожаніемъ языка и рукъ, круженіемъ головы и легкимъ бредомъ во время жара, безъ

потери самосознанія и разсудительности въ отвѣтахъ больныхъ. Притомъ кишечныя испражненія, въ началѣ часто задерживавшіяся, на 7, 9 и 11-й день дѣлались жидкими съ большимъ количествомъ желчи, иногда съ замѣтнымъ для больного облегченіемъ; или при жидкихъ, но малыхъ, желчныхъ изверженіяхъ низомъ развивалась желтеница на поверхности всего тѣла. Слабость сплѣ, потеря аппетита и болѣзненное равнодушіе ко всему окружающему, не смотря на кажущееся облегченіе болѣзни, продолжались у больныхъ. Черезъ недѣлю или двѣ такое состояніе снова смѣнялось усиліемъ горячечныхъ явленій, притомъ съ бѣльшею жестокостію. Оно обыкновенно начиналось ознобомъ, за нимъ появлялся повсемѣстный жгучій жаръ, съ тупою болью въ головѣ надъ бровями, безсонницею и бредомъ, ускореннымъ, мягкимъ и слабымъ пульсомъ; языкъ дѣлался бѣлымъ, желтоватымъ и сухимъ; десны и зубы покрывались темною слізью; губы отъ сухости трескались; испражненія становились жидкими, частыми, темно-желчными; признаки полихеміи то уменьшались, то увеличивались. Такое вторичное ожесточеніе болѣзни продолжалось около 7 дней и болѣе и иногда прекращалось безъ особенныхъ послѣдствій, но въ бѣльшей части случаевъ переходило непосредственно въ первый періодъ тифа.

Съ начала года вплоть до Августа и мѣстами до Сентября, когда характеръ тифа уже сдѣлался болѣе катарральнымъ и воспалительнымъ, — тифозный процессъ повсемѣстно отличался перво-адинамическимъ свойствомъ и сильною склонностію къ порчѣ и разложенію соковъ. Даже въ свѣжихъ случаяхъ весьма быстро по наступленіи первыхъ тифозныхъ явленій замѣчались общее разслабленіе и необыкновенный упадокъ сплѣ, съ частымъ головокруженіемъ, дурнотой и обмороками. При этомъ иногда пульсъ еще представлялся едва ускореннымъ, а



разслабленіе развивалось такъ быстро, что больной чрезъ нѣсколько дней отъ начала болѣзни уже былъ не въ силахъ подниматься съ постели. Такую сильную степень адинамическаго характера въ тифѣ замѣчали повсемѣстно, какъ на югѣ, такъ и на сѣверѣ, особенно въ продолженіе весны и лѣтомъ. Въ это послѣднее время года, параллельно съ господствовавшимъ во многихъ мѣстахъ, особенно на сѣверѣ, скорбутнымъ расположеніемъ, характеръ тифа склонился къ гнилостному и болѣзнь нерѣдко сопровождалась признаками быстраго разложенія крови.

*Тифозная сыпь* (*roseola typhosa*) замѣчалась часто, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда удавалось наблюдать болѣзнь съ самаго ея начала. Сыпь являлась въ видѣ овальныхъ или почти круглыхъ пятнышекъ, иногда нѣсколько возвышенныхъ въ центрѣ своемъ надъ поверхностію кожи, но болѣею частию съ нею равныхъ; величина ихъ равнялась обыкновенно размѣрамъ чечевицы; — цвѣтъ, легко исчезающій при давленіи, въ началѣ былъ блѣдно-розовый, а въ послѣдствіи, именно между 5 и 8 днемъ, дѣлался болѣе темнымъ. Иногда наружные признаки тифозной сыпи были совершенно сходны съ корью. Она показывалась на разныхъ мѣстахъ тѣла и иногда покрывала его совершенно, начинаясь чаще съ груди и рукъ, между 4 и 7 днемъ вполне обнаружившейся болѣзни и развиваясь болѣе и болѣе вмѣстѣ съ дальнѣйшимъ теченіемъ ея. Вообще эта сыпь болѣе показывалась весною и осенью, рѣже зимою и лѣтомъ. Мѣстами она обнаруживалась болѣе сильно и постоянно; особенно часто находили ее у тифозныхъ въ Воронежской и Орловской больницахъ: въ послѣдней болѣе чѣмъ въ половинѣ случаевъ (въ 630 изъ 1,133) была она на всемъ тѣлѣ, преимущественно на спинѣ и груди, съ физическими признаками, мало отличавшимися отъ кори. Въ больницахъ Псковской и уѣздныхъ Сумской и Купянской (Харьковской губерніи)

встрѣчалось также довольно много случаевъ съ рѣзко развитою тифозною сыпью. Въ Газенпотской больницѣ (Курляндской губерніи) въ 6 случаяхъ сильнаго обнаруженія тифозной сыпи, также сходной по наружнымъ признакамъ съ корью, петехій вовсе не замѣчалось, мозговые же явленія тифа наступили только послѣ обнаруженія ея. При эпидемическомъ тифѣ въ Астрахани иногда на 9-й день болѣзни являлся обильный потъ на всемъ тѣлѣ и въ слѣдъ за нимъ обнаруживалась тифозная сыпь, а за тѣмъ иногда начинали ослабѣвать одинъ за другимъ признаки болѣзни. Здѣсь сыпь была особенно замѣтна на шеѣ около ключицъ и на внутренней поверхности плечъ и предплечій.

*Петехіи* составляли одинъ изъ довольно постоянныхъ признаковъ тифа въ истекшемъ году. Повсюду замѣчалось, что пятнистая форма по преимуществу встрѣчалась между больными, прибывавшими изъ проходившихъ воинскихъ командъ, тогда какъ между мѣстными жителями она попадалась болѣе рѣдко. Преобладаніе ея замѣчалось въ больницахъ Таврической, Екатеринославской, Кіевской, Черниговской, Курской, Калужской, Полтавской, Орловской, Минской, Курляндской, Лифляндской, Смоленской, Тверской, Нижегородской и Иркутской губерніи. Въ больницахъ С.-Петербургской губерніи около  $\frac{1}{2}$  больныхъ тифомъ имѣли петехіи, въ Слонимской больницѣ (Гродненской губерніи) содержаніе ихъ равнялось  $\frac{2}{3}$ , во Владимірской и Пензенской  $\frac{1}{3}$ , въ Островской (Псковской губерніи)  $\frac{1}{5}$ . Въ Москвѣ петехіальная форма тифа встрѣчалась чаще во второй половинѣ года. Болѣе рѣдко попадалась она въ больницахъ губерній Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Симбирской, Тамбовской, Вольнской, Подольской, Тифлиской, Херсонской и Харьковской, кромѣ Купянска, гдѣ петехіи при тифѣ встрѣчались въ  $\frac{2}{3}$  общаго числа случаевъ.



Петехіи показывались обыкновенно рано, по большой части между 4 и 7 днем болѣзни, среди признаков ослабленной дѣятельности кожи, въ видѣ пятнышекъ краснопурпуроваго цвѣта, всего замѣтнѣе обнаруживавшихся на спинѣ и нижнихъ конечностяхъ. Мѣстами онѣ принимали багровый цвѣтъ, что замѣчалось чаще именно въ пятнахъ расположенныхъ на этихъ послѣднихъ частяхъ тѣла, причемъ на груди и верхнихъ членахъ пятна удерживали видъ малыхъ красныхъ точекъ, а иногда и вовсе не показывались.

Мѣстами петехіи были развиты въ особенно сильной степени и принимали форму сливныхъ пятенъ большого объема и подтѣковъ, появляющихся при скорбютномъ разложеніи крови. Изъ таковыхъ случаевъ встрѣчались въ Козельской уѣздной больницѣ (Калужской губерніи) на 86 случаевъ тифа 5; петехіи въ нихъ обратились въ крупныя, красноватыя пятна разнообразной формы, при явленіяхъ разложенія крови. Въ Малоярославцевской больницѣ (той же губерніи) большая часть случаевъ тифа сопровождалась сильнымъ развитіемъ петехій темнаго цвѣта, покрывавшихъ особенно грудь и плечи. Въ Медынской больницѣ на 152 случая тифа сильная петехіальная форма замѣчалась въ 42. Въ мужскомъ Отдѣленіи С.-Петербургской больницы чернорабочихъ, помѣщаемомъ въ Исправительномъ заведеніи, лѣтомъ, когда петехіальная форма въ столицѣ была особенно сильно развита, было наблюдаемо 18 случаевъ тифа, въ которыхъ на туловищѣ и конечностяхъ, преимущественно нижнихъ, петехіи перешли въ синія пятна большого объема и неправильнаго очертанія, отъ подтѣковъ крови въ слѣдствіе разложенія ея. На общую цифру больныхъ, пользовавшихся въ другомъ отдѣленіи той же больницы, болѣе  $\frac{1}{2}$  случаевъ тифа принадлежали пятнистой формѣ (685:1,315) и въ 318 изъ нихъ петехіи имѣли видъ темныхъ, синихъ и багровыхъ

пятенъ. Обширныя петехіи на тѣлѣ встрѣчались также между больными изъ проходившихъ командъ въ больницахъ Орловской, Минской и Воронежской губерній, одновременно съ признаками быстраго разложенія крови; въ Павлоградской больницѣ (Екатеринославской губерніи) изъ 443 случаевъ тифа въ 29 въ Январѣ, Февралѣ и Мартѣ петехіи приняли скорбутный характеръ, въ слѣдствіе разложенія крови. Въ Лубенской больницѣ (Полтавской губерніи) изъ 337 случаевъ тифа у 257 больныхъ была петехіальная форма, иногда съ сильнымъ развитіемъ тифозныхъ пятенъ по всему тѣлу. У 4-хъ больныхъ послѣдней категоріи эти пятна были большаго объема и напоминали своими наружными признаками Верльгофову болѣзнь. Всѣ оны окончились смертію; чрезъ нѣсколько часовъ послѣ нея кожа умершихъ отъ слитія тифозныхъ пятенъ въ почти сплошныя и разнообразныя большіе подтѣки представлялась покрытою темносиними полосами, въ особенности на лицѣ, груди и конечностяхъ. Въ той же губерніи встрѣчались случаи петехіальнаго тифа съ крупными пятнами по всему тѣлу, отъ тифознаго разложенія крови, въ Кременчугской и Губернской больницѣ весною и лѣтомъ. Наконецъ въ больницахъ Вяземской и Бѣльской (Смоленской губерніи) между поступившими въ Іюнѣ и Іулѣ больными было также нѣсколько случаевъ, въ которыхъ петехіи переходили въ пятна темносиняго цвѣта, причемъ обнаруживались у больныхъ признаки быстраго разложенія крови.

Въ пищеварительномъ снарядѣ тифозный процессъ выражался повсемѣстно рѣзкими и постоянными явленіями, обличавшими не столько наклонность его къ правильной локализациі въ кишечномъ каналѣ, сколько степень порчи, на которой вообще находились кровотовореніе и питаніе у субъектовъ, подвергавшихся тифу въ текшемъ году. Повсюду абдоминальный характеръ тифа



былъ сильнѣе развитъ въ продолженіе его, чѣмъ когда либо, что въ значительной степени зависѣло отъ временныхъ и случайныхъ условій питанія, въ которыхъ находилась большая часть болѣвнихъ тифомъ. Почти все безъ исключенія заносные случаи его отличались рѣзкими признаками глубокаго страданія пищеваженія, и даже въ мѣстахъ самостоятельнаго развитія тифозныхъ эпидемій болѣзнь по большей части усваивала себѣ абдоминальный характеръ.

На этомъ основаніи однимъ изъ самыхъ обыкновенныхъ признаковъ тифа былъ *поносъ*. Нерѣдко обнаруживался онъ съ самаго начала, съ 4, 5 или 6-го дня болѣзни, когда она развивалась среди переходовъ, или поражала субъектовъ еще до того изнуренныхъ и съ ослабленнымъ питаніемъ, или наконецъ, гдѣ тифъ являлся какъ исходъ гастрическихъ горячекъ и страданій печени и кишекъ, что случалось нерѣдко. Поносъ былъ свойства водянисто-желчнаго и обыкновенно не сопровождался болью, но нерѣдко съ самаго начала учащался до такой степени, что весьма быстро ослаблялъ силы больныхъ и безъ того ослабленныхъ худосочиемъ и дурнымъ питаніемъ. При болѣе благоприятномъ ходѣ болѣзни поносъ постепенно ослабѣвалъ и вовсе исчезалъ, вмѣстѣ съ наступленіемъ критическихъ явленій между 10 и 14-мъ днемъ болѣзни; въ противномъ случаѣ, сопровождая тифъ въ дальнѣйшемъ теченіи его, поносъ ожесточался, изверженія низомъ, постепенно учащаясь, не подчинялись болѣе сознанию больного и притомъ нерѣдко обличали своими качествами быстро развивающееся разложеніе соковъ организма.

При вскрытіяхъ тифозныхъ труповъ въ случаяхъ, гдѣ встрѣчался этотъ видъ поноса, находили: существо желудка и кишечнаго канала блѣднымъ, безкровнымъ и вялымъ; сосуды ихъ совершенно пустыми; на серозной обо-

лочки тонкихъ кишекъ во многихъ мѣстахъ снаружи багровыя кровавыя пятна, величиною отъ горошины до 10-ти копѣчной монеты. На слизистой оболочкѣ тонкихъ кишекъ, совершенно блѣдной и безкровной, попадались мѣстами сѣрыя и синеватыя пятна, расположенныя въ видѣ группъ; при ближайшемъ изслѣдованіи они оказывались фолликулярными нарывами и язвнками. Въ раннихъ періодахъ тифа они ограничивались однимъ тонкими кишками и въ толстыхъ не встрѣчались вовсе. При томъ въ полости кишечнаго канала не было никакого содержимаго, кромѣ газовъ и слизи, тягучей и плотно пристававшей къ стѣнкамъ кишекъ.

Такая форма поноса, сопровождавшая тифъ съ самаго начала его, была не выраженіемъ специфической локализациі болѣзненнаго процесса въ кишечномъ каналѣ, а признакомъ общаго потрясенія питанія организма отъ вліянія общихъ причинъ, за долго предшествовавшихъ и дѣйствовавшихъ медленно и постоянно. Оттого при вскрытіяхъ таковыхъ случаевъ собственно тифозныя язвы въ кишкахъ часто вовсе не встрѣчались и самое напуханіе Пейеровыхъ бляшекъ встрѣчалось рѣдко; такъ что, кромѣ фолликулярнаго процесса, анатомическія измѣненія на слизистой оболочкѣ кишекъ ограничивались признаками катаррального состоянія въ нижнемъ концѣ тонкихъ и началѣ толстыхъ кишекъ. Иногда не смотря на сильное развитіе атоническаго поноса не было вовсе и фолликулярныхъ изъязвленій. Такіе случаи наблюдаемы были въ Нижегородской больницѣ на нѣсколькихъ больныхъ пятнистымъ тифомъ, въ которыхъ поносъ, показавшись съ самаго начала болѣзни, продолжался вплоть до смертельнаго исхода ея.

Вышеописанный видъ поноса въ числѣ главнѣйшихъ признаковъ тифа встрѣчался особенно часто въ больницахъ губерній Исковской, Лифляндской, Смоленской, Ни-



жегородской, Калужской, Орловской, Екатеринославской, Воронежской и Полтавской. Всѣ случаи этой категоріи были заносные и принадлежали проходившимъ воинскимъ командамъ. Сверхъ того раннее появленіе поноса съ самаго начала тифа въ числѣ постоянныхъ признаковъ замѣчалось въ мѣстной тифозной эпидеміи, показавшейся въ Астрахани непосредственно послѣ холеры. Вмѣстѣ съ тѣмъ здѣсь болѣзнь нерѣдко начиналась продолжительными тошнотами и упорною рвотой водянистой, едва окрашенной желчью, жидкости.

Независимо отъ вышеописанной формы, поносъ былъ вообще однимъ изъ преобладающихъ признаковъ тифа въ истекшемъ году во всѣхъ видахъ проявленія его. Правда, въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ онъ поражалъ субъектовъ свѣжихъ, не подвергавшихся предъ тѣмъ медленной порчѣ питанія и условіямъ постепеннаго развитія худосочія, тифозный поносъ развивался только съ наступленіемъ перенаго періода и не обнаруживалъ адинамическаго характера, но тѣмъ не менѣе оставался постояннымъ признакомъ до самаго исхода болѣзни. При всемъ томъ тифозныя отложенія въ кишкахъ не отличались сильною степенью развитія и ограничивались нерѣдко во второмъ періодѣ тифа одною припухlostію Нейеровыхъ бляшекъ, безъ ихъ изъязвленія и образованія струпа, а въ 3-мъ однимъ поверхностнымъ изъязвленіемъ.

Это замѣчалось не только на сѣверѣ, но и на бѣльшей части протяженія южной полосы Имперіи; такъ въ С.-Петербургской больницѣ чернорабочихъ при вскрытіяхъ труповъ умершихъ отъ тифа находили Нейеровы бляшки слабо изъязвленными, а иногда только размягченными и припухшими; чаще же всего встрѣчались при томъ катарральныя изъязвленія прямой кишки (*ulcera diarrhoica*) и иногда фолликулярное нагноеніе солитарныхъ железъ. Въ больницахъ Воронежской, Харьковской и Екатерино-

славской губерніи въ огромномъ числѣ больныхъ абдоминальнымъ тифомъ, съ адинамическимъ характеромъ и постояннымъ поносомъ, тифозныя язвы попадались рѣдко и только тамъ, гдѣ поносъ долго длился; а по большей части тифозныя отложенія ограничивались увеличеніемъ объема и опухолью брызжеечныхъ и признаками гипереміи Пейеровыхъ и Бруннеровыхъ железъ, слизистой оболочки и клѣтчатки кишокъ, брызжейки и иногда брюшины. Притомъ въ огромномъ числѣ наблюдений абдоминальнаго тифа встрѣчались и такіе случаи, въ которыхъ, не смотря на рѣзко-выраженные при жизни признаки страданія кишечнаго канала, не оказывалось никакихъ измѣненій ни въ солитарныхъ, ни въ Пейеровыхъ железахъ его.

Мѣстами, только въ южной полостѣ, кишечная локализція представлялась болѣе рѣзко-выраженною. Въ Александрійской больницѣ Херсонской губерніи, гдѣ призывалось до 533 тифозныхъ больныхъ, въ сильнѣйшихъ степеняхъ болѣзни при вскрытіяхъ находили иногда на всемъ протяженіи нижней трети подвздошной кишки тифозныя глубокія язвы различной величины, покрытыя струпомъ сѣраго, переходящаго въ черный, цвѣта; около нихъ лежали еще не перешедшіе въ изъязвленіе узелки и отвердѣнія, величиною въ небольшую горошину, то порознь, то въ группахъ; на верхушкѣ ихъ видѣлись пуповидныя углубленія, покрытыя струпомъ; по отдѣленіи его открывались фолликулярныя язвы, кругловатой, эллиптической, или иногда неправильной формы, съ краями слабо-опухшими и то рѣзко, то не ясно ограниченными, цвѣта грязнобураго или красноватаго. При этомъ стѣнки подвздошной кишки въ нижней трети ея были утолщены, а слизистая оболочка покрыта толстымъ слоемъ грязновато-желтой студенистой слизи. Съ такою же степенью тифозной локализціи въ кишкахъ встрѣчались отдѣльные случаи



тифа между прибывавшими изъ Крыма больными, мѣстами въ больницахъ губерній Черниговской, Вольнской и Екатеринославской.

Иногда, особенно при усиленіи своемъ въ дальнѣйшемъ ходѣ болѣзни, поносъ при тифѣ бывалъ съ кровью; таковыя случаи наблюдаемы были въ больницахъ Псковской, Калужской, Полтавской, Симферопольской, особенно часто въ Слонимской (Гродненской губерніи), въ Ахтырской и Лебединской (Харьковской), Стародубской (Черниговской), Владимірской (Вольнской) и Павлоградской (Екатеринославской).

Кровь, примѣшанная къ изверженіямъ низомъ, въ началѣ представлялась болѣе жидкою и водянистою, а въ послѣдствіи тѣмною и какъ бы подвергнутою разложению. Отъ этихъ случаевъ рѣзко отличался тѣ, въ которыхъ тифъ усложненъ былъ въ теченіи своемъ дѣйствительнымъ кровавымъ поносомъ, со всеми свойственными ему признаками. Случаи этой категоріи встрѣчались между мѣстными больными въ больницѣ Вытегорской (Олонецкой губерніи) и въ заносныхъ случаяхъ въ Ново-Московской и Павлоградской больницахъ (Екатеринославской), а также мѣстами въ больницахъ губерній Калужской, Московской, Орловской, Нижегородской, Таврической и Воронежской. Иногда кровавый поносъ обнаруживался въ видѣ самостоятельной болѣзни въ періодѣ выздоравливанія отъ тифа; — къ числу таковыхъ наблюдений принадлежатъ 4, сдѣланныя въ Острогжской больницѣ Воронежской губерніи. Кровавый поносъ начинался въ періодѣ выздоравливанія и по нѣскольку разъ возобновлялся; всѣ четверо больныхъ умерли. При вскрытіи ихъ труповъ оказалось, что тифозныя изъязвленія были уже заживлены, а свѣжія и пространныя дизентерическія язвы занимали все протяженіе толстыхъ кишекъ вплоть до слѣпой.

Мѣстами въ теченіи тифа обнаруживались признаки раздраженія печени и желчныхъ путей и развивались желчныя явленія. Это преимущественно было въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ тифъ развивался изъ гастрическихъ горячекъ, или перемежающихся лихорадокъ. При жизни въ случаяхъ такого усложненія правое подреберье представлялось вздутымъ и напряженнымъ; иногда больные чувствовали въ немъ тяжесть и боль, усиливавшуюся особенно при изслѣдованіи; объемъ печени въ началѣ представлялся увеличеннымъ, но въ послѣдствіи приходилъ къ нормальнымъ размѣрамъ, или даже уменьшался; при томъ больные жаловались на горькій вкусъ, языкъ ихъ былъ сильно обложенъ желчью и показывалась желтизна кожи и соединительной оболочки глазъ; испраженія низомъ и урина были насыщены желчью. При вскрытіяхъ такихъ случаевъ, окончивавшихся смертію, находили печень необыкновенно-блѣднаго, свѣтло-песочнаго цвѣта, существо ея дряблымъ, вялымъ, сухимъ и безкровнымъ, безъ дальнѣйшихъ измѣненій ткани, даже подъ микроскопомъ; желчный пузырь сжатымъ, почти пустымъ или содержащимъ весьма мало желчи. Желчный характеръ тифа сопровождался усиленіемъ его смертельности, быть можетъ отъ того, что самое проявленіе его основывалось на предшествовавшемъ продолжительномъ болѣзни другими болѣзнями, при которыхъ глубже потрясались кровотовереніе и питаніе организма. По большей части онъ замѣчался между заносными случаями тифа, прибывавшими въ больницы въ полномъ развитіи болѣзни, начавшейся въ видѣ исхода другихъ острыхъ болѣзней на переходахъ, при совокупномъ дѣйствіи разнородныхъ болѣе или менѣе враждебныхъ вѣншихъ вліяній. Такіе случаи встрѣчались чаще прочихъ въ больницахъ Одесской, Бобринецкой и Александрійской (Херсонской губерніи), въ Симферопольской (Тавриче-



ской), въ Павлоградской (Екатеринославской), въ Полтавской и Кременчугской (Полтавской), въ Тамбовской и Липецкой (Тамбовской), въ больницахъ Калужской губернии и особенно въ Медынской, въ Рязанской, Смоленской, Псковской, Нижегородской, въ Старицкой (Тверской губернии), Веррской (Лифляндской), Киренской (Пркутской) и въ С.-Петербургской больницѣ для черноработныхъ. Въ С.-Петербургѣ, Симферополѣ и Одессѣ появленіе тифа съ желчными признаками совпадало съ развитіемъ скорбута;—въ другихъ же мѣстахъ съ усиленіемъ перемежающейся лихорадки. Вообще случаи его принадлежали по большей части концу весны, началу и среднѣмъ лѣта и началу осени. Изъ вышеисчисленныхъ мѣстъ чаще всего встрѣчались они въ Симферополѣ, затѣмъ въ Медынской больницѣ Калужской губернии, гдѣ на 152 тифозныхъ, доставленныхъ изъ проходившихъ чрезъ губернію командъ, было ихъ 108; въ Павлоградской больницѣ Екатеринославской губернии число ихъ ограничивалось 25 на 443 случая тифа; въ больницахъ С.-Петербургской для черноработныхъ и Тамбовской губернской они встрѣчались въ соотношеніи 1 : 40.

Измѣненія въ селезенкѣ при тифѣ наблюдаемы были въ истекшемъ году довольно постоянно. У большей части больныхъ при жизни находили объемъ этого органа замѣтно увеличеннымъ, припухшимъ и напряженнымъ. При изслѣдованіи и ощупываніи лѣваго подреберья больные обыкновенно обнаруживали возвышенную чувствительность, или даже чувствовали боль, а иногда и безъ изслѣдованія жаловались на глухую боль, или колюще въ сторонѣ селезенки. Замѣчательно сдѣланное въ этомъ отношеніи наблюденіе надъ многими тифозными въ Веррской больницѣ Лифляндской губернии, гдѣ замѣтное увеличеніе объема селезенки составляло одно изъ постоянныхъ явленій при тифѣ, но ни одинъ больной не

чувствовали въ ней боли и даже не обнаруживали усиленной чувствительности ни при изслѣдованіи ея, ни вѣс его. Пораженіе селезенки при тифозномъ процессѣ не составляло исключительной принадлежности отдѣльных мѣстныхъ эпидемій, но замѣчалось довольно постоянно во всѣхъ полосахъ Имперіи, такъ на сѣверѣ въ больницахъ Вятской, С.-Петербургской, Исковской, Лифляндской и Тверской губерній, въ средней полосѣ въ больницахъ Смоленской, Калужской, Черниговской, Тамбовской, на югѣ въ Полтавской, Харьковской, Екатеринославской и Херсонской губерніяхъ. Случаи тифа, пользовавшиеся въ больницахъ Иркутской губерніи, также по большей части сопровождались этимъ признакомъ. Особенно постоянно встрѣчался онъ и сильнѣе обнаруживался тамъ, гдѣ тифъ развивался изъ перемежающейся лихорадки; въ такихъ случаяхъ увеличеніе размѣровъ селезенки находили и до наступленія первыхъ патогномическихъ признаковъ тифа. Равно являлось оно болѣе часто при самостоятельномъ заболѣваніи тифомъ въ тѣ времена года, когда мѣстный тифозный характеръ былъ сильно развитъ. Отношеніе это было наблюдаемо въ Полтавской губернской больницѣ весною, въ началѣ и срединѣ лѣта и осенью, когда перемежающіяся лихорадки сильно господствовали. Въ С.-Петербургской больницѣ для чернорабочихъ постоянно находили увеличеніе объема селезенки при тифѣ въ теченіи всего года.

Тифозное пораженіе этого органа встрѣчалось при всѣхъ видахъ тифа, какъ пятнистомъ, такъ брюшномъ и мозговомъ; болѣзненно-возбужденная дѣятельность отдѣленій кишечнаго канала по видимому также не обнаруживала замѣтнаго вліянія на развитіе и степень этого явленія. Оно замѣчалось и въ болѣе рѣдкихъ въ 1856 году случаяхъ задержаній кишечныхъ отдѣленій въ первыхъ періодахъ пятнистаго и мозговаго тифа, и при



обильныхъ поносахъ, сопровождавшихъ иногда съ самаго начала брюшную форму тифа. Изъ прочихъ симптомовъ болѣзни всего чаще оно сопровождалось обильнымъ и упорнымъ кровотеченіемъ изъ носу.

При вскрытіяхъ труповъ селезенку находили обыкновенно увеличенною въ объемѣ, иногда вдвое и даже втрое болѣе нормальнаго; существо ея дряблымъ, рыхлымъ и размягченнымъ до такой степени, что оно растягивалось между пальцами и при простомъ наглядномъ изслѣдованіи казалось утратившимъ признаки нормальнаго строенія. Цвѣтъ ея былъ темно-бурый, темно-вишневый и дегтярно-черный. Ни же увеличеніе объема этого органа сопровождалось уплотненіемъ его ткани до кажущагося сходства съ мышечною (*carnificatio*), съ увеличеніемъ сухости и ломкости, причемъ поверхность разрѣза представлялась блестящею, какъ бы салною, а разломъ — крупно-зернистымъ. Иногда при томъ встрѣчалась въ селезенкѣ геморрагическіе инфаркты по большей части клиновидной и иногда неправильной формы. Распадаясь въ гнойное размягченіе, они превращались въ парывы различной величины, отъ размѣровъ горошины до объема цѣлой половины органа, увеличеннаго во всѣхъ направленіяхъ. Въ одномъ изъ такихъ случаевъ въ уѣздной Новгородъ-Сѣверской больницѣ (Черниговской губерніи) вся селезенка, увеличенная вдвое, была обращена въ мѣшокъ, наполненный гноемъ, съ свертками черной клочковатой массы. Тифозный субъектъ этого наблюденія въ продолженіе двухъ послѣднихъ лѣтъ часто страдалъ перемежающеюся лихорадкою.

Что касается до участія органовъ дыхательнаго снаряда въ тифозномъ процессѣ, то оно преимущественно обнаруживалось въ эпидеміяхъ, развивавшихся зимою, весною и осенью въ холодное и сырое время года. Всего чаще останавливалось оно на степени катаррального

болѣе или менѣе сильнаго воспаленія вѣтвей дыхательнаго горла. Больные жаловались на стѣсненіе и сухость въ гортани, боль во всей груди, особенно около развѣтвленія горла, и кашель сильный, частый и сухой; на 2 или 3 день отъ начала этихъ признаковъ показывались тягучія, вязкія, клейкія мокроты, то прозрачныя, то мутныя, иногда съ примѣсью крови, сообщавшею имъ ржавый цвѣтъ, или обличавшеюся болѣе или менѣе замѣтными въ нихъ кровавыми жилками. При изслѣдованіи груди въ этихъ случаяхъ былъ слышенъ повсюду разсѣянный слизистый хрипъ, съ притупленіемъ перкуссiоннаго звука въ задней и нижней части груди; бiеніе сердца притомъ рѣзко ощущалось на всѣхъ мѣстахъ грудной кѣтки. Грудныя явленія ослабѣвали съ усиленіемъ отдѣленія болѣе жидкой мокроты, съ появленіемъ влажности на слизистой оболочкѣ рта и носа, какъ равно и при обнаруженіи пота. Эта форма страданія дыхательнаго снаряда нерѣдко встрѣчалась въ истекшемъ году, какъ спутникъ тифа съ самаго начала его, зимою, весною и осенью, особенно въ заносныхъ случаяхъ, поступавшихъ въ больницы послѣ дальнихъ переходовъ. Въ больницахъ губерній С.-Петербургской, Псковской, Лифляндской, Тверской, Костромской, Смоленской, Гродненской, Московской, Калужской, Нижегородской, Орловской, Тульской, Могилевской, Черниговской, Полтавской, Курской, Вольинской, Кіевской, Тамбовской, Екатеринославской, Подольской, Харьковской и Херсонской, ихъ было особенно много: въ Тамбовской губернской больницѣ у  $\frac{9}{10}$  общаго числа тифозныхъ больныхъ (379:421) замѣчалось преобладаніе катарральныхъ пораженій грудныхъ органовъ и воспаленія вѣтвей дыхательнаго горла; въ Иркутской губернской больницѣ тифозные больные въ Декабрѣ и Январѣ, во время мѣстной эпидеміи, почти всѣ безъ исключенія представляли эти же признаки,



также какъ и пользовавшиеся въ Валкской больницѣ Лифляндской губерніи; затѣмъ чаще прочихъ больницъ встрѣчались они между больными въ Курской и уѣздныхъ Опоченской и Островской (Исковской губерніи) съ Января по Апрѣль, въ Борзенской (Черниговской) и Сквирской (Кіевской) съ Марта по Іюнь, въ Щигровской (Курской) въ Іюнь и въ Новгородъ-Сѣверской (Черниговской) осенью. Въ больницахъ Борисовской (Минской губерніи) они были у  $\frac{3}{4}$ , въ Бѣлевской (Тульской) и Заславьской (Вольнской) у  $\frac{1}{2}$ , въ Бронницкой (Московской) у  $\frac{2}{5}$ , въ Костромской и Лужской (С.-Петербургской) у  $\frac{1}{3}$ , въ Сумской, Купянской и Ахтырской (Харьковской) у  $\frac{1}{4}$ , въ Лубенской (Полтавской) у  $\frac{1}{6}$  и въ Павлоградской (Екатеринославской) у  $\frac{1}{3}$  общаго числа тифозныхъ.

Въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ случаяхъ страданіе вѣтвей дыхательнаго горла являлось въ видѣ локализациі тифознаго процесса и сопровождалось опухолью и специфическою инфильтраціей бронхиальныхъ железъ. Такіе случаи иногда встрѣчались въ Тверской губернской больницѣ изъ большого числа попадавшихся въ ней случаевъ усложненія тифа страданіемъ органовъ дыхательнаго снряда. Затѣмъ иногда тифозный процессъ локализовался на слизистой оболочкѣ гортани; такіе случаи были наблюдаемы въ числѣ 7 на 211 тифозныхъ въ Нижегородской больницѣ: три изъ нихъ окончились смертію; въ числѣ 2 на 514 въ Миргородской, въ числѣ 4 на 399 въ Гадячской (Полтавской), въ 2 на 168 въ Лужской (С.-Петербургской) и въ Кролевецкой больницѣ (Черниговской губерніи) въ 1 случаѣ на 40. — Иногда же катаральное пораженіе вѣтвей дыхательнаго горла возвышалось до степени капилярнаго воспаленія ихъ, какъ замѣчалось это зимою, даже на югѣ и въ числѣ другихъ мѣстъ въ Сумской больницѣ (Харьковской) и въ Павлоградской (Екатеринославской губерніи).

Нли же развивалось дольчатое и цѣльнодольное воспаление легкихъ, съ геморрагическими инфарктами и болѣе или менѣе обширнымъ опечененіемъ ткани пхъ. Этотъ видъ тифозной локализациі представлялся особенно губительнымъ. Чаше всего встрѣчался онъ въ сѣверной полосѣ Имперіи; такъ въ Тверской губернской больницѣ въ большомъ числѣ больныхъ съ пятнистымъ тифомъ онъ попадался перѣдко и былъ одною изъ главныхъ причинъ огромной смертности отъ тифа, равнявшейся содержанію 1:4 (119:476). Въ Валдаѣ Новгородской губерніи наблюдали его у  $\frac{1}{4}$  большихъ (23:96); затѣмъ изъ больницъ Тверской губерніи въ Корчевской встрѣчался онъ въ 5 случаяхъ на 52, въ Осташковской въ 2 на 14 и въ Бѣжецкой въ 2 на 19 случаевъ тифа. Въ Вытегорской больницѣ Олонецкой губерніи у  $\frac{1}{3}$  тифозныхъ было развито воспаление легкихъ; также довольно часто встрѣчалось оно у тифозныхъ въ больницахъ Архангельской, при промыслахъ Томской губерніи, въ Нижнеудинской и Киренской (Иркутской губерніи), въ С.-Петербургской больницѣ для чернорабочихъ, особенно съ Августа по Декабрь, въ Валкской (Лифляндской) и въ Порховской (Псковской губерніи). Въ средней полосѣ тифозная пневмонія была наблюдаема въ Козельской больницѣ (Калужской губерніи) у 1:6, въ Бѣлевской (Тульской) у 1:7, въ губернской Пензенской у 1:10, въ Симбирской у 1:14, въ Слонимской (Гродненской) 1:29, въ Курской у 1:48, въ Клинской (Московской) у 1:54, въ Нижегородской у 1:70 и въ Богородской (Московской губерніи) у 1:163. Въ южной полосѣ Имперіи тифозныя воспаленія легкихъ встрѣчались въ больницахъ Полтавской, Харьковской, Черниговской и Екатеринославской губерніи весною и зимою, чаше при пятнистой, чѣмъ другихъ формахъ тифа. Содержаніе ихъ въ общемъ числѣ случаевъ было въ Бахмутской больницѣ (послѣд-



ней губерніи), какъ 1 : 12, въ Александрійской (Херсонской), какъ 1 : 19 и въ Павлоградской (Екатеринославской), какъ 1 : 26.

Воспаленіе легкихъ, сопровождаѣ тифъ, не только какъ видъ тифозной локализациі, но и какъ случайное усложненіе усиливало смертность отъ него въ среднемъ выводѣ до содержанія 1 : 3. При вскрытіяхъ труповъ находили въ такихъ случаяхъ въ легкихъ всѣ признаки опечененія на бѣльшемъ или меньшемъ протяженіи, иногда съ мѣстнымъ помертвѣніемъ. Изъ нѣсколькихъ наблюденій этой категоріи замѣчательныя случаи, бывшіе въ Орловской больницѣ: у больного при явленіяхъ втораго періода тифа обнаружилось воспаленіе праваго легкаго на всемъ его протяженіи, притомъ кишечныя отдѣленія оставались правильными какъ въ первомъ, такъ и во второмъ періодѣ болѣзни, сопровождавшихся симптомами общаго тифознаго состоянія во всемъ ихъ составѣ; во второмъ періодѣ показался кашель съ кровавою мокротою, затрудненіемъ дыханія и всѣми объективными признаками опечененія праваго легкаго. Въ третьемъ періодѣ больной умеръ. При вскрытіи тѣла его найдено гангренозное помертвѣніе верхней части праваго легкаго, съ опечененіемъ нижней.

Въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ случаяхъ тифъ сопровождался кровохарканіемъ; признакъ этотъ былъ наблюдаемъ у 1 больного въ Малоархангельской больницѣ (Орловской губерніи), у 3 въ Богородской (Московской) и у нѣсколькихъ больныхъ въ Павлоградской (Екатеринославской). Наконецъ въ большей части случаевъ тифа и притомъ повсемѣстно обнаруживались гипостатическіе застои въ легкихъ со всѣми ихъ явленіями, въ слѣдствіе продолжительнаго лежанія больныхъ при ходѣ болѣзни по большей части медленномъ. Во всякомъ случаѣ

они принадлежали къ числу условій, усиливавшихъ смертность отъ тифа въ истекшемъ году.

Преобладаніе мозговыхъ и нервныхъ явленій въ тифѣ не вездѣ обнаруживалось въ одинаковой степени. Зимой въ сильные морозы церебральная форма тифа встрѣчалась болѣе часто и на сѣверѣ мѣстами исключительно. Преобладаніе ея въ это время года надъ другими формами болѣзни замѣчалось въ больницахъ: Иркутской, Киренской (Иркутской губерніи), Сосницкой и Новгородъ-Сѣверской (Черниговской), Устюжской (Вологодской), Архангельской, Кашинской (Тверской), Перемышльской (Калужской), Заславльской (Вольнской), Винницкой (Подольской) и Зеньковской (Полтавской). Въ больницахъ уѣздной Бѣлевской (Тульской губерніи) и губернской Костромской число случаевъ мозгового тифа было почти наравнѣ съ брюшнымъ; въ Бронницкой (Московской губерніи), Бахмутской (Екатеринославской) и Владимірской (Вольнской) оно составляло  $\frac{1}{4}$ , въ Богородѣской (Московской) и Кобринской (Гродненской)  $\frac{1}{6}$ , въ Лубенской (Полтавской)  $\frac{1}{7}$ , въ губернской Харьковской  $\frac{1}{8}$  и въ Псковской  $\frac{1}{16}$  общаго числа тифозныхъ. Въ Полтавской губерніи вообще мозговая форма была преимущественно развита на мѣстныхъ жителяхъ, а большая часть заносныхъ случаевъ въ больницахъ были съ брюшнымъ и пятнистымъ тифомъ; лѣтомъ же и между ними чаще встрѣчались случаи тифа съ поражениемъ головного и спиннаго мозга, также въ больницахъ Рязанской губерніи во время засухи и въ Лебединской Харьковской; въ Саратовской губерніи преобладаніе мозговыхъ признаковъ въ тифѣ замѣчалось весною и осенью.

Пораженіе мозга при тифѣ возвышалось иногда до активнаго воспаленія оболочекъ и существа его, сопровождавшагося постояннымъ, бѣшенымъ бредомъ, судорогами, сведеніемъ и параличемъ членовъ. Въ числѣ таковыхъ были наблюдаемы 52 случая на 533 тифозныхъ



въ Александрійской больницѣ (Херсонской губерніи), въ 33-хъ изъ нихъ были особенно сильныя судороги въ членахъ; 10 на 16½ въ Сумской больницѣ (Харьковской), въ 9-ти изъ нихъ было воспаление мозгового существа съ признаками эксудата въ желудочкахъ, всѣ они окончились смертію, въ 1 воспаление оболочекъ мозга; 10 случаевъ также воспаления оболочекъ со всѣми признаками менингита встрѣтилось въ Орловской губернской больницѣ (на 1,133 больныхъ), 15 въ С.-Петербургской больницѣ для чернорабочихъ, въ промежуткѣ времени съ 1 Августа по Декабрь; 2 случая въ уѣздной Бѣжецкой больницѣ (Тверской губерніи), 2 въ Слонимской (Гродненской) и 6 въ Островской (Исковской). Въ Архангельской губернской больницѣ и въ Киренской уѣздной (Иркутской губерніи) тифозные больные, прибывавшіе въ сильные морозы, по большей части обнаруживали признаки воспаления мозга и оболочекъ его. Въ Воронежской губернской больницѣ въ теченіе года въ 20 случаяхъ на 815 тифозныхъ обнаруживались признаки воспаления мозжечка, продолговатого и шейной части спинного мозга; среди полной картины тифозныхъ явленій у больныхъ являлись спазматическія сокращенія мышцъ верхнихъ конечностей и челюстей. Изъ 7 изъ нихъ, окончившихся смертію, въ 3 найденъ былъ пластическій выпотъ, покрывавшій эти органы нервной системы; въ 1-мъ онъ имѣлъ водянистыя свойства, а въ 3-хъ остальныхъ анатомическія измѣненія пораженныхъ органовъ ограничивались признаками воспалительнаго стаза крови. Въ Пинской больницѣ (Минской губерніи) въ одномъ случаѣ тифа съ поражениемъ печени, легкихъ и селезенки, болѣзненные явленія сопровождалась признаками, сходными съ апоплектическими; при вскрытіи тѣла умершаго больного правая половина мозжечка и червеобразный отростокъ найдены были размягченными.

Раздраженіе спиннаго мозга въ числѣ признаковъ брюшнаго тифа обнаруживалось въ нѣсколькихъ отдѣльных случаяхъ въ Курской больницѣ постоянными судорожными движеніями въ рукахъ и ногахъ, наступавшими обыкновенно послѣ 7 дня; также въ Тарской Тюремной больницѣ Тобольской губерніи тифъ сопровождался судорогами конечностей, перешедшими въ 2 случаяхъ въ параличъ и въ 1 въ сведеніе ихъ. Сверхъ того признаки воспаленія спиннаго мозга были въ 4 случаяхъ въ Лубенской больницѣ (Полтавской губерніи) и въ 2 въ Новоржевской (Псковской); въ одномъ изъ нихъ по окончаніи тифа остался параличъ правой ноги, а въ другомъ обѣихъ рукъ. Въ Островской больницѣ (той же губерніи) въ 5 случаяхъ тифа съ страданіемъ спиннаго мозга былъ наблюдаемъ спазмъ глотательныхъ мышцъ и въ 1 тризмъ; въ Лубенской больницѣ въ 3 случаяхъ параличъ глотки, въ Петрозаводской въ 1 совершенная потеря голоса. Къ этой же категоріи признаковъ должны быть отнесены нѣсколько разъ встрѣчавшіяся у тифозныхъ больныхъ въ Воронежской губернской больницѣ спясныя боли по направленію бедренныхъ и берцовыхъ нервовъ, отъ большой сѣдалищной вырѣзки внизъ до самой подошвы. Вмѣстѣ съ тѣмъ больные жаловались на постоянную тупую боль въ нижнихъ конечностяхъ.

Страданіе головнаго и спиннаго мозга въ продолженіе тифа въ различной степени влекло за собою нерѣдко нарушенія въ способностяхъ чувства и движенія, оставшіяся и по выздоровленіи больныхъ. Въ числѣ таковыхъ были наблюдаемы 1 случай амауроза въ Валкской больницѣ (Лифляндской), 3 случая паралича пузыря въ Лубенской больницѣ (Полтавской губерніи) и случай паралича верхнихъ и нижнихъ конечностей во многихъ больницахъ. Въ Слонимской больницѣ Гродненской губерніи 1 случай тифа съ локализациею въ существѣ мозга



окончился совершеннымъ притупленіемъ умственныхъ способностей.

Почти повсюду тифъ въ истекшемъ 1856 году отличался особенною длительностію въ теченіи своемъ. Поражая по большей части организмы съ ослабленнымъ питаніемъ и нарушенною цѣльностію въ составѣ соковъ, притомъ часто совершая теченіе при невыгодныхъ условіяхъ виѣшней жизни больныхъ, тифозный процессъ рѣдко разрѣшался правильными и въ срокъ наступавшими критическими явленіями. Особенно медленно протекалъ періодъ выздоравливанія; слабость мышечныхъ силъ, тяжелое чувство изнеможенія, признаки общаго изнуренія, ослабленнаго питанія организма и разжиженнаго состоянія крови нерѣдко не проходили долго и по окончаніи болѣзни. Въ числѣ содѣйствовавшихъ тому причинъ главное мѣсто занималъ поносъ: въ большей части заносныхъ случаевъ тифа, составлявшихъ большинство пользовавшихся отъ него въ гражданскихъ больницахъ въ истекшемъ году, не уступая никакимъ врачебнымъ пособіямъ, поносъ оставался, какъ исходъ тифа и изнуря болнаго замедлялъ возстановленіе силъ его. Бывали случаи, въ которыхъ онъ продолжался по 6 — 8 и даже 12 недѣль. Особенно часто этотъ видъ исхода тифа наблюдаемъ былъ въ больницахъ губерній: Олонецкой, С.-Петербургской, Псковской, Гродненской, Смоленской, Костромской, Симбирской, Московской, Калужской, Тамбовской, Рязанской, Курской, Кіевской, Полтавской, Воронежской, Екатеринославской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Астраханской и области Бессарабской; даже въ тифозныхъ эпидеміяхъ, обнаруживавшихся въ Сибирскихъ губерніяхъ, замѣчалась склонность къ этому исходу тифа, какъ видно изъ отчетовъ Городовой Иркутской и Тюремной Тарской больницы Тобольской губерніи. Въ больницахъ Петрозаводской гу-

бернской и уѣздныхъ Сумской (Харьковской) и Стародубской (Черниговской губерніи) онъ послѣдовалъ болѣе чѣмъ въ  $\frac{1}{3}$  случаевъ тифа, въ Богородской уѣздной больницѣ Московской губерніи у  $\frac{1}{5}$ , въ С.-Петербургской больницѣ для чернорабочихъ, съ Мая по Августъ, у  $\frac{1}{3}$  общаго числа больныхъ. Въ Херсонской губерніи, особенно въ Херсонѣ, Бобринцѣ, Бериславлѣ и Николаевѣ поносъ въ періодъ выздоравливанія отъ тифа, упорный и не уступавшій леченію, замѣчался преимущественно зимою. По виду и степени процесса изъязвленія кишекъ, свойства поноса не всегда были одинаковы; тамъ, гдѣ оно ограничивалось простыми фолликулярными язвами, поносъ оставался слизистымъ и водянисто-желчнымъ, съ малыми примѣсями гноя, открывавшимися при микроскопическомъ изслѣдованіи. Въ другихъ же случаяхъ, гдѣ язвы проникали глубже, были окружены сильнымъ катарральнымъ воспаленіемъ или усложнялись дизентерическими язвами, — изверженія низомъ становились похожими на мясные помои и пополнялись кусками эпителия, зернистыми, сѣроватыми, безвидными массами разрушенныхъ слизистой и клетчаточной оболочекъ кишекъ, пластинками крупозныхъ эшаръ, болѣе обильнымъ количествомъ гноя и кровью, то жидкою, то густою, темною и разложившеюся. Такія изверженія нерѣдко обнаруживали гангренозный запахъ и сопровождались сильными и мучительными тенезмами, увеличивавшими изнуреніе и слабость больного. Тенезмы замѣчались и въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ простыя фолликулярныя язвы, безъ усложненія дизентерическими, располагались группами въ прямой кишкѣ, современно съ хроническимъ катарральнымъ воспаленіемъ и утолщеніемъ ея оболочекъ. — Случаи поноса въ послѣдней вышеописанной формѣ были наблюдаемы въ истекшемъ году чаще другихъ въ больницахъ Екатеринославской и Рязанской и



уѣздныхъ Вяземской и Гжатской (Смоленской), Золотоношской, Пирытинской и Лубенской (Полтавской), Борзенской и Остерской (Черниговской губерніи).

При сильномъ развитіи язвъ тифозныхъ, во второмъ и третьемъ періодѣ тифа, и фолликулярныхъ, преимущественно въ періодѣ выздоравливанія, послѣдовало иногда прободеніе стѣнокъ кишечнаго канала, съ неотразимымъ исходомъ въ воспаленіе брюшины и смерть. Таковыхъ случаевъ было:

8:819 съ Мая по Августъ въ отдѣленіи С.-Петербургской больницы для чернорабочихъ, помѣщаемомъ въ исправительномъ заведеніи;

4:533 въ уѣздной Александрійской больницѣ (Херсонской губерніи);

3:966 » Полтавской губернской больницѣ;

3: 95 » уѣздной Островской больницѣ (Псковской);

2:164 » Сумской и

2: 62 » Купянской (Харьковской);

2: 51 » Владимірской (Волынской);

2: 66 » Гайсинской (Подольской) и

1: 10 » Ровенской (Волынской).

Пока не прекращался поносъ въ исходномъ періодѣ тифа, питаніе организма не возстановлялось и въ сокахъ его не пополнялись оскудѣвшія отъ болѣзненнаго процесса составныя части. Кровотвореніе оставалось ослабленнымъ и нарушеннымъ, какъ отъ продолжающагося страданія кишечнаго канала, такъ и отъ послѣдовательнаго патологическаго состоянія печени, селезенки и брызжеечныхъ желѣзъ, въ которыхъ притомъ нерѣдко замедлялось разрѣшеніе тифозной инфильтраціи. Анемія и разжиженіе крови являлись неотразимыми послѣдствіями такого упадка кровотоворенія; при общей слабости и худобѣ скоро являлись отѣкъ конечностей, подкожная водянка и накопленія экссудата въ серозныхъ полостяхъ,

тѣмъ упорнѣе не уступавшія врачевнымъ пособіямъ, чѣмъ тѣснѣе была ихъ патогеническая связь съ упадкомъ питанія и кровотоверенія организма. Иногда эти гидремические явленія едва проходили послѣ 3 мѣсячнаго постояннаго и энергическаго леченія. Разные виды водянки въ исходномъ періодѣ тифа замѣчались чаще прочихъ въ больницахъ губерній Ярославской, Вольнской, Московской, Воронежской, Гродненской, С.-Петербургской, Харьковской, Лифляндской, Екатеринославской, Нижегородской, Новгородской и Тамбовской. Въ отдѣленіи С.-Петербургской больницы для черноработныхъ, помѣщающемся въ исправительномъ заведеніи, съ Мая по Августъ, въ 69 на 819 пользованныхъ случаевъ тифа, слѣдовательно почти въ  $\frac{1}{2}$ , обнаружился отѣкъ нижнихъ конечностей; въ уѣздной Валдайской больницѣ (Новгородской губерніи) изъ 96 тифозныхъ признаки водянки послѣ тифа показались у 9; въ Шатской (Тамбовской) почти у всѣхъ 33 больныхъ, пользованныхъ отъ тифа въ Сентябрь и Октябрь, обнаружались явленія подкожной и полостной водянки; всѣ послѣдніе больные принадлежали командамъ, прибывавшимъ изъ Крыма. Въ Воронежской больницѣ въ нѣсколькихъ случаяхъ отѣкъ у тифозныхъ не ограничивался одиѣмъ нижними, но замѣчался и въ верхнихъ конечностяхъ. Гораздо рѣже встрѣчался этотъ видъ исхода тифа въ другихъ больницахъ и въ большей части губерній, сверхъ вышеисчисленныхъ, вовсе не попадался.

Мѣстами выздоравливаніе отъ тифа замедлялось развитіемъ послѣдовательнаго скорбутнаго худосочія. Наклонность къ тому принадлежала впрочемъ къ исключительнымъ особенностямъ прошлогодняго тифа и то лишь въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ. Тѣмъ замѣчательнѣе встрѣчавшееся въ уѣздной Слонимской больницѣ (Гродненской губерніи) появленіе цинготныхъ явленій въ  $\frac{1}{10}$  об-



шаго числа тифозныхъ случаевъ. Затѣмъ чаще другихъ мѣстъ они были наблюдаемы въ больницахъ Вятской губерніи, и 5 разъ въ 211 случаяхъ тифа въ Нижегородской губернской больницѣ. Изъ этихъ послѣднихъ одинъ окончился смертію; при вскрытіи его найдены были признаки воспаленія около-сердечной сумки съ обильнымъ скорбутнымъ выпотѣніемъ. Въ другихъ мѣстахъ тифозное разжиженіе крови выражалось одною склонностію къ кровотечениямъ изъ носа, рта, зѣва и задняго прохода. Таковыя случаи попадались въ больницахъ Полтавской, С.-Петербургской для черноработныхъ, Павлоградской (Екатеринославской), Лебединской и Ахтырской (Харьковской) и Богородской (Московской губерніи). Въ послѣдней было два случая кровавой мочи при тифѣ.

Въ психодныхъ періодахъ тифа въ истекшемъ году мѣстами особенно часто встрѣчалось воспаленіе предъушной железы. Скрывались ли причины, располагавшія къ тому въ особенностяхъ мѣстныхъ эпидемій, или были онѣ основаны на условіяхъ самаго призранія и пользованія больныхъ, осталось неуясненнымъ;—но вообще содержаніе случаевъ тифа, въ которыхъ обнаруживалось воспаленіе предъушной железы, къ общему числу тифозныхъ, пользовавшихся въ больницахъ гражданскаго вѣдомства, было замѣчательно велико. Оно равнялось:

- 1 : 2,8 въ уѣздной Владимірской больницѣ Вольнской губерніи (18:51, притомъ въ 6 случаяхъ воспаленіе железы было на обѣихъ сторонахъ);
- 1 : 3,4 » уѣздной Борисовской больницѣ Минской губерніи (52:178, притомъ въ 45 случаяхъ было оно на обѣихъ сторонахъ);
- 1 : 4,3 » уѣздной Чистопольской больницѣ Казанской губерніи;
- 1 : 5,5 » уѣздной Сумской больницѣ Харьковской губер-

- ни (30:164; въ 3 случаяхъ воспаленіе железы перешло въ полумертвѣніе);
- 1: 6 въ уѣздныхъ больницахъ Рѣчинской (Витебской), Корчевской (Тверской) и Путивльской (Курской губерніи) (29:169);
- 1: 6.4 » уѣздноі Валдайской больницѣ Новгородской губерніи (15:96);
- 1: 7 » Лубенской больницѣ Полтавской губерніи (48:337);
- 1: 7,3 » уѣздноі Старобѣльской больницѣ Харьковской губерніи (6:44);
- 1: 8.5 » уѣздноі Бахмутской больницѣ Екатеринославской губерніи (12:102);
- 1: 8,7 » Кременчугской больницѣ Полтавской губерніи (80:702);
- 1: 9 » Вытегорской больницѣ Олонецкой губерніи;
- 1: 11 » Черноярской больницѣ Астраханской губерніи;
- 1: 12 » губернской Петрозаводской больницѣ;
- 1: 13 » губернской Нижегородской больницѣ (16:211);
- 1: 14 » уѣздныхъ больницахъ Слонимской и Сокольской Гродненской губерніи (11:158);
- 1: 15 » уѣздноі Медынской больницѣ Калужской губерніи (10:152; въ двухъ случаяхъ воспаленіе железы перешло въ помертвѣніе);
- 1: 16 » больницахъ уѣздноі Гадячской Полтавской губерніи (25:399) и въ губернской Орловской (68:1,133, притомъ часто съ обѣихъ сторонъ);
- 1: 17 » Александрійской уѣздноі больницѣ Херсонской губерніи (31:533, притомъ въ 25 случаяхъ на обѣихъ сторонахъ);
- 1: 19 » губернской Ярославской больницѣ (10:188);
- 1: 20 » губернской Воронежской больницѣ (40:815, съ обѣихъ сторонъ въ 11 случаяхъ);
- 1: 26 » больницахъ уѣздноі Павлоградской (17:443)



Екатеринославской губернии и въ Симбирской городской (6:159);

1: 27 въ отдѣленіи С.-Петербургской больницы для чернорабочихъ, помѣщаемомъ въ исправительномъ заведеніи съ Мая по Декабрь (46:1,224, при томъ въ 5 случаяхъ на обѣихъ сторонахъ и въ 12 съ исходомъ въ помертвѣніе);

1: 32 » Вятской губернской больницы (6:190);

1: 37 » уѣздной Богородской больницы Московской губернии (5:186);

1: 39 » Валкской уѣздной больницы Лифляндской губернии (5:195);

1: 43 » Козельской уѣздной больницы Калужской губернии (2:86);

1:47,5 » Островской уѣздной больницы Псковской губернии (2:95).

Сверхъ того воспаленіе предъушной железы часто сопровождало тифъ въ больницахъ Витебской, Екатеринославской, Псковской, Костромской, Гродненской, Курской и Тамбовской; въ двухъ послѣднихъ особенно осенью и зимою, когда затруднялось освѣженіе больничныхъ палатъ; также въ Одесской и въ уѣздныхъ больницахъ Невельской (Витебской губернии), Старооскольской (Курской), Сквирской (Кіевской), Зеньковской (Полтавской), Ростовской (Екатеринославской), Лебединской и Ахтырской (Харьковской), Бобрынецкой (Херсонской), Борзенской (Черниговской) и Чухломской (Костромской губернии). Въ другихъ же мѣстахъ показывалось оно особенно рѣдко; такъ въ Полтавской губернской больницы было только 11 случаевъ его на 966 тифозныхъ, что составляетъ содержаніе 1:88; въ Рязанской оно равнялось 1:106 (2:212), въ другомъ мужскомъ Отдѣленіи С.-Петербургской больницы для чернорабочихъ 1:120 (11:1,315, при томъ по большей части на обѣихъ сторонахъ), въ Харь-

ковской губернской больницы 1:212; сверхъ того рѣдко въ уѣздныхъ больницахъ Венденской (Лифляндской губерніи), Гайсинской (Подольской), Миргородской (Полтавской), Елабужской (Вятской) и нѣкоторыхъ другихъ.

Воспаленіе предъушной железы являлось обыкновенно въ періодѣ выздоравливанія; притомъ иногда съ особенною быстротою наружные покровы лица и шеи покрывались рожистой краснотой и опухоль въ короткое время доходила до большой величины. При изслѣдованіи въ самомъ началѣ въ ней нѣрѣдко обнаруживалось кажущееся зыбленіе. Опухоль быстро распространялась на окололежащія части и, поражая поверхностную и глубокую клетчатку шеи, и железы подчелюстные, шейныя и подъязычныя, сдавливала сосуды, лежащія на шеѣ и производила иногда задушеніе. Въ Исковской губернской больницы было 3, въ Воронежской 5 случаевъ такого несчастнаго исхода. При благопріятномъ ходѣ воспаленіе предъушной железы переходило въ нагноеніе, обыкновенно отличавшееся медленнымъ ходомъ и замедлявшее въ свою очередь выздоравливаніе. Но иногда принимало оно дурныя свойства, первыя страданія притомъ не увеличивались, но силы больного быстро слабѣли и исходъ болѣзни дѣлался неблагопріятнымъ. Опухоль паротидъ на обѣихъ сторонахъ почти всегда оканчивалась смертію. Мѣстами и одностороннее появленіе ея имѣло неблагопріятное значеніе, какъ это особенно замѣчалось въ С.-Петербургской больницы для чернорабочихъ и въ уѣздныхъ больницахъ Лебединской и Ахтырской (Харьковской губерніи) и Александрійской (Херсонской). Въ Исковской и С.-Петербургской больницы паротиды нѣрѣдко усложнялись рожею.

И независимо отъ нихъ рожа встрѣчалась мѣстами въ числѣ болѣзненныхъ явленій, сопровождавшихъ тифъ въ пеходныхъ періодахъ его. Чаще всего такое усложненіе наблюдаемо было въ больницахъ Лубенской (въ 25 на



337 случаевъ тифа), Тамбовской (въ 16 на 421), Нижегородской (въ 7 на 211), Богородской (Московской губерніи, въ 6 на 186), Гадячской (Полтавской, въ 12 на 399) и губернской Орловской (въ 30 на 1,133); сверхъ того въ Псковской, Полтавской, Курской, Симбирской, Старооскольской (Курской губерніи), Ахтырской (Харьковской), въ больницахъ Рязанской губерніи и С.-Петербургской больницѣ для чернорабочихъ. Изъ нихъ въ Полтавской губерніи оно встрѣчалось лѣтомъ, въ Курской въ послѣдней половинѣ года, а въ С.-Петербургской съ Мая по Декабрь. Рожистый процессъ показывался въ неопредѣленные дни болѣзни, но большей части первоначально на лицѣ, и иногда исключительно на носѣ и вѣкахъ, переходилъ съ лица на уши, кожу черепа и затылка, затѣмъ распространялся на шею, спину, плечи, грудь и конечности. Иногда цѣлая половина тѣла была поражена имъ. Нерѣдко при болѣе сильномъ развитіи увеличивался, или вновь появлялся бредъ, силы больного ослабѣвали, лихорадочное состояніе усиливалось и принимало торпидный характеръ. Въ нѣсколькихъ отдѣльныхъ случаяхъ рожистое воспаление проходило и вновь возвращалось съ новою силою. Въ одномъ изъ наблюдений Гадячской уѣздной больницы (Полтавской губерніи) такое возвращеніе послѣдовало 3 раза сряду у одного и того же больного; тѣмъ не менѣе случай окончился выздоровленіемъ. Особенныхъ опредѣленныхъ отношеній въ появленіи рожистаго процесса при разныхъ формахъ тифа не было, но вообще замѣчалось, что этотъ видъ усложненія былъ одною изъ причинъ, увеличивавшихъ смертность отъ него.

Иногда въ періодѣ психодовъ встрѣчалась крапивная сыпь (urticaria), показывавшаяся преимущественно на животѣ и конечностяхъ. Такіе случаи были наблюдаемы въ числѣ 2 въ С.-Петербургской больницѣ для чернорабочихъ, оба въ соединеніи съ признаками скорбутнаго ху-

досочія; одинъ изъ нихъ кончился смертію; въ числѣ 3 на 102 въ Бахмутской больницѣ (Екатеринославской) и въ числѣ 13 на 115 тифозныхъ въ Слонимской (Гродненской губерніи).

Вереда, чирья и переносные нарывы въ истекшемъ году встрѣчались также, какъ виды неправильныхъ псходовъ тифа; притомъ мѣстами замѣчалась особенная склонность къ болѣе частому ихъ появленію. Такъ въ уѣздныхъ больницахъ Полтавской губерніи Зеньковской, Лубенской и Кременчугской чирья въ большомъ числѣ случаевъ обнаруживались въ періодѣ выздоравливанія отъ тифа и замедляя его дѣлали болѣе вѣрнымъ; въ больницахъ Рязанской, Старооскольской (Курской) и Островской (Псковской губерніи) также встрѣчались они, чаще чѣмъ въ другихъ мѣстностяхъ. Изъ случаевъ переносныхъ нарывовъ въ одномъ, пользованномъ въ Нижегородской губернской больницѣ и окончившемся смертію, въ существѣ покрововъ живота и руки найдено было множество отдѣльных нарывовъ различной величины, слѣда воспаленія венъ вовсе не было, а въ существѣ печени было разсѣяно множество мелкихъ геморрагическихъ пифорктовъ. Въ другомъ изъ наблюдений этой категоріи, принадлежащемъ Венденской больницѣ (Лифляндской губерніи) въ періодѣ псходовъ тифа въ концѣ 3-ей недѣли у больного обнаружился въ сторонѣ правой лопатки глуболежащій нарывъ, который, постепенно созрѣвая, наконецъ занялъ всю правую половину спины. Дыханіе больного начало дѣлаться затруднительнымъ, нагноеніе, проникая въ глубину, грозило проложить себѣ дорогу въ грудную полость. Съ тѣмъ вмѣстѣ силы больного быстро ослабѣвали отъ изнурительнаго нагноенія и случай окончился смертію. Два подобныя наблюденія переносныхъ нарывовъ на спинѣ около угла лопатки, съ псходомъ въ одномъ изъ нихъ въ помертвѣніе, были сдѣланы въ Лебе-



динской больницы Харьковской губернии. Въ Сумской больнице (той же губернии) на 164 случая тифа въ 27 послѣдовали карбункулезные нарывы на спинѣ и крестцѣ; исходъ во всѣхъ ихъ былъ благопріятный. Въ Симбирской губернской больнице въ одномъ случаѣ на 10-й день по выздоровленіи больной получилъ рецидивъ тифа съ глубокимъ и огромнымъ переноснымъ нарывомъ на внутренней сторонѣ праваго бедра; при вскрытіи его вышло огромное количество вонючаго гноя; больной умеръ отъ изнуренія на 51 день отъ начала болѣзни. Въ больницахъ Петрозаводской, С.-Петербургской для черноработныхъ, Старооскольской (Курской) и Лебединской (Харьковской губернии) было нѣсколько случаевъ переноснаго воспаления подкрыльцовыхъ желѣзъ съ исходомъ въ нагноеніе и нарывы. Переносное воспаленіе составовъ колѣна и локтя, съ отложеніемъ въ нихъ гноя, наблюдаемо было въ періодъ выздоравливанія отъ тифа въ одномъ случаѣ въ Гадячской уѣздной больницѣ Полтавской губернии и въ 3-хъ въ С.-Петербургской больницѣ для черноработныхъ; всѣ они окончились смертію. Наконецъ въ Вятской больницѣ изъ 190 случаевъ тифа въ 15 послѣдовали переносные нарывы большаго или меньшаго размѣра на различныхъ мѣстахъ наружной мякоти тѣла.

Къ этой же категоріи исходовъ тифа должны быть отнесены случаи переноснаго воспаления слуховаго прохода, встрѣчавшіеся особенно часто въ больницѣ Лубенской (Полтавской губернии, 15:337) и дважды въ Слонимской (Гродненской, 2:115), а также случаи воспаления вѣнъ въ періодъ выздоравливанія отъ тифа; послѣдніе въ числѣ 5 наблюдаемы были въ истекшемъ году въ Александрійской больницѣ Херсонской губернии.

При медленномъ теченіи, характеризовавшемъ почти повсюду тифъ въ истекшемъ году, пролежни были однимъ изъ самыхъ обыкновенныхъ усложненій, замедлявшимъ

выздоровливаніе и иногда содѣйствовавшимъ смертному исходу. Они обнаруживались не только въ первомъ періодѣ болѣзни, среди безсознательнаго состоянія больного, но и въ періодѣ выздоравливанія при длительномъ поносѣ и сильномъ изнуреніи. Тѣмъ замѣчательнѣе исключительно рѣдкое появленіе ихъ при тифѣ въ нѣкоторыхъ больничныхъ заведеніяхъ, къ числу каковыхъ принадлежатъ особенно губернскія больницы Полтавская и Тверская.

Наконецъ, какъ одно изъ самыхъ неблагопріятныхъ явленій, встрѣчались въ исходномъ періодѣ тифа отъ времени до времени мѣстныя помертвѣнія наружныхъ мякотныхъ частей тѣла. Въ числѣ таковыхъ случаевъ были:

Гангрена носа два раза въ Курской, одинъ разъ въ Павлоградской уѣздой (Екатеринославской губерніи) и одинъ разъ въ С.-Петербургской больницѣ чернорабочихъ; всѣ четыре случая окончились смертію.

Гангрена ушей по одному разу въ Павлоградской же и въ Валкской больницѣ (Лифляндской губерніи), съ благопріятнымъ исходомъ.

Гангрена мякоти затылка одинъ разъ въ Рязанской губернской больницѣ. У больной въ періодѣ выздоравливанія помертвѣніе показалось на поверхности искусственнаго раздраженія муникою; притомъ снова развилась бредъ и спячка, а чрезъ 36 часовъ отъ появленія перваго гангренознаго пятна послѣдовала смерть. Въ Воронежской больницѣ было два такихъ же случая, помертвѣніе проникло особенно глубоко и на заживленіе язвы отъ огромной потери существа потребовалось 8 недѣль, но оба случая окончились выздоровленіемъ.

Гангрена мошонки встрѣчалась два раза въ больницахъ Гадячской (Полтавской губерніи), по одному разу въ Сумской (Харьковской) и Орловской губернской и два раза въ Воронежской. Изъ послѣднихъ у одного больного



поражены были помертвѣніемъ оба яичка; въ общемъ числѣ 6 случаевъ 5 окончились выздоровленіемъ, одинъ въ Орловской больницѣ — смертельнымъ исходомъ.

Гангрена полового органа была наблюдаема одинъ разъ въ уѣздной Павлоградской больницѣ и два раза въ Александрійской (Херсонской губерніи); всѣ три случая окончились смертію.

Гангрена мякоти конечностей встрѣчалась чаще другихъ видовъ помертвѣнія. На значительномъ числѣ тифозныхъ она была наблюдаема въ Симферопольской больницѣ, гдѣ вообще исходъ въ помертвѣніе встрѣчался особенно часто; у больныхъ въ исходѣ тифа нерѣдко поражались гангреною пальцы одной или обѣихъ ногъ, или цѣлая стопа. Въ одномъ разительномъ примѣрѣ этого рода гангрена распространилась на цѣлую нижнюю конечность одной стороны и на половину конечности другой:

20 лѣтній погонщикъ поступилъ въ половинѣ Апрѣля прошлаго года въ Тарановскую больницу въ Симферополѣ въ пеходномъ періодѣ тифа. При самомъ вступленіи больного вся правая нижняя конечность вплоть до большого вертела бедражной кости (trochanter major), равно лѣвая стопа и колѣно до чашки, то есть болѣе  $\frac{1}{4}$  всей массы тѣла, были уже поражены антоновымъ огнемъ. Современнo съ обнаруженіемъ его, больной возвратился къ памяти, такъ, что въ больницѣ лекарства были оставлены и замѣнены укрѣпляющей діетой. Но чрезъ нѣсколько дней такого содержанія у него обнаружилия признаки совершеннаго ослабленія, быстро усилившіяся до смертельнаго исхода, послѣдовавшаго чрезъ нѣсколько часовъ отъ ихъ появленія.

Два подобныхъ наблюденія, въ которыхъ была поражена гангреною мякоть всего бедра, принадлежатъ Павлоградской больницѣ (Екатеринославской губерніи). Случаи помертвѣнія пальцевъ, исключительно на нижнихъ конечностяхъ, встрѣчались въ числѣ 4 въ Алексан-

дрійской больницы (Херсонской губерніи) 6 въ Гадячской (Полтавской), съ пораженіемъ стопы и смертельнымъ исходомъ въ одномъ изъ нихъ и 1 въ С.-Петербургской больницы для чернорабочихъ; случаевъ пораженія стопы антоновымъ огнемъ было 1 въ Павлоградской и 2 въ Орловской больницы, въ одномъ изъ послѣднихъ помертвѣли обѣ стопы; гангрена хронической язвы колѣна встрѣтилась однажды въ Кишеневской больницы (Бессарабской области). Помертвѣніе мякоти предплечья на значительномъ протяженіи выше и ниже локтя было два раза въ Воронежской больницы; одинъ изъ этихъ случаевъ окончился смертію. Гораздо рѣже показывалось помертвѣніе на слизистыхъ оболочкахъ, за исключеніемъ одной Воронежской больницы, гдѣ на 815 тифозныхъ у 13 замѣчалась гангрена слизистой оболочки рта, ограничивавшаяся небольшими отдѣльными частями десенъ, щекъ, губъ и нѣба, у 2 изъ нихъ она распространилась на всю поверхность рта и зѣва; эти оба случая окончились смертію, равно какъ и 3 изъ остальныхъ (5:13). Одинъ случай помертвѣнія слизистой оболочки рта и зѣва, также съ смертельнымъ исходомъ, былъ наблюдаемъ въ С.-Петербургской больницы для чернорабочихъ.

Въ исходныхъ періодахъ и при выздоравливаніи отъ тифа иногда замѣчалось у больныхъ обнаруженіе перемежающейся лихорадки ежедневнаго или двухдневнаго типа. Случаи этого рода встрѣчались болѣе часто въ больницахъ губернскихъ Воронежской, Полтавской и Симбирской и уѣздныхъ: Старооскольской (Курской), Сумской (Харьковской), Александрійской (Херсонской, въ 35 случаяхъ на 533 тифозныхъ), Богородской (Московской), Поворжевской (Исковской), Бѣльской и Пружанской (Гродненской губерніи); почти исключительно бы они весною и осенью. При неотложномъ употребленіи соответственныхъ врачебныхъ пособій такой исходъ



тифа не сопровождался неблагоприятными послѣдствіями, но при медленномъ и не рѣшительномъ пользованіи велъ за собою признаки анэміи и водянки.

Исходъ въ холеру замѣчался въ С.-Петербургской больницѣ для чернорабочихъ изъ числа 2,921 тифозныхъ, пользовавшихся въ обоихъ мужскихъ отдѣленіяхъ ея въ теченіи года, въ 45 случаяхъ; всѣ они окончились смертію; кромѣ того однажды въ Венденской больницѣ Лифляндской губерніи, съ исходомъ въ медленное выздоровленіе.

Мѣстами, какъ и въ 1855 году, въ періодъ выздоровленія отъ тифа замѣчалась склонность къ рецидивамъ, отъ неправильностей діеты и вліянія сырости и холода. Случаи этого рода встрѣчались болѣе часто въ больницахъ губерній Псковской, Тверской, Минской, Рязанской, Тамбовской, Курской, Полтавской и Екатеринославской; въ остальныхъ же были рѣдки.

Въ общемъ числѣ пользовавшихся отъ тифа въ гражданскихъ больницахъ исходъ въ смерть послѣдовалъ въ 9,450 случаяхъ, что составляетъ общее содержаніе смертности 1 : 4,7 (9,450 : 44,960). Въ отдѣльныхъ губерніяхъ оно было неодинаково, и равнялось:

1 : 3	въ больницахъ губерній Саратовской и Курляндской,
1 : 3,1	» » » Таврической,
1 : 3,2	» » » Смоленской,
1 : 3,3	» » » Могилевской,
1 : 3,4	» » » Витебской, Волынской и Кіевской,
1 : 3,6	» » » Тверской и Минской,
1 : 3,7	» » » Лифляндской и Подольской,
1 : 3,8	» » » Херсонской,
1 : 4	» » » Владимірской, Гроднен-

			ской, Казанской и С.-Петербургской,
1:4,2	въ	больницахъ губерній:	Новгородской,
1:4,3	»	»	Костромской и Пермской,
1:4,4	»	»	Олонецкой,
1:4,5	»	»	Виленской,
1:4,6	»	»	Псковской и Рязанской,
1:4,7	»	»	Екатеринославской, Харьковской, Черниговской и Нижегородской,
1:4,9	»	»	Ярославской,
1: 5	»	»	Симбирской, Пензенской, Оренбургской и Курской,
1:5,2	»	»	Полтавской,
1: 6	»	»	Вятской, Самарской и Вологодской,
1:6,1	»	»	Тамбовской,
1:6,4	»	»	Воронежской,
1:6,7	»	»	Калужской,
1:7,2	»	»	Тульской,
1:7,3	»	»	Орловской,
1:7,7	»	»	Московской и
1: 8	»	»	Ковенской.

Лечение тифа, основываясь на законахъ рациональной терапіи, сообразовалось съ характеромъ, видомъ и степенью болѣзненнаго процесса. Свѣжіе случаи вездѣ излечивались одинаково легко и скоро; — запущенные же при недостаткѣ пособій и неправильномъ содержаніи больныхъ и доведенные до истощенія ихъ силъ, ослабленія питанія и порчи соковъ, требовали всѣхъ усилій врачебной науки, перѣдко притомъ остававшихся безплодными.

Изъ общепринятыхъ методовъ леченія *противувоспалительный способъ* оказывался полезнымъ тогда только, когда характеръ тифа имѣлъ болѣе наклонности къ



синохальному. При пораженіяхъ легкихъ и мозга, въ степени болѣе сильной, мѣстами иногда употреблялись съ пользою и кровопусканія; но назначеніе ихъ, за исключеніемъ случаевъ чистовоспалительныхъ усложненій, требовало особенной осторожности. Внутреннее употребленіе *кислотъ и хлоровой воды*, оказывавшееся особенно полезнымъ при чистой пятнистой формѣ тифа, съ наклонностію къ динамическому характеру и разложенію соковъ, было бесполезно и мѣстами вредно при желчномъ характерѣ тифа и усложненіяхъ его сильнымъ катаральнымъ состояніемъ желудка и кишекъ и атоническимъ поносомъ отъ фолликулярныхъ язвѣзвленій. — *Сладкая ртуть* въ малыхъ учащенныхъ приѣмахъ съ опіемъ, или безъ него, оказывалась однимъ изъ надежнѣйшихъ средствъ при брюшномъ тифѣ. Съ особеннымъ успѣхомъ она была испытана въ числѣ многихъ въ больницахъ Харьковской и Тамбовской. Въ послѣдней ея было пользовано 320 тифозныхъ, изъ нихъ умерло 45 (1:7,1), но въ концѣ года, когда мѣстный тифъ сталъ чаще показываться подъ формою пятнистаго, дѣйствіе сладкой ртути сдѣлалось менѣе цѣлительнымъ. Мѣстами при употребленіи ея замѣчали благоприятное вліяніе на уменьшеніе и прекращеніе тифознаго поноса.

Внутреннее употребленіе *укусо-кислаго цинка* было испытано въ Нижегородской губернской больницѣ въ 105 трудныхъ случаяхъ пятнистаго тифа, по большей части усложненнаго упорнымъ атоническимъ поносомъ. Изъ нихъ умерло 27 и выздоровѣло 78; изъ числа послѣднихъ въ 17 было очевидно быстрое улучшеніе признаковъ бо-  
 лѣзни отъ употребленія цинка, въ 60 выздоровленіе послѣдовало постепенно, безъ рѣзкихъ явленій очевиднаго его дѣйствія. Всѣ 27 случаевъ, окончившіеся смертію при леченіи цинкомъ, принадлежали къ числу самыхъ трудныхъ и запущенныхъ; изъ нихъ въ 16 тифъ былъ

усложненъ воспалительнымъ состояніемъ различныхъ органовъ, какъ-то легкихъ, печени, около-сердечной сумки, гортани и дыхательнаго горла, а въ нѣкоторыхъ водянкою. Сверхъ того внутреннее употребленіе уксусокислаго цинка оказывалось весьма полезнымъ противъ болѣзненнаго пораженія нервныхъ центровъ, послѣ перелома тифа.

*Селитрокислое серебро* было испытано противъ тифа въ Нижегородской же больницѣ въ 45 трудныхъ случаяхъ: явное дѣйствіе его обнаружилось только въ 6 изъ нихъ; выздоровѣли 34, окончились смертію 11 (1:4).

Исключительно *идропатическое* леченіе тифа было употребляемо съ успѣхомъ на больныхъ хорошаго тѣлосложенія и въ случаяхъ незапущенныхъ, въ больницахъ С.-Петербургской для чернорабочихъ, Гродненской и уѣздныхъ Сокольской (Гродненской), Владимірской (Вольнской), Лебединской и Курянской (Харьковской губерніи).

Въ Валкинской больницѣ (той же губерніи) въ двухъ случаяхъ тифа сдѣлано было *прививаніе оспы* въ правой подвздошной сторонѣ, но оспа не принялась; одинъ изъ больныхъ выздоровѣлъ, другой умеръ.

Изъ усложненій тифа поносъ требовалъ особеннаго вниманія во все время пользованія болѣзни; отъ силы и степени его зависѣли въ большей части случаевъ дальнѣйшее теченіе болѣзни и успѣхъ леченія. Изъ врачебныхъ пособій употреблялись противъ поноса *селитрокислое серебро*, *уксусокислый свинецъ*, препараты *опія* и *железа*, *сѣрниокислая мѣдь* и *квасцы*, въ соединеніи съ наркотическими, *квасія*, отваръ *сумбула* и другія средства; какъ внутрь, такъ и въ промывательныхъ, но нерѣдко ни одно изъ нихъ не обнаруживало на тифозный поносъ рѣшительнаго вліянія. Въ Гжатской больницѣ (Смоленской губерніи) въ нѣкоторыхъ случаяхъ давали



противъ него съ пользою внутрь свѣжій *березовый уголь* въ порошокъ, или настоѣ, въ большихъ приемахъ, доходившихъ до двухъ драхмъ порошка, или 6 унцовъ настоя изъ  $\frac{1}{2}$  унца угля. — Въ Житомирской больницѣ въ 13 случаяхъ пятнистаго тифа съ гнилостнымъ поносомъ была употреблена съ успѣхомъ *дегтярная вода* (aq. rosea) въ учащенныхъ приемахъ, попеременно съ настоемъ вале-  
рианы. Въ Симбирской больницѣ въ одномъ случаѣ у больного 25 лѣтъ изнурительный поносъ въ исходномъ періодѣ сильнаго тифа былъ остановленъ 15 дневнымъ употребленіемъ промывательныхъ изъ  $\frac{1}{2}$  унца чистаго *березоваго дегтя* съ однимъ яичнымъ желткомъ и 6 унцами ячневаго отвару.

Съ перемежающимися лихорадками въ теченіи года поступило въ больницы губернскихъ и уѣздныхъ городовъ 37,626 больныхъ, что составляетъ  $\frac{1}{8}$  общаго числа пользовавшихся въ нихъ (37626 : 302702). Въ общей годовой цифрѣ больныхъ по больницамъ отдѣльныхъ губерній это содержаніе было неодинаково; оно доходило до  $\frac{1}{5}$  въ больницахъ губерній Астраханской и Курской;

» $\frac{1}{6}$	»	»	»	»	Витебской, Вольнской, Кіевской, Симбирской, Полтавской, Черниговской, Тульской, Мѣнской, Могилевской и Курляндской,
» $\frac{1}{7}$	»			»	Воронежской, Екатеринославской, Лифляндской, Тамбовской, Московской, и Самарской;
» $\frac{1}{8}$	»	»	»	»	Казанской, Ковенской, Та-

				вической, Харьковской, Рязанской и Саратовской;
»	$\frac{1}{9}$	въ большихъ губерніяхъ		Гродненской, Калужской, Подольской и Псковской;
»	$\frac{1}{10}$	»	»	Олонецкой, Владимірской, Смоленской, Новгород- ской, Пензенской, Орен- бургской и области За- байкальской;
»	$\frac{1}{13}$	»	»	Ставропольской, Херсон- ской, Тифлиской и Твер- ской;
»	$\frac{1}{14}$	»	»	Вятской;
»	$\frac{1}{15}$	»	»	Віленской;
»	$\frac{1}{16}$	»	»	Нижегородской и Орлов- ской;
»	$\frac{1}{17}$	»	»	области Бессарабской;
»	$\frac{1}{18}$	»	»	губерніяхъ Костромской;
»	$\frac{1}{23}$	»	»	Томской;
»	$\frac{1}{24}$	»	»	Ярославской;
»	$\frac{1}{26}$	»	»	Вологодской;
»	$\frac{1}{29}$	»	»	С.-Петербургской;
»	$\frac{1}{30}$	»	»	Тобольской;
»	$\frac{1}{32}$	»	»	Эстляндской;
»	$\frac{1}{54}$	»	»	Архангельской;
»	$\frac{1}{64}$	»	»	Пермской и только
»	$\frac{1}{100}$	»	»	Иркутской.

При значительномъ экстенсивномъ распространеніи перемежающіяся лихорадки въ истекшемъ году имѣли нерѣдко злокачественный характеръ, были длительны и упорны, отличались разнообразіемъ типа и формъ, наклонностію къ рецидивамъ, исходнымъ органическимъ пораженіемъ внутреннихъ органовъ тѣла и быстрымъ развитіемъ худосочія и водянокъ. Такія свойства обна-




руживали лихорадки преимущественно въ губерніяхъ Лифляндской, Курляндской, Минской, Могилевской, Витебской, Ковенской, Гродненской, Псковской, Тверской, Смоленской, Московской, Калужской, Тульской, Полтавской, Волынской, Подольской, Киевской, Екатеринославской, Астраханской и Таврической; слабѣе и съ менѣе злокачественнымъ характеромъ, чѣмъ въ предшествовавшіе годы, были онѣ въ губерніяхъ Херсонской, Воронежской, Черниговской, Эстляндской, Олонецкой, Пермской, Владимірской, Рязанской, Самарской, Казанской, Пензенской, Оренбургской, Нижегородской и Саратовской. Въ этихъ послѣднихъ мѣстныхъ перемежающихся лихорадки были менѣе упорны, легче уступали врачебнымъ пособіямъ, часто проходили сами собою и рѣже сопровождались неблагоприятными исходами, за исключеніемъ однихъ заносныхъ случаевъ, представлявшихъ всѣ виды и степени болѣзни.

Изъ видовъ злокачественной перемежающейся лихорадки попадались мѣстами случаи апоплектической или коматозной формы ея. Они сопровождались признаками пораженія общаго чувствительна, развивавшимися особенно въ продолженіе пристуновъ и при томъ сильнымъ страданіемъ селезенки. Эта форма съ различными оттѣнками вообще чаще встрѣчалась въ истекшемъ году, особенно въ южныхъ губерніяхъ, между прибывавшими по окончаніи военныхъ дѣйствій изъ Крыма больными. Въ Одесскихъ больницахъ въ теченіи года было сряду нѣсколько случаевъ коматозной лихорадки; въ приступахъ ея, среди обыкновенныхъ симптомовъ, обнаруживались дрожаніе цѣлаго тѣла, судороги конечностей, потеря сознанія и чувствительности; бредъ и затѣмъ непробудная спячка съ нерѣдкимъ исходомъ въ смерть. Сверхъ того случаевъ лихорадки этого рода было наблюдаемо 6 въ больницѣ Владимірской (Волынской), 3 въ Калужской, 2 въ Пере-

мышинской (Калужской губернии), 1 въ Харьковской, 1 въ Проскуровской (Подольской губернии), 1 въ Новоржевской (Исковской), 1 въ Ростовской (Екатеринославской) и 1 въ Фридрихштатской (Курляндской).

Въ числѣ ихъ больной Харьковской губернской больницы, 18 лѣтъ отъ роду, тѣлосложенія крѣпкаго, нѣсколько разъ уже страдалъ трехдневной перемежающейся лихорадкой, трудно уступавшей дѣйствию хинина. Въ Маѣ 1856 года онъ простудился и вновь занемогъ. Сначала онъ жаловался только на общее недомоганіе, но никакихъ мѣстныхъ болѣзненныхъ явленій небыло замѣтно; потомъ у него ясно обнаружился пароксизмъ лихорадки, причемъ ознобъ былъ необыкновенно продолжителенъ и силенъ съ приливомъ крови къ мозгу; его смѣнилъ кратковременный жаръ и потъ, чѣмъ и кончился пароксизмъ; въ продолженіи его, больному поставили 6 кровавыхъ банокъ на спину, а по окончаніи дали 10 гранъ хинина внутрь. На другой день онъ чувствовалъ себя хорошо. На третій день въ тоже самое время начался ознобъ гораздо сильнѣе перваго, въ сопровожденіи явленій прилива крови къ мозгу, быстро усиливавшихся до того, что наконецъ они сдѣлались совершенно сходными съ апоплектическими. Въ самомъ началѣ этого пароксизма больному были даны двадцать гранъ хинина и поставлены сухія банки на спину, потомъ сдѣлано промывательное съ двадцатью же гранами хининой соли, но не смотря на все эти пособія лихорадочный ознобъ еще усиливался и наконецъ перешелъ въ совершенный апоплектический ударъ, окончившійся смертію. При вскрытіи найдены признаки сильной гипереміи мозга и оболочекъ его съ разрывомъ мозгового вещества и апоплектическимъ кровоизліяніемъ въ вещество праваго большого полушарія.

Въ Исковской и Полтавской больницахъ также встрѣчались случаи перемежающейся лихорадки съ пораженіемъ мозга, но они не возвышались до коматозной формы; во время жара у больныхъ обнаруживались правда признаки сильного напора крови на мозгъ, были судороги и боли въ рукахъ и ногахъ, иногда даже бредъ.





ство и часто рвота, но все эти явления быстро исчезали при наступлении критического пота. Въ Бронницкой больницѣ (Московской губерніи) на 140 случаевъ лихорадки бредъ во время пароксизмовъ замѣчался въ 25. Въ уѣздной Веррской больницѣ (Лифляндской губерніи) изъ 140 лихорадочныхъ больныхъ, почти исключительно принадлежавшихъ къ проходившимъ воинскимъ командамъ, лихорадка 3-хъ-дневнаго типа у 2 сопровождалась признаками воспаления мозгового существа и у 3 обнаруживалась подъ видомъ періодической маіи: въ продолженіе пароксизмовъ развивались явленія бѣшенства, такъ что съ большимъ трудомъ удавалось смирять больныхъ; въ такомъ состояніи находились они около 24 часовъ сряду, вплоть до совершеннаго истощенія и впаденія въ сонъ; свободное же отъ пароксизмовъ время больные по цѣлымъ днямъ и ночамъ проводили въ молитвѣ, обнаруживая притомъ все признаки односторонняго религіознаго помѣшательства. Двое изъ нихъ совершенно выздоровѣли при употребленіи большихъ примовъ хинина съ малыми дозами опія; одинъ умеръ, но результатовъ вскрытія тѣла его къ сожалѣнію не сообщено. Въ Старооскольской больницѣ (Курской губерніи) два случая перемежающейся лихорадки сопровождались явленіями помѣшательства во время приступовъ; оба они имѣли благополучный исходъ.

Мѣстами, особенно весною и лѣтомъ, перемежающіяся лихорадки отличались желчнымъ характеромъ, выражавшимся признаками сильной гипереміи печени, усиленнаго отдѣленія желчи и иногда дѣйствительнаго раздраженія серознаго покрова этого органа. Такая форма почти исключительно замѣчалась при ежедневномъ типѣ. Въ Апрѣлѣ встрѣчалась она въ степени довольно сильной въ С.-Петербургской и сопредѣльныхъ съ нею губерніяхъ: лихорадочный пароксизмъ начинался обыкновенно

короткимъ, иногда незамѣтнымъ ознобомъ, за нимъ слѣдовали жаръ и постепенно усиливавшаяся головная боль, съ признаками прилива крови къ головѣ, изъ которыхъ всѣхъ постояннѣе были инъекція соединительной оболочки глазъ и легкій бредъ, исчезающій при возбужденіи вниманія больного. Съ тѣмъ вмѣстѣ во время приступовъ являлись у больныхъ тоска и мучительныя тошноты, переходившія въ сильную рвоту тягучею слюзою, окрашенною желчью; печень при изслѣдованіи обнаруживала возбужденную чувствительность и представлялась увеличенною въ объемъ. Пароксизмы оканчивались легкимъ потомъ на всемъ тѣлѣ; свободный промежутокъ наступалъ обыкновенно въ утренніе часы. У всѣхъ больныхъ послѣ 2—3 пароксизмовъ обнаруживались признаки желтизны. Въ С.-Петербургской больницѣ для чернорабочихъ было 3 случая перемежающейся лихорадки съ желчнымъ поносомъ: послѣ едва замѣтнаго озноба въ нихъ слѣдовалъ сильный и продолжительный жаръ; кожа притомъ была особенно горяча, языкъ сухъ и красенъ; вмѣстѣ съ тѣмъ являлись быстро слѣдовавшія одно за другимъ жидкія желчныя испражненія изомъ, а за ними общій потъ всего тѣла, при которомъ совершенно исчезали болѣзненные явленія: пульсъ дѣлался мягкимъ и спокойнымъ, языкъ влажнымъ и прекращались испражненія изомъ. Признаки сильной гипереміи печени и раздраженія желчныхъ путей при перемежающихся лихорадкахъ замѣчались также лѣтомъ въ больницахъ Таврической, Полтавской и Витебской губерній; иногда они возвышались до явленій активнаго воспаленія и органическихъ измѣненій въ существѣ печени и постоянно вели за собою болѣе быстрое развитіе лихорадочнаго худосочія.

Въ Іюнѣ и Іюлѣ въ огромномъ числѣ случаевъ перемежающейся лихорадки встрѣчались и такіе, въ которыхъ во время приступовъ обнаруживались явленія холериче-



скаго свойства въ болѣе или менѣе сильной степени. Въ Минской уѣздной больницѣ (Минской губерніи), гдѣ 4 общаго числа пользовавшихся больныхъ страдала лихорадкою, у 2 во время пароксизма трехдневной лихорадки вмѣсто озноба являлись дрожаніе и оледенѣніе всего тѣла, синева ручныхъ пальцевъ, судороги конечностей, рвоты, поносъ и чрезмѣрная слабость во всемъ тѣлѣ; признаки эти исчезали при появленіи лихорадочнаго пота. Въ то же время въ больницахъ губернской Черниговской и Старооскольской (Курской губерніи) было нѣсколько случаевъ перемежающейся лихорадки съ поносомъ, рвотою и судорогами, но всѣ они имѣли благоприятный исходъ.

Мѣстами встрѣчались случаи неправильной и неполной перемежающейся лихорадки, съ особенно сильнымъ развитіемъ отдѣльныхъ частей пароксизма и слабымъ обнаруженіемъ или совершеннымъ отсутствіемъ другихъ. Иногда не было вовсе озноба и пота, и пароксизмъ лихорадки, обыкновенно трехдневной, состоялъ изъ одного жара, а критическія явленія ограничивались осадкомъ въ мочѣ. Такое отсутствіе озноба сопровождалось обыкновенно быстрымъ и особенно сильнымъ развитіемъ жара, доходившаго иногда притомъ до опасныхъ размѣровъ. Въ одномъ изъ случаевъ этого рода въ Тамбовской больницѣ усиленіе жара возвысилось до тетаническихъ признаковъ. Случаи отсутствія пота въ лихорадочномъ пароксизмѣ сопровождались по большей части быстрымъ появленіемъ водяночныхъ накопленій подъ кожей и въ серозныхъ полостяхъ. Или же пароксизмъ ограничивался однимъ потомъ; 5 наблюдений этого рода принадлежатъ Орловской губернской больницѣ. Въ Исковской больницѣ въ числѣ случаевъ ежедневной перемежающейся лихорадки было нѣсколько, въ которыхъ жару и поту вовсе не было и пароксизмы ограничивались однимъ продолжительнымъ

сильнымъ ознобомъ съ головою болью и чувствомъ большой слабости.

Случаи мѣстной или маскированной лихорадки были перѣдки. Чаще всего они представлялись подѣ видомъ нервныхъ болей, или простиравшихся на цѣлый органъ, или ограничивавшихся какою нибудь небольшою нервною вѣтвію. Довольно часто встрѣчались они въ больницахъ въ Одессѣ и въ губерніяхъ Астраханской, Таврической, Черниговской, Гродненской, Минской и Витебской. Въ Слонимской больницѣ (Гродненской губерніи) было около 50 случаевъ маскированной лихорадки на 139.

Подѣ формою мучительныхъ и сильныхъ ломотныхъ болей конечностей и спины случаи перемежающейся лихорадки были наблюдаемы въ Бѣльской уѣздной больницѣ Гродненской губерніи и Новгородъ-Сѣверской Черниговской. Въ Симферопольской больницѣ лихорадочный пароксизмъ иногда ограничивался сильною рѣзью въ тонкихъ кишкахъ, приходившею въ видѣ приступовъ и исчезающею при появленіи пота. Подобные случаи встрѣчались въ Бѣльской больницѣ Гродненской губерніи, съ тѣмъ только различіемъ, что здѣсь эти боли, являвшіяся какъ лихорадочный приступъ, сопровождалась тошнотами и рвотами. Въ С.-Петербургской больницѣ для черноработныхъ было наблюдаемо 2 случая маскированной лихорадки, въ которыхъ въ видѣ перемежающихся пароксизмовъ являлся сухой и удлинивый кашель, исчезающій совершенно въ свободномъ промежуткѣ. Въ Полтавской губернской больницѣ было нѣсколько случаевъ перемежающейся лихорадки, въ которыхъ пароксизмы также ограничивались періодическимъ появленіемъ сухаго кашля и рвоты, безъ озноба и пота.

Два случая маскированной перемежающейся лихорадки были наблюдаемы въ Новгородской губернской больницѣ: одинъ изъ нихъ выражался періодическимъ страданіемъ легочнаго сплетенія



сочувственного нерва. причемъ больной съ 4 часовъ послѣ полудня до полуночи имѣлъ непрерывный сухой кашель, доводившій его до страшнаго изнеможенія. Пароксизмъ этотъ оканчивался переломнымъ обильнымъ потомъ, за которымъ слѣдовала по утрамъ свѣтлая перемежка, почти не обнаруживавшая слѣдовъ не давняго страданія; но съ 4 часовъ по полудни опять наступалъ пароксизмъ и продолжался до полуночи. Больному назначенъ былъ хининъ по 4 грана съ опіемъ и двусѣрнистою сурьмою по 1/4 грана каждого; такихъ четыре пороника даны были въ теченіи свободнаго промежутка и лихорадка не возвращалась болѣе.

Второй случай былъ замѣчателенъ по рефлективному отраженію страданія сочувственного нерва на почки. Больной послѣ 2 или 3-хъ полныхъ пароксизмовъ перемежающейся лихорадки началъ чувствовать тупую давящую боль въ сторонѣ почекъ, причемъ появилось у него сперва затрудненіе въ мочеиспусканіи, а потомъ и совершенное прекращеніе отдѣленія мочи, грозившее развитіемъ параличнаго пораженія мочеотдѣлительныхъ органовъ. Черезъ вставленный катетеръ почти вовсе не выходило мочи. Хотя больной обратился къ врачебной помощи, тогда какъ уже не было лихорадочныхъ пароксизмовъ, но тѣмъ не менѣе, сообразно ходу болѣзни, она была признана за перемежающуюся лихорадку съ рефлективнымъ страданіемъ сочувственного нерва, въ его сплетеніяхъ — почечномъ и подчревномъ. Больному было назначено внутреннее употребленіе лимонно-кислаго хинина по 2 грана съ 1/4 грана опія, а съ наружи къ поясницѣ и сторонѣ мочевого пузыря были приложены припарки Труссо изъ мякоти ржаного хлѣба, размоченной въ камфорномъ спиртѣ съ примѣсью настойки опія и вытяжки страммонія; при такомъ пользованіи всѣ мучительные припадки труднаго мочеиспусканія исчезли, моча начала отдѣляться свободно и больной перешелъ къ употребленію горькихъ и желѣзныхъ средствъ, доведшихъ его до совершеннаго выздоровленія.

Въ Рязанской губернской больницѣ былъ наблюдаемъ случай перемежающейся лихорадки подѣ формою судорогъ въ верхнихъ и нижнихъ конечностяхъ:

Молодой человекъ, 19 лѣтъ, нѣжнаго лимфатическаго сложенія, за два дня до поступленія въ больницу вечеромъ почувствовалъ незначительный ознобъ и вскорѣ потомъ обнаружился у него судорожныя движенія въ конечностяхъ и еще болѣе сильно въ брюшныхъ мускулахъ, которые безпрерывно сокращались, какъ бы находясь подъ вліяніемъ электричества; мускулы лица были притомъ въ нормальномъ состояніи; за исключеніемъ этихъ признаковъ и безпокойнаго сна, во время котораго судорожныя сокращенія брюшныхъ мышцъ слабѣли, но не прекращались совершенно, больной ни на что не жаловался. Имѣя въ виду, что болѣзнь началась ознобомъ, хотя и незначительнымъ, ее приняли за неправильную перемежающуюся лихорадку, въ которой сонъ составлялъ перемежку, и назначали больному внутрь хинина по  $\frac{1}{2}$  долѣ грана на приемъ въ порошокъ съ сахаромъ, чрезъ  $1\frac{1}{2}$  часа по порошокъ, а снаружи поставили по обѣимъ сторонамъ позвоночнаго столба, попарно сверху внизъ, 10 сухихъ банокъ какъ утромъ такъ и вечеромъ. Больной спалъ покойно и по утру на другой день судороги въ нижнихъ конечностяхъ прекратились, но въ верхнихъ еще продолжались, хотя слабѣе; брюшные мускулы сокращались тоже съ меньшею силою; при продолженіи внутренняго употребленія хинина сухія банки были поставлены, вмѣсто 2-хъ, 3 раза въ день, и на 3-и сутки у больного остались только весьма незначительныя судорожныя сокращенія въ брюшныхъ мускулахъ, особенно въ прямомъ мускулѣ; но и эти припадки при томъ же леченіи мало по малу совершенно прекратились на 4 день. Въ отвращеніе возврата лихорадки средства эти были употребляемы до 6-го дня и больной только на 10-й день выпущенъ изъ больницы. Съ тѣхъ поръ не возвращался къ нему судорожныя явленія вовсе. Измѣненія селезенки въ этомъ случаѣ не было.

Остальные случаи мѣстной лихорадки принадлежали къ обыкновеннымъ формамъ ея, выражающимся первыми болями отдѣльныхъ частей головы и лица, особенно надбровной стороны, глазнаго яблока, висковъ и



зубовъ. Въ числѣ ихъ замѣчательнъ случай лихорадки подѣ формою височной невралгій съ воспаленіемъ глазъ.

Больная, лѣтъ 40 отъ роду, тѣлосложенія довольно крѣпкаго, 2 Октября 1856 года поступила въ Минскую больницу Приказа съ воспаленіемъ соединительной и роговой оболочки глазъ, продолжавшимся уже болѣе недѣли и неуступавшимъ домашнему лечению. Кромѣ значительной красноты воспаленныхъ оболочекъ, при постоянной боли и свѣтобоязни, больная жаловалась на совершенную слабость зрѣнія, едва позволявшую ей различать болшіе предметы. Сверхъ того она страдала сильною болью головы, особенно въ височныхъ костяхъ, съ судорожнымъ подергиваніемъ, усиливавшимся по ночамъ. Противувоспалительное лечение значительно уменьшило красноту соединительной и роговой оболочекъ, но не содѣйствовало улучшенію зрѣнія; притомъ безсонница отъ сильной боли изнуряла больную. Втираніе вератрина съ морфіемъ въ височную сторону также не имѣло никакого успѣха, равно какъ внутреннее употребленіе аконита и безвременника. 8 Октября красноты глазныхъ оболочекъ почти вовсе не было, — но зрѣніе оставалось на той же степени и страданія больной не уменьшались. 9 Октября послѣ сильной ночной боли, почти постоянно ожесточавшейся въ полночь, вновь показалась краснота соединительной и роговой оболочекъ; больной назначено внутреннее употребленіе сѣрниокислаго хинина (по два грана на пріемъ) съ разрѣшающими эстрактами и порошкомъ ревеня. Послѣ первыхъ же четырехъ пріемовъ больная лучше спала и краснота глазъ ея не только не увеличилась, но даже уменьшилась и зрѣніе начало улучшаться. 10 Октября пріемъ лекарства повторить. Ночью боли уже не было и сонъ былъ хорошъ. 11-го больная видитъ хорошо, краснота глазъ совершенно исчезла; пріемъ хинина уменьшенъ до 6 гранъ въ сутки. 12 Октября всѣ признаки болѣзни прекратились, больная приняла еще въ этотъ день четыре грана, на слѣдующій три, 14-го два грана и 15-го одинъ гранъ хинина. 20 Октября она выпущена изъ больницы совершенно здоровою.

Мѣстами замѣчалось, что и маскированныя лихорадки

при долговременномъ и упорномъ продолженіи ихъ сопровождались развитіемъ типознаго худосочія и водянки.

Преобладаніе того или другаго изъ типовъ лихорадки въ больницахъ гражданскаго вѣдомства перѣдко зависѣло отъ случайныхъ условій приѣма болѣе или менѣе значительнаго числа больныхъ съ формами болѣзни запущенными, усложненными и измѣнившимися отъ рецидивовъ, послѣдовавшихъ иногда по нѣскольку разъ сряду. Въ теченіе года чаще прочихъ встрѣчался ежедневный типъ въ больницахъ губерній С.-Петербургской, Олонекской, Ярославской, Смоленской, Воронежской и Курской (кроме самаго Курска, Щигровъ и Суджи), также въ больницахъ губернской Тамбовской, гдѣ около  $\frac{1}{2}$  общаго числа лихорадочныхъ случаевъ имѣли ежедневные приступы, и уѣздныхъ Пирятинской (Полтавской), Новгородъ-Сѣверской (Черниговской) и Славяносербской (Екатеринославской губерній). Наравнѣ съ 3-хъ дневнымъ встрѣчался ежедневный типъ между больными въ больницахъ губерній Пензенской, Херсонской, Казанской, Харьковской (кроме больницы Сумской) и Тамбовской (кроме губернской больницы), а также въ больницахъ Нижегородской губернской и уѣздной Гольдингенской (Курляндской губерній). Трехдневный типъ оставался преобладающимъ въ больницахъ губерній Пермской, Новгородской, Тверской, Псковской, Лифляндской, Ковенской, Виленской, Витебской, Гродненской, Владимірской, Рязанской, Калужской, Московской, Орловской, Тульской, Минской, Могилевской, Черниговской (кроме Новгородъ-Сѣверска), Полтавской (кроме Полтавы, Роменъ и Пирятина), Волынской, Кіевской (кроме Сквиры), Подольской, Таврической, Екатеринославской (кроме Славяносербска), Симбирской, Оренбургской, Саратовской, Астраханской, а также въ больницахъ губернской Курской и уѣздныхъ Сумской (Харьковской), Щигровской и Суджанской (Кур-



ской губернии). — Четырехдневный типъ вообще встрѣчался рѣже ежедневнаго и трехдневнаго и то по большей части осенью, а мѣстами, какъ напримѣръ въ губерніяхъ Лифляндской и Могилевской его вовсе не было; — напротивъ того довольно часты были случаи его въ больницахъ Астраханской губернии, въ которой онъ составляетъ мѣстный типъ лихорадокъ, также въ больницахъ губернскихъ Минской и Курской и уѣздныхъ Сумской (Харьковской), Суджанской и Путивльской (Курской) и Бауской (Курляндской губернии). Число случаевъ его въ Симбирской губернской больницѣ составляло  $\frac{1}{4}$  общаго числа пользовавшихся отъ лихорадки въ теченіи года, и почти  $\frac{1}{2}$  въ больницахъ Полтавской губернской (319 : 762) и уѣздной Роменской (66 : 123). Сверхъ того оно было довольно значительно въ Сквирской больницѣ Кіевской губернии, гдѣ въ предшествовавшіе годы этотъ типъ былъ наблюдается очень рѣдко.

Усложненные типы лихорадокъ встрѣчались подъ видомъ *удвоеннаго ежедневнаго* (*quotidiana duplicata*)

въ 1 случаѣ изъ 62 въ Порховской больницѣ (Псковской губернии).

» 1	»	»	44	» Богородской больницѣ (Московской губернии),
» 2	»	»	28	» Сокольской больницѣ (Гродненской губернии),
» 2	»	»	241	» Калужской больницѣ,
» 3	»	»	99	» Владимірской больницѣ (Волынской губернии),
» 5	»	»	126	» Старооскольской больницѣ (Курской губернии) и
» 6	»	»	156	» Островской больницѣ (Псковской губернии).

Пароксизмы въ нихъ оказывались по утрамъ и вечерамъ, раздѣляясь одинъ отъ другаго промежутками весь-

ма короткими, но тѣмъ не менѣе совершенно свободными.

Случаи *удвоеннаго трехдневнаго* типа (*tertiana duplicata*) были наблюдаемы въ числѣ:

1	изъ 38	лихорадочныхъ въ	Витебской	больницѣ,
4	» 219	»	» Бахмутской	» (Ека-
				теринославской губерніи)
и 4	» 241	»	» Калужской	больницѣ.

Во всѣхъ ихъ были сильно развиты органическія страданія внутренностей и большой упадокъ силъ.

*Двойная трехдневная* (*tertiana duplex*) замѣчалась въ 3-хъ случаяхъ (изъ 151) въ Орловской губернской больницѣ; пароксизмы были двухъ родовъ: сильнѣйшіе приходили въ нечетные, а болѣе слабые — въ четные дни.

*Удвоенная четырехдневная* лихорадка (*quartana duplicata*) встрѣтилась только въ одномъ случаѣ въ Купянской больницѣ Харьковской губерніи.

Случаевъ атипической лихорадки было 3 въ Орловской больницѣ (на 151), 13 въ Ревенской (Волынской губерніи, на 70), 20 въ Бахмутской (Екатеринославской, на 219), 26 въ Нижегородской (на 242) и 42 въ Симбирской (на 483 случая лихорадки).

Переменяющіяся лихорадки ежедневныя чаще, чѣмъ трехдневныя, переходили въ послабляющія горячки и тифъ. Въ таковыхъ случаяхъ свободные промежутки (аппрексія) становились постепенно короче, по мѣрѣ удлинненія лихорадочныхъ приступовъ и наконецъ вовсе исчезали, смѣняясь однимъ послабленіемъ жара (*remissio*). Въмѣстѣ съ тѣмъ упадали силы больного, языкъ дѣлался сухимъ и жесткимъ, и обнаруживалось забытіе и легкій, въ началѣ еще непостоянный бредъ, за которыми слѣдовали и другіе симптомы страданія нервной системы. Тамъ же, гдѣ въ тифъ переходила трехдневная или четырехдневная переменяющаяся лихорадка, уже достигшая въ организмъ сильнаго развитія, иногда замѣчалось современное



теченіе этихъ обоихъ болѣзненныхъ процессовъ. Въ такихъ случаяхъ среди полной картины совершенно развившагося тифа замѣчались черезъ 2 или 3 дня пароксизмы перемежающейся лихорадки, состоявшіе изъ периодически-появлявшагося озноба, усиленія жара и обнаруженія пота на всемъ тѣлѣ. Въ Курской губернской больницѣ были наблюдаемы 6 случаевъ такого соединенія тифа съ лихорадкою, между прибывшими изъ Крыма нижними воинскими чинами; все они уступили внутреннему употребленію сладкой ртути съ сѣрнокислымъ хиномъ. Подобныя наблюденія встрѣчались въ больницахъ Сумской (Харьковской), Владимірской (Вольнской) и Островской (Псковской губерніи). Только въ нѣкоторыхъ изъ нихъ лихорадочный ознобъ во время приступовъ не былъ замѣчаемъ и пароксизмы ограничивались периодическимъ усиленіемъ жара и особенно сильнымъ потомъ, то на всемъ тѣлѣ, то на лицѣ, шеѣ и груди.

Или же перемежающаяся лихорадка являлась въ переходныхъ періодахъ тифа, что особенно замѣчалось въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ эпидемическое развитіе его было современно съ усиленіемъ лихорадокъ. Одно изъ такихъ наблюденій принадлежитъ С.-Петербургской больницѣ чернорабочихъ.

Больной, 34 лѣтъ, крѣпкаго тѣлосложенія, поступилъ 2 Сентября съ явленіями мозгового тифа, въ концѣ втораго періода, и при обыкновенномъ леченіи началъ уже поправляться; 6 числа совершенно неожиданно состояніе его сдѣлалось хуже и обнаружались признаки какъ бы предстоящаго выпотѣнія въ мозгу; явились безпамятство, бредъ, упадокъ силъ, пульсъ сдѣлался малымъ и частымъ, а языкъ сухимъ и блѣднымъ. Прописана была хлоровая вода въ отварѣ салапа. 7-го больной пришелъ вновь къ сознанію; отвѣчаетъ на вопросы, бредъ его прекратился; языкъ остается суховатымъ; леченіе то же, и сверхъ того назначены обливанія головы. 8-го опять бредъ и безпамятство, прочіе припадки тѣ же.

Прописанъ растворъ селитряной виселоты съ аравійскою камедью и настоемъ бараньей травы каждыя два часа по столовой ложкѣ. Обливанія продолжаются. 9-го улучшеніе сознанія, бредъ проходитъ; языкъ сухъ. Явно перемежающееся состояніе головныхъ симптомовъ наводитъ на мысль, что у больного развивается перемежающаяся лихорадка. Назначенъ хиинъ по два грана каждыя два часа. 10—12-го больной поправляется, сознаніе полное; изъ лѣваго уха показалась течь. 12-го начинается періодъ выздоравливанія; течь изъ уха еще продолжается, небольшая слабость. Хиинная соль оставлена, внутрь назначенъ настой бараньей травы; при употребленіи его въ продолженіи нѣсколькихъ дней сряду послѣдовало полное выздоровленіе больного.

При гастрическомъ характерѣ перемежающихся лихорадокъ, господствовавшемъ въ истекшемъ году, во многихъ мѣстностяхъ Имперіи, особенно лѣтомъ, въ числѣ исходовъ ихъ часто обнаруживался *поносъ* желчно-слизистаго или серозно-водянистаго свойства. Усиливаясь при возвратахъ лихорадки, онъ дѣлался иногда до того упорнымъ, что, не уступая никакимъ врачевнымъ пособіямъ, изнурялъ силы больного до совершеннаго истощенія. — Большая часть смертельныхъ случаевъ отъ лихорадки обуславливались этимъ видомъ исхода ея. Чаше встрѣчался онъ въ больницахъ губерній Псковской, Лифляндской, Курляндской, Смоленской, Витебской, Могилевской, Калужской, Тамбовской, Полтавской, Екатеринославской и Таврической, особенно между больными, поступающими изъ бывшихъ въ передвиженіи воинскихъ командъ. Изверженія низомъ въ началѣ представлялись сильно насыщенными желчью, цвѣта темно-бураго или зеленоватаго и совершались безъ боли и натугъ; впослѣдствіи, постепенно учащаясь, они дѣлались водянистыми и сопровождались жженіемъ и болью въ прямой кишкѣ и тenezмами. Животъ притомъ оставался мягкимъ и неболящимъ. Въ Вяземской больницѣ Смоленской губерніи замѣчали



иногда при такихъ поносахъ въ лихорадкѣ появленіе воспаления предъушной железы, съ видимымъ облегченіемъ для больного. Въ рѣдкихъ изолированныхъ случаяхъ являлся также въ числѣ исходовъ лихорадки *поносъ кровавый*, именно въ больницахъ Калужской, Перемышльской (Калужской губерніи) и Останковской (Тверской).

Вообще лихорадки въ истекшемъ году, и преимущественно въ первой половинѣ его, скоро переходили въ лихорадочное худосочіе (*cachexia typosa*). Иногда послѣ немногихъ приступовъ у больного видъ пароксизмовъ оставалась постоянная тупая боль головы, языкъ дѣлался блѣднымъ и нечистымъ, вкусъ во рту горькимъ и слизистымъ; притомъ иногда въ правомъ, а чаще въ лѣвомъ подреберьѣ ощущалась глухая боль, особенно при давленіи и изслѣдованіи, обнаруживавшемъ увеличеніе селезенки, въ степени иногда вовсе не соразмѣрной съ числомъ предшествовавшихъ пароксизмовъ. Въ то же время отъ внимательнаго изслѣдованія не укрывались признаки водянистыхъ накопленій въ серозныхъ полостяхъ и подъ кожей тѣла, особенно замѣтные на нижнихъ конечностяхъ и лицѣ, отпчавшемся въ этихъ случаяхъ характеристическою блѣдностію. Слабость больныхъ въ этомъ періодѣ болѣзни, не соразмѣрная съ числомъ пароксизмовъ, еще увеличивалась поносомъ, обыкновенно усиливавшемся при явленіяхъ лихорадочнаго худосочія.—Большая часть заносныхъ случаевъ перемежающейся лихорадки обнаруживали склонность къ этому виду исхода и многіе изъ нихъ поступали въ больницы въ полномъ его развитіи съ сильною водянкою, измѣненіемъ печени и селезенки и Брайтовымъ состояніемъ почекъ, обличавшемся присутствіемъ бѣлка въ мочѣ. Maximum содержанія таковыхъ къ общему числу лихорадочныхъ случаевъ было 1 : 2, minimum 1 : 20.

Изъ болѣе рѣдкихъ видовъ психода лихорадки были наблюдаемы слѣдующіе:

Воспаленіе селезенки встрѣчалось преимущественно у больныхъ, страдавшихъ долгое время лихорадкою, особенно 3-хъ-дневною и притомъ часто возвращавшеюся. Въ Гайсенской больницѣ Подольской губерніи были 3 такихъ случая между прибывавшими изъ Крыма нижними воинскими чинами; всѣ они окончились смертію. Въ Тамбовской больницѣ у 4 больныхъ лихорадка перешла въ воспаленіе селезенки, усложненное воспалительнымъ состояніемъ брюшины въ слабой степени, съ благопріятнымъ психодомъ. Сверхъ того случаи воспаленія и нарывовъ селезенки встрѣчались въ Тверской больницѣ.

Воспаленіе печени встрѣтилось однажды въ Гайсенской же больницѣ Подольской губерніи: больной долго страдалъ четырехдневною перемежающеюся лихорадкою; по прекращеніи ея образовалось у него воспаленіе печени и нарывъ на переднемъ краѣ правой доли, открывшійся въ полость живота съ смертельнымъ психодомъ.

Въ одномъ случаѣ въ Пензенской больницѣ по прекращеніи лихорадки, при употребленіи хинина, у больного слѣжалось переносное воспаленіе мошонки, перешедшее въ антоновъ огонь; по удаленіи помертвѣвшихъ частей обнажились оба яичка, державшіяся на однихъ семяныхъ канатикахъ; больной медленно выздоравлилъ.

Въ одномъ случаѣ въ Харьковской больницѣ по прекращеніи лихорадки образовался огромный карбункулъ на спинѣ.

Въ Гольдингенской больницѣ Курляндской губерніи, гдѣ лихорадка была вообще сильно распространена и злокачественна, часто въ продолженіе всей весны замѣчался психодъ ея въ скорбуть. На 148 случаевъ онъ послѣдовалъ въ 20 и въ 10-ти изъ нихъ окончился смер-



тію. По свидѣтельству мѣстныхъ наблюдателей, этотъ видъ скорбута имѣлъ прилипливое свойство. Сверхъ того во Владимірской больницѣ (Вольнской губерніи) исходъ лихорадки въ скорбуть замѣчался въ 16-ти случаяхъ на 99, и въ Пензенской въ 2 на 141 случай лихорадки.

На общую цифру 37,626 лихорадочныхъ случаевъ, пользованныхъ въ теченіе года въ гражданскихъ больницахъ, умерло 357. Смертельный исходъ по большей части послѣдовалъ отъ изнурительныхъ поносовъ, тифа, водянки полостей, отѣка легкихъ и послѣдовательныхъ патологическихъ состояній печени, селезенки и почекъ отъ отложенія въ нихъ, отвердѣнія и дальнѣйшаго перерожденія лихорадочнаго эксудата. Случаи смерти въ самомъ лихорадочномъ пароксизмѣ были рѣдки; въ числѣ ихъ, кромѣ немногихъ, послѣдовавшихъ отъ апоплектической и коматозной формы лихорадки, замѣчательны 2 отъ анэмій мозга, сердца и легкихъ, въ періодъ лихорадочнаго жара, встрѣтившіеся въ Валкской больницѣ Лифляндской губерніи. Въ этихъ обоихъ случаяхъ при вскрытіи найдены печень и селезенка увеличеннаго до огромныхъ размѣровъ объема, въ слѣдствіе острой опухоли, и въ состояніи непомѣрнаго переполненія кровію; печень темнѣе обыкновеннаго, селезенка черно-фіолетоваго цвѣта; ткань ихъ не размягчена; мозгъ, сердце, легкія, желудокъ и кишечный каналъ совершенно безкровны; легкія притомъ въ эмфизематозномъ состояніи. — Въ Черновской больницѣ одинъ изъ случаевъ лихорадки окончился смертію въ слѣдствіе сильной кровавой рвоты. Субъектъ этого наблюденія, тѣлосложенія нѣкогда крѣпкаго, часто страдалъ сильною лихорадкой; въ послѣднее время она довела его до анэмического состоянія, при чемъ селезенка была значительно увеличена въ объемѣ. При вскрытіи трупа растянутая капсула ея оказалась

почти пустою и содержавшею небольшое количество размягченной полужидкой селезеночной мякоти. Всѣ прочіе органы были въ сильномъ анэмическомъ состояніи. — Наконецъ въ одномъ случаѣ лихорадки смертнѣй исходъ послѣдовалъ отъ остраго отѣка надгортаника и глотки.

Больной прибылъ 15 Ноября въ Самарскую больницу на 3-ій день отъ рецидива перемежающейся лихорадки. При осмотрѣ его оказалось слѣдующее: субъектъ росту средняго, тѣлосложенія плотнаго, съ цвѣтомъ кожи желтовато-блѣднымъ; лице, руки и ноги его слегка въ отѣкѣ, но впадины при давленіи перетомъ не даютъ; органы дыханія относительно здоровы, пульсъ замедленъ (65 въ минуту); животъ на ощупь мягокъ, величны обыкновенной, колебанія влаги въ немъ не замѣтно, лѣвое подреберье немного вздуто и при давленіи чувствительно, языкъ по срединѣ бѣловатъ, ворсинки его мелки; испражненіе низомъ ежедневно. Хотя описанныя явленія и преимущественно характерическій видъ больного значительно подтверждали діагнозъ болѣзни, но тѣмъ не менѣе рѣшено было выждать пароксизмъ. Онъ наступилъ чрезъ два дня въ вечеру съ ознобомъ особенно продолжительнымъ: на другой же день больной ни на что не жаловался, и въ лицѣ его не было замѣтно никакой переменъ. На 7-ой день приступъ лихорадки повторился также въ вечеру и съ таковымъ же продолжительнымъ періодомъ озноба. Больному прописанъ былъ хининъ, который онъ и принималъ цѣлую недѣлю. Пароксизмовъ лихорадки болѣе не было, но больной началъ жаловаться на боль въ горлѣ съ лѣвой стороны при глотаніи и давленіи; снаружи въ этомъ мѣстѣ была замѣтна небольшая опухоль, но въ зѣвѣ не было никакихъ измѣненій. Хининъ былъ отложенъ, а на горло поставленъ горчичникъ. На слѣдующій день боль усилилась, дыханіе затруднилось и сдѣлалось хрипящимъ. Назначено рвотное и 8 піявокъ къ горлу. Вечеромъ дыханіе стало еще труднѣе, лице больного было блѣдное, глаза выражали испугъ, руки холодныя, пульсъ малый, при дыханіи голова закидывалась назадъ и слышался густой и прерывистый хрипъ. Подозрѣвая отѣкъ гортани, врачъ произвелъ скарификацію надгортаннаго



хряща. Вслѣдъ за тѣмъ появилась рвота, при чемъ вышло нѣсколько желтовато-тягучей слизи съ полосками крови и послѣдовало незначительное облегченіе. Больному назначено полосканье изъ настоя листьевъ шалфея съ креозотомъ. Утромъ дыханіе сдѣлалось свободнѣе, пульсъ полнѣе и мягче. Скарификація была повторена, полосканье продолжалось. Къ вечеру же припадки задущенія усилились и больной умеръ.

**Вскрытіе тѣла:** надгортанный хрящъ по крайней мѣрѣ въ четыре раза увеличенъ въ объемъ своемъ, въ особенности на лѣвой сторонѣ. При томъ онъ поднятъ перпендикулярно вверхъ и какъ бы сложенъ такъ, что правая его сторона соприкасалась лѣвой. При разрѣзѣ, на верхней поверхности его видны слѣды насѣчекъ скарификаторомъ; ткань же его и особенно клѣтчатка пропитана серозною жидкостью и желтоватымъ жидкимъ гноемъ. Сами хрящъ не измѣненъ въ нормальной величинѣ. Гортанная щель совершенно сжата отъ опухоли голосныхъ струнъ. Правое легкое приросло къ грудной стѣнкѣ свѣжимъ приращеніемъ, лѣвое нѣсколько спалось. Во всѣхъ частяхъ легкихъ, въ особенности же въ заднихъ доляхъ, замѣтенъ сильный отѣкъ; въ около сердечной сумкѣ до полутора унца желтоватой жидкости; правая и лѣвая полость сердца содержатъ не сгущенную черную кровь. Печень нормальной величины и гиперэмирована такою же кровью; желчный пузырь сильно растянутъ желчью. Селезенка въ 3 разъ болѣе обыкновеннаго размѣра, дряблая, многокровна; съ крупно-зернистымъ разломомъ. Желудокъ, кишки и почки не представляютъ ничего особеннаго.

При леченіи перемежающихся лихорадокъ *соли хинина* оставались главнѣйшимъ и надежнѣйшимъ средствомъ. Онѣ назначались или въ малыхъ учащенныхъ (по 1 — 2 грана чрезъ 2 часа), или въ однократныхъ большихъ приемахъ предъ пароксизмомъ; особенныхъ преимуществъ того или другаго изъ этихъ двухъ способовъ не замѣчалось. Въ числѣ прочихъ въ Тамбовской губер-

ской больницы большіе приемы хинина испытаны были въ 58 случаяхъ лихорадки; въ этомъ числѣ:

изъ 24 съ ежедневнымъ типомъ она

прекратилась отъ 1-го приема въ 10,

» » 2-хъ приемовъ » 12,

» » 3-хъ » » 2;

изъ 22 случаевъ трехдневная лихорадка

прекратилась отъ 1-го приема въ 7,

» » 2-хъ приемовъ » 9,

» » 3-хъ » » 4,

» » 4-хъ » » 2;

изъ 12 случаевъ четырехдневная лихорадка

прекратилась отъ 2-хъ приемовъ въ 2;

» » 4-хъ » » 8,

» » 6-ти » » 2 случаяхъ.

Изъ 156 больныхъ, пользовавшихся вообще хининомъ, на 12 онъ не оказалъ никакого дѣйствія и должно было перейти къ употребленію другихъ средствъ; въ томъ числѣ у 3-хъ больныхъ была къ нему идіосинкразія. — Въ Пензенской губернской больницы большіе приемы хинина, по 8 гранъ, на ночь наканунѣ пароксизма, были испытаны въ 12 случаяхъ, и только въ 8 съ успѣхомъ, въ 4-хъ же безъ успѣха; меньшими приемами по 1 грану чрезъ 2 часа излечены 70 больныхъ. — Въ Рязанской губернской больницы въ 60 случаяхъ лихорадки были назначаемы малые приемы по  $\frac{1}{12}$  грана чрезъ 1 или  $1\frac{1}{2}$  часа въ промежуткахъ между пароксизмами. Отъ нихъ у 11 больныхъ лихорадка прекратилась послѣ 4—5-го пароксизма, у 19-ти между 6—10-мъ, у остальныхъ 30-ти такой способъ леченія остался безъ дѣйствія и врачъ былъ принужденъ прибѣгнуть къ обыкновеннымъ приемамъ хинной соли. — Въ Лужской больницы (С.-Петербургской губернии) оказывалось полезнымъ въ видахъ усиленія дѣйствительности соединеніе ея съ *виннокаменною кислотою*



(sulphotartras chinin). Съ этою же цѣлю въ Павлоградской больницѣ (Екатеринославской губерніи) при леченіи хининомъ давали большимъ внутрь *соляную кислоту* во время самыхъ пароксизмовъ. Въ Харьковской губернской больницѣ было испытано въ 10 случаяхъ леченіе лихорадки вдыханіемъ *хиннаго эфира*, приготовленнаго по наставленію доктора Сыцяно, въ продолженіе цѣлой недѣли, но осталось совершенно безъ вліянія. — При обнаруженіи лихорадокъ у тифозныхъ больныхъ и усложненій ихъ поносомъ и воспалительнымъ состояніемъ паренхиматозныхъ органовъ, хининъ былъ съ успѣхомъ соединяемъ съ *сладкою ртутью*; при значительной опухолѣ селезенки — съ *двустринистою сурьмою* (sulfur auratum antimonij), при катаррѣ слизистыхъ оболочекъ живота и груди — съ *нашатыремъ*, при анэміи и гидрэмии съ *железомъ*. Противъ упорныхъ рецидивовъ лихорадки оказывалась весьма полезною, испытанная въ Валкской больницѣ (Инфляндской губерніи), смѣсь хинина съ *сирпокислымъ железомъ*, по 2 грана каждого, по три раза въ день. — Наконецъ въ видахъ усиленія дѣйствительности малыхъ приѣмовъ хинина въ Лемзальской больницѣ (той же губерніи) удачно соединяли спиртный растворъ его съ *Фовлеровой настойкою арсеника*. Къ раствору 10 гранъ хинина въ 3-хъ драхмахъ спирту прибавляли одну драхму Фовлеровой настойки и смѣсь эту давали 3 раза въ день по 20 капель до прекращенія лихорадки, а потомъ рѣже; изъ 38 случаевъ, такимъ образомъ пользовавшихся, лихорадка прекратилась совершенно въ 32, въ остальныхъ 6 оказалось необходимымъ употребленіе обыкновенныхъ приѣмовъ хинина.

Исключительное пользованіе лихорадокъ *арсеникомъ* было испытано въ Тамбовской губернской больницѣ въ 43 случаяхъ; изъ нихъ въ 20 оно осталось безъ дѣйствія, въ 23 пароксизмы прекратились:

не позже 10-го дня въ 1 случаѣ ежедневной, въ одномъ трехдневной и въ одномъ четырехдневной лихорадки;

не позже 20 дня въ 3 случаяхъ ежедневной, 2-трехдневной и 2-хъ четырех дневной;

не позже 30-го дня въ 2-хъ случаяхъ ежедневной, 3-хъ трехдневной и 2-хъ четырехдневной;

не позже 40-го дня въ одномъ случаѣ ежедневной и въ 3-хъ четырехдневной;

изъ остальныхъ двухъ случаевъ лихорадки, съ ежедневнымъ типомъ, въ одномъ оказалось необходимымъ продолжать внутреннее употребленіе арсеника до 89 и въ другомъ до 97 дня. Въ числѣ 23 больныхъ, излеченныхъ имъ, находилось 4, до тѣхъ поръ безплодно пользовавшиеся фосфоромъ и 2 — хининомъ. Возврата лихорадки не послѣдовало ни у одного. Сравнительно съ прочими методами леченіе арсеникомъ оказывалось особенно полезнымъ при усложненіяхъ лихорадки туберкулезомъ и явленіяхъ грозящаго исхода ея въ водянку. — Въ больницахъ Трубчевской и Сѣвской (Орловской губерніи) растворъ арсеника былъ употребляемъ въ 60 случаяхъ и только въ 3 изъ нихъ остался безъ дѣйствія. А въ Нижегородской губернской больницѣ изъ 11 случаевъ, пользовавшихся арсеникомъ, лихорадка прошла только въ 2.

Растворъ *фосфора* въ терпентинномъ маслѣ (4 грана на  $\frac{1}{2}$  унца) былъ испытанъ въ Тамбовской губернской больницѣ въ 131 случаѣ лихорадки. Приѣмъ его начинался съ 10 капель по 4 раза въ день и доходилъ, при ежедневномъ увеличеніи по одной каплѣ, до 16 и 20. Въ 18 случаяхъ употребленіе этого средства оказалось безплоднымъ; въ 5 лихорадка прошла, но скоро возвратилась; въ остальныхъ 108 излеченіе послѣдовало:

не позже 10 дней только въ 2 случаяхъ ежедневной лихорадки;



не позже 20 дней въ 15 случаяхъ ежедневной, въ 22 — трехдневной и 6 — четырехдневной;

не позже 30 дней въ 6 случаяхъ ежедневной, въ 18 — трехдневной и 8 — четырехдневной;

не позже 40 дней въ 3 случаяхъ ежедневной, 9 — трехдневной и 5 — четырехдневной;

не позже 50 дней въ 5 случаяхъ ежедневной, 2 — трехдневной и 3 — четырехдневной;

остальные 4 случая лихорадки, съ ежедневнымъ типомъ, требовали болѣе продолжительнаго употребленія фосфора, до 55, 62, 66 и 68-го дня. — Въ числѣ излеченныхъ имъ случаевъ находились до того безплодно пользовавшиеся хиномъ 4 и арсеникомъ 12. — Сравнительно съ другими методами леченіе фосфоромъ оказывалось особенно полезнымъ при ревматическомъ осложненіи болѣзни. — Въ Борисоглебской уѣздной больницѣ Тамбовской губерніи также съ успѣхомъ былъ испытанъ фосфоръ въ нѣсколькихъ случаяхъ перемежающейся лихорадки.

Изъ другихъ суррогатовъ хирина употреблялись противъ нея:

1) *Азотокислосе серебро*, въ 24 случаяхъ въ Сумской больницѣ Харьковской губерніи; въ 8 изъ нихъ лихорадка прекратилась безъ рецидивовъ; въ 10 прошла, но скоро возвратилась; въ остальныхъ 6 вовсе не уступила средству.

2) *Нашатырь* въ 32 случаяхъ въ Пензенской губернской больницѣ былъ употребленъ съ совершеннымъ успѣхомъ, безъ помощи другихъ средствъ.

3) *Рвотный камень* тамъ же въ 22 случаяхъ лихорадки, въ растворѣ 4 гранъ на  $\frac{1}{2}$  унца воды, по 30 капель чрезъ 2 часа. Равно въ больницахъ Тамбовской и Нижегородской во многихъ случаяхъ было достаточно употребленія того или другаго изъ этихъ двухъ средствъ для прекращенія слабыхъ видовъ лихорадки.

4) *Поваренная соль*, какъ исключительное средство, была употреблена въ 45 случаяхъ лихорадки въ Нижегородской больницѣ, но въ 30 изъ нихъ не обнаруживала никакого дѣйствія.

5) *Щавелекислое желѣзо* было испытано въ 6 случаяхъ въ той же больницѣ и помогло только въ 1.

6) *Нб. gratiolae* въ тепломъ настоѣ одной драхмы на 5 унцовъ воды назначалась часто при леченіи лихорадокъ въ уѣздныхъ больницахъ Казанской губерніи Цывильской, Свѣяжской, Мамадышской и Чистопольской. Настой ея давали, немедленно по прекращеніи пароксизма, чрезъ часъ по столовой ложкѣ до тѣхъ поръ, пока лихорадка не проходила. При томъ оказалось, что средство это не лишено дѣйствительности въ случаяхъ болѣзни свѣжихъ, простыхъ, неусложненныхъ, при типѣ ежедневномъ и даже иногда трехдневномъ, до обнаруженія послѣдовательныхъ страданій печени и селезенки. Тамъ же, гдѣ лихорадочный эксудатъ уже твердѣлъ и переходилъ въ перерожденіе, гдѣ начинались органическія измѣненія въ железахъ питательной системы, при лихорадкахъ застарѣлыхъ, неправильныхъ, усложненныхъ, какъ равно и вообще при четырехдневномъ типѣ, средство это оказывалось вовсе не дѣйствительнымъ. Иногда замѣчали при томъ пользу отъ употребленія его послѣ хирина для отвращенія рецидивовъ. — Въ Нижегородской больницѣ оно было употреблено въ 10-ти случаяхъ и только въ одномъ съ успѣхомъ.

7) Изъ наркотическихъ средствъ были употребляемы не безъ пользы *опій*, *красавица*, *аконитъ* и *страммоній* въ Тамбовской губернской больницѣ при лихорадкахъ всѣхъ типовъ слабой степени. Въ Ровенской больницѣ (Вольнской губерніи) для прекращенія лихорадки оказывалось иногда достаточнымъ давать больнымъ по одному грану опія за 2 часа предъ каждымъ пароксизмомъ,



на третьемъ лихорадка перѣдко прекращалась. Въ Островской больницѣ (Исковской губерніи) для той же цѣли назначали смѣсь спиртной настойки опія съ лавровишневою водою; въ 15 случаяхъ она оказалась вполне дѣйствительною.

8) Изъ горькихъ средствъ чаще другихъ исключительно употреблялись съ успѣхомъ: *квассія* въ Нижегородской больницѣ (въ 16 случаяхъ), *Salamis aromaticus* въ Суражской Черниговской губерніи (въ 15); *горькая настойка* (*Tinctura amara*) и *водяный эжектракъ чилибухи* въ Тамбовской губернской больницѣ.

9) Въ Острогожской больницѣ (Воронежской губерніи) 3 случая лихорадки были пользованы смѣсью *Benzöe* съ *сѣменами черной горчицы*, но безъ всякаго успѣха.

Вообще всѣ суррогаты хинина, кромѣ машьака и фосфора, оказывались полезными только въ слабыхъ формахъ лихорадки, дѣлавшихъ изысканными дифференціальныя показанія къ употребленію того или другаго изъ нихъ. Таковыя случаи вообще легко уступали леченію, хотя бы оно ограничивалось приложеніемъ сухихъ вантузовъ къ наружнымъ покровамъ позвоночнаго столба или Радемахеровскою водою изъ дубовыхъ жолудей, или даже обвертываніемъ мизинца лѣвой руки яичною пленкой, какъ равно проходили они въ нѣкоторыхъ больницахъ и вовсе безъ врачебнаго вмѣшательства.

---

Изъ 16,771 пораженныхъ въ теченіе 1856 года холерою въ Имперіи призрѣвалось въ гражданскихъ больницахъ 2,740, что составляетъ около  $\frac{1}{6}$  общаго числа. Самая большая часть находилась въ пользованіи въ С.-Петербургской больницѣ для чернорабочихъ, именно 893, всего же съ уѣздными больницами было пользовано въ больницахъ С.-Петербургской губерніи. . . . . 930;

въ Московской больницѣ чернорабочихъ.....	479
» больницахъ губерній Виленской.....	313
»       »       » Нижегородской.....	240
»       »       » Витебской.....	105
»       »       » Новгородской.....	71
»       больницѣ Самарской.....	69
»       » Саратовской.....	64
»       » Ковенской.....	62
»       » Тверской.....	57
»       » Митавской.....	52
»       » Астраханской.....	41
»       » Исковской.....	41
»       » Херсонской.....	29
»       » Ярославской.....	21
»       » Рижской.....	21
» больницахъ губерній Курской.....	15
»       »       » Владимірской.....	12
»       »       » Костромской.....	10
»       »       » Таврической.....	10
»       »       » Вольнской.....	9
»       »       » Смоленской.....	8
»       »       » Олонекской.....	7
»       »       » Черниговской.....	7
»       »       » Минской.....	7
»       »       » Калужской.....	7
»       »       » Воронежской.....	6
»       »       » Гродненской.....	6
»       »       » Могилевской.....	6
»       »       » Орловской.....	5
»       »       » Рязанской.....	5
»       »       » Симбирской.....	5
»       »       » Подольской.....	4
»       »       » Екатеринославской.....	3
»       »       » Тульской.....	3



въ больницахъ губерній Казанской.....	2
» больницъ области Бессарабской.....	2
и по одному въ больницахъ Вятской, Иркутской, Кіевской, Пензенской, Тамбовской и Эстляндской губерній.....	6

Всего 2,740.

Эпидемическая холера, истекшаго года отличалась нѣкоторыми особенностями, какъ въ развитіи отдѣльных признаковъ, такъ и въ самомъ теченіи своемъ и видахъ исходовъ.

Случаи быстрого и неожиданнаго обнаруженія ея у людей совершенно здоровыхъ вообще встрѣчались очень рѣдко; обыкновенно предшествовали ему иногда въ продолженіи нѣсколькихъ дней сряду общее изнеможеніе и слабость, чувство давленія подъ ложечкой, круженіе головы, потеря аппетита, поносъ и тошноты при нечистомъ и обложенномъ языкѣ. Пульсъ при томъ былъ медленнѣе и слабѣе обыкновеннаго, что замѣчалось не только въ первичныхъ случаяхъ, но и предъ развитіемъ холеры изъ другихъ болѣзней, также какъ и пониженіе температуры тѣла. Внимательное наблюденіе таковыхъ предвѣстниковъ холеры служило руководствомъ для предупредительнаго пользованія, имѣвшаго мѣстами благотѣльное вліяніе на ограниченіе числа жертвъ дѣйствительной болѣзни.

Изъ отдѣльных признаковъ ея *поносъ* былъ самымъ рѣзкимъ и постояннымъ. Испраженія низомъ были обыкновенно характерически-часты; только въ Астрахани въ числѣ особенностей мѣстной эпидеміи замѣчалось въ этомъ отношеніи уклоненіе: холерныя изверженія не были часты и ограничивались небольшимъ числомъ въ сутки. Въ одномъ изъ отдѣленій С.-Петербургской больницы Чернорабочихъ, помѣщаемомъ въ Исправитель-

номъ заведеніи, изъ 374 холерныхъ у 13 поносъ былъ весьма незначителенъ и ограничивался однимъ или двумя испражнениями серознаго свойства въ 24 часа; но тѣмъ не менѣе форма болѣзни была весьма опасна. Въ другомъ отдѣленіи той же больницы у 4 больныхъ (на 519) холерный поносъ сопровождался примѣсью крови и сильными тенезмами. Въ Астрахани это явленіе замѣчалось чаще, чему содѣйствовало мѣстное расположеніе къ кровавому поносу, державшемуся до холеры.

Какъ болѣе другихъ постоянный признакъ за поносомъ слѣдовала *рвота*, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ ея вовсе не было, въ другихъ она прекращалась очень рано и иногда являлась рѣдко. Прекращеніе ея при продолжавшихся водянистыхъ испражненіяхъ было однимъ изъ неблагопріятныхъ признаковъ въ Астраханской эпидеміи.

*Судороги* въ холерѣ прошлаго года были менѣе постоянны; притомъ довольно часто не развивались до сильной степени и скоро прекращались. Такое ослабленіе этого признака замѣчалось особенно въ С.-Петербургской и Нижегородской больницахъ. Въ Астрахани также во многихъ случаяхъ судорогъ вовсе не было; но тамъ, гдѣ встрѣчались, они были особенно болѣзненны и мучительны, хотя обыкновенно приходили въ видѣ болѣе рѣдкихъ приступовъ. Въ нѣсколькихъ случаяхъ замѣчали совершенное исчезаніе синевы конечностей въ свободныхъ промежуткахъ между приступами судорогъ, и это было однимъ изъ благопріятныхъ явленій. Въ Астраханской больницѣ было 6 такихъ случаевъ на 40. Самое отсутствіе судорогъ конечностей не уменьшало впрочемъ степени опасности болѣзни, и нерѣдко случаи ея, вовсе безъ рвоты и судорогъ, при одномъ холерномъ поносѣ и прекращеніи отдѣленія въ почкахъ, быстро переходили въ ціанотическое состояніе и смерть отъ асфиксіи.

*Прекращеніе мочевого отдѣленія* встрѣчалось между



больными въ С.-Петербургѣ еще менѣе постоянно, чѣмъ судороги. На 374 случая холеры въ отдѣленіи больницы, помѣщаемомъ въ Исправительномъ заведеніи, оно послѣдовало только въ 43 (1:8,7); въ остальныхъ случаяхъ, равно какъ у значительно большей части холерныхъ, пользовавшихся въ другомъ отдѣленіи больницы черно-рабочихъ, моча отдѣлялась болѣе или менѣе безпрепятственно, хотя притомъ другіе холерные признаки не останавливались въ ихъ послѣдовательномъ развитіи. Въ Астрахани прекращеніе отдѣленія мочи дня за два и болѣе до смерти было явленіемъ постояннымъ.

Срокъ продолженія собственно холернаго періода былъ различенъ; въ Нижнемъ Новгородѣ онъ былъ по большей части очень коротокъ; въ другихъ же мѣстахъ продолжался около 2—3 сутокъ. Рѣдко оканчивался онъ критическими явленіями, безъ перехода въ тифъ, за исключеніемъ Впленской эпидеміи, гдѣ исхода въ тифъ вовсе не замѣчалось, что и обваруживало значительное вліяніе на содержаніе смертности, ограничивавшееся тамъ только 34:100. Въ остальныхъ мѣстностяхъ наступленіе реакціи было въ то же время и началомъ обнаруженія тифозныхъ признаковъ, съ особенною быстротою развивавшихся одинъ за другимъ.

Въ главѣ ихъ возникали признаки страданія мозга въ различной степени. Въ легкихъ случаяхъ его больные жаловались на боль головы, которая притомъ дѣйствительно дѣлалась горячею, по ночамъ являлся у нихъ бредъ, проходившій къ утру; пульсъ притомъ все время оставался полнымъ и ускореннымъ, языкъ сухимъ и жесткимъ, зрачки были по большей части сжаты, но подвижны, глаза имѣли усиленный блескъ; у иныхъ показывалась рвота. — Въ болѣе сильныхъ случаяхъ при первомъ наступленіи тифозной реакціи обнаруживались сильная головная боль, склонность ко сну и апатія, расширеніе

зрачковъ и инъекція соединительной оболочки глазъ, съ ихъ тусклостию и отдѣленіемъ сгущенной слизи; сонливость скоро переходила въ сопорозное состояніе, съ признаками угнѣтенія мозга; дыханіе становилось медленнѣе и труднѣе, изверженія изомъ не подчинялись болѣе волѣ и сознанію больного.

Иногда въ самомъ началѣ реакціи у больныхъ по всему тѣлу показывалась возвышенная узловатая сыпь (*roseola papulata*), на подобіе появляющейся иногда при тифѣ, что въ прочемъ не обнаруживало очевидно благопріятнаго вліянія на дальнѣйшее теченіе холернаго тифоида. Въ С.-Петербургѣ въ нѣсколькихъ случаяхъ онъ усложнялся выпотѣніемъ серознаго эксудата въ полости, особенно грудную, гдѣ сравнительно количество его постоянно находимо было болѣе обильнымъ, чѣмъ на стѣнкахъ и въ мѣшкѣ брюшины. Въ Ковно въ періодѣ холернаго тифоида встрѣчались случаи воспаления предъшнхъ железъ, переходившія иногда въ обильное нагноеніе, но вліянія на благопріятный исходъ болѣзни оно не обнаруживало; иногда же показывалась рожа, преимущественно на лицѣ, съ видимымъ облегченіемъ признаковъ угнѣтенія мозга.

Наступленіе тифозной реакціи не всегда прекращало холерныя явленія; нерѣдко среди постепеннаго развитія ея признаковъ поносъ и рвота не прекращались вплоть до смерти больного; продолженіе ихъ въ этомъ періодѣ обыкновенно было однимъ изъ самыхъ дурныхъ предвѣстниковъ.

Выздоровленіе отъ холернаго тифоида вообще совершалось очень медленно; въ продолженіе его нерѣдко обнаруживались у больныхъ отъ потери соковъ признаки анеміи и оскуднѣнія пластическихъ частей крови, иногда являлся водяночный отѣкъ преимущественно нижнихъ конечностей, притомъ въ большей части случаевъ по



прекращеніи холерныхъ явленій оставался атоническій поносъ, замедлявшій выздоровленіе.

Результаты вскрытій холерныхъ труповъ, не представляя новыхъ данныхъ, содѣйствовали лишь подтвержденію усвоенныхъ наукою взглядовъ на анатомическую сущность этой болѣзни.

Тѣла умершихъ въ ціанотическомъ періодѣ долго удерживали мягкость и теплоту, которая иногда казалась увеличившеюся, сравнительно съ холернымъ охлажденіемъ тѣла при жизни. Оболочки мозга обыкновенно отличались цвѣтомъ темнѣе нормального отъ развитія капиллярныхъ сосудовъ; въ большихъ сосудахъ черепной полости встрѣчалось отложеніе пигмента. Слизистыя оболочки шейныхъ и грудныхъ органовъ были налиты покраснѣвшими, припухшими и покрытыми вязкою слизью. Такія же измѣненія иногда замѣчались на пластинкахъ плейры и серозномъ покровѣ около-сердечной сумки и сердца. Легкія были всегда въ эмфизематозномъ состояніи, при томъ заднія и нижнія части ихъ обыкновенно полнокровнѣе и темнѣе. Лѣвая половина сердца сжата, правая-расширена и наполнена темнымъ сверткомъ крови, простиравшимся въ полость большихъ венозныхъ сосудовъ. Слизистая оболочка желудка и кишекъ представлялась разбухлою и покрашеною болѣе или менѣе яркимъ кровавымъ цвѣтомъ, отъ свѣтлаго розоваго до темно-малиноваго; эпитеміи ея мѣстами отслоились; въ кишкахъ тамъ и сямъ замѣтны поверхности изъязвленія. Объемъ селезенки нѣсколько менѣе, существо ея блѣднѣе обыкновеннаго. Въ печени не встрѣчалось вовсе измѣненій, которыя бы можно было приписать исключительно холерному процессу; желчный пузырь былъ налитъ полнымъ вязкою, темною, сгущенною желчью. — Почки были обыкновенно увеличены въ объемъ и представляли признаки конгестивнаго состоянія, свой-

ственные первому періоду Брайтовой болѣзни. Органы таза, особенно у женщинъ, были гиперэмированы.

У умершихъ отъ холернаго тифоида существо мозга было блѣдно, желудочки его наполнены серознымъ выпотомъ. Слизистая оболочка дыхательнаго горла представлялась припухлою и инъецированою; легкія, особенно въ нижнихъ доляхъ, мѣстами на ограниченныхъ пространствахъ воспалены и на всемъ объемѣ цвѣта темнаго отъ гипереміи и гипостаза. Сердце вяло и наполнено жидкою кровію. Серозный покровъ желудка и кишечнаго канала менѣе обыкновеннаго блѣденъ; слизистая оболочка кишекъ, особенно тонкихъ, припухла, мѣстами поражена сильнымъ катарральнымъ воспаленіемъ и покрыта кровяною, студенистою слизью. Скученные и одинокія железы увеличены въ объемѣ и инфильтрованы; на первыхъ иногда сѣтчатыя изъязвленія (*plaques réticulaires*), — въ послѣднихъ — фолликулярные нарывы. Объемъ печени то нормаленъ, то увеличенъ вслѣдствіе гипереміи; существо селезенки вяло; почки увеличены, напряжены и гиперэмированы.

Смертность отъ холеры въ гражданскихъ больницахъ равнялась 53:100; такому невыгодному содержанію содѣйствовало повсемѣстно доставленіе въ больницы значительнаго числа случаевъ болѣзни въ тѣхъ періодахъ, когда уже безсильны всѣ врачебныя пособія. Такимъ образомъ было доставлено въ агоніи въ Астраханскую больницу 10, въ одно изъ отдѣленій С.-Петербургской больницы чернорабочихъ 44 больныхъ, какъ равно случаи слишкомъ поздняго обращенія къ врачебной помощи встрѣчались во всѣхъ безъ исключенія другихъ больницахъ, гдѣ призрѣвались холерные.

Въ леченіи ея въ прошломъ году всего полезнѣе оказывалась *сладкая ртуть* въ соединеніи съ *камфорой*, въ приемахъ по одному или по два грана, соотвѣтственно



степени болѣзни, первоначально каждый часъ, впоследствии чрезъ 2—3 часа. При употребленіи этихъ средствъ нерѣдко очень скоро прекращались холерныя изверженія, замѣняясь желчными, и болѣзнь принимала лучший характеръ. — Въ С.-Петербургской больницѣ вмѣстѣ съ тѣмъ давали въ малыхъ приемахъ *вератринъ* или *вытяжку чилибухи*, что, по мѣстнымъ наблюденіямъ, содѣйствовало особенно скорому прекращенію рвотъ. Въ Астраханской больницѣ эти послѣднія средства, равно какъ и спиртныя, не обнаруживали благопріятнаго дѣйствія; но тамъ иногда, вмѣсто того или другаго изъ нихъ, къ смѣси сладкой ртути съ камforoю съ успѣхомъ прибавляли небольшіе приемы *опія*. — Въ Нижегородской больницѣ исключительно сладкою ртутью было пользовано 122 холерныхъ и въ томъ числѣ 10 въ періодѣ предвѣстниковъ болѣзни, 45 въ полномъ развитіи ея и 67 въ алгидномъ состояніи. Изъ этого числа, въ которомъ  $\frac{9}{10}$  были случаи трудные, умерло 51, выздоровѣло 71 (41,8:100). — При употребленіи сладкой ртути съ камforoю назначались мѣстныя раздраженія и съ тѣмъ вмѣстѣ въ одномъ изъ отдѣленій С.-Петербургской больницы чернорабочихъ съ особеннымъ успѣхомъ теплыя ванны съ обливаніемъ больного студеною водою. — Въ Ковенской больницѣ, гдѣ сладкая ртуть также оказалась самымъ надежнымъ средствомъ, давали ее въ большихъ приемахъ, нерѣдко доходившихъ до 10 гранъ.

Въ минуты приближенія тифозной реакціи приносило очевидную пользу небольшое *кровопусканіе* (отъ 2 до 4 унцовъ), испытанное нѣсколько разъ въ С.-Петербургской больницѣ чернорабочихъ. — Въ полномъ развитіи реактивнаго періода въ Ковенской больницѣ съ успѣхомъ назначалось внутреннее употребленіе *минеральныхъ кислотъ*. — Въ отдѣленіи С.-Петербургской больницы чернорабочихъ въ 11-ти случаяхъ холеры при сильныхъ су-

дорогахъ было съ пользою сдѣлано *введеніе* въ мочевой пузырь на 5—15 минутъ *катетера*, намазаннаго вытяжкою оня (отъ 2 до 3 гранъ); скоро послѣ того больной ощущалъ облегченіе и засыпалъ, судороги прекращались и возстановлялось отдѣленіе мочи.

Изъ прочихъ средствъ, предложенныхъ въ разныя времена отъ холеры, были испытаны:

*Известковая вода* въ Лужской больницѣ (С.-Петербургской губерніи); въ 5 случаяхъ употребленіе ея принесло очевидную пользу, съ переходомъ впрочемъ въ тифозное состояніе въ 3 изъ нихъ.

*Уксусо-кислый свинецъ*. Въ Нижегородской больницѣ исключительно имъ были пользованы 20 холерныхъ случаевъ, въ томъ числѣ 2 при первыхъ признакахъ болѣзни; 9 въ полномъ ея развитіи и 9 въ алгидномъ періодѣ. Изъ нихъ 16 окончились смертію.

*Уксусокислый цинкъ* былъ употребленъ въ той же больницѣ въ 19 случаяхъ холеры, именно въ одномъ при началѣ ея, 8 въ полномъ развитіи и 10 въ алгидномъ періодѣ. Изъ нихъ 16 окончились смертію.

Очищенное *терпентинное масло* въ большихъ приемахъ назначалось въ 10 случаяхъ холеры въ С.-Петербургской больницѣ чернорабочихъ; при употребленіи его рвота и поносъ дѣйствительно прекращались, но жажда усиливалась, реакція наступала скорѣе и пораженіе мозга обнаруживалось въ болѣе сильной степени. Исходъ въ смерть последовалъ въ 8 случаяхъ. При вскрытіи умершихъ отъ холеры при употребленіи терпентиннаго масла находили слизистую оболочку желудка и кишекъ въ воспаленномъ, а мозгъ и оболочки его — въ гиперэмическомъ состояніи.

Въ такой же степени оказывалось неблагопріятнымъ леченіе холеры смѣсью *ревеля съ нашатыремъ*, *хлороформомъ*, *азотокислымъ серебромъ* и каплями *Клименки*,



испытанное въ нѣсколькихъ случаяхъ въ Нижегородской губернской больницѣ.

---

Случаи кроваваго поноса, встрѣчавшіеся въ гражданскихъ больницахъ въ теченіе всего истекшаго года, представляли мало особенностей, заслуживающихъ спеціальнаго изложенія. Только мѣстами эта болѣзнь, усиливаясь при продолжительномъ вліяніи вѣшнихъ неблагопріятныхъ условій, развивалась до замѣчательно-сильной степени и вмѣстѣ съ тѣмъ пріобрѣтала повидимому заразительныя свойства. Распространеніе кроваваго поноса отъ заносныхъ случаевъ было наблюдаемо во множествѣ случаевъ въ больницахъ Фридрихштатской (Курляндской), Медынской (Калужской) и Островской (Исковской губерній). При сильной степени болѣзни число кровавыхъ изверженій иногда доходило до 60 въ сутки, — въ числѣ признаковъ ея иногда являлись сильныя рвоты, цианотическое состояніе конечностей и судороги. Горячка, ее сопровождавшая, имѣла динамическій характеръ. Въ такихъ случаяхъ дизентерическія извы, какъ обнаруживалось при вскрытіяхъ, занимали почти все протяженіе толстыхъ кишекъ, съ совершеннымъ разрушеніемъ оболочекъ ихъ вплоть до мышечной. Иногда и она поражалась изъязвленіемъ, при чемъ слѣдовало прободеніе кишекъ съ смертельнымъ исходомъ.

---

Въ леченіи рожн предложенный профессоромъ Широговымъ способъ былъ испытанъ съ особенною пользою въ больницахъ Московской для чернорабочихъ и Ковенской. Съ самаго начала болѣзни больнымъ назначалась *камфора* въ 2-хъ-гранныхъ приемахъ внутрь; послѣ

8—10 такихъ пріемовъ горячее состояніе ослабѣвало, пульсъ не только переставалъ быть ускореннымъ, но дѣлался особенно медленнымъ (до 50 біеній въ минуту) и появлялся на всемъ тѣлѣ обильный потъ, послѣ котораго рожистая опухоль блѣднѣла. Въ случаяхъ, гдѣ при излишнемъ употребленіи камфоры являлся бредъ съ малымъ, сжатымъ, пульсомъ и дрожаніемъ конечностей, по очищеніи первыхъ путей, назначались промывательныя изъ отвару крахмала съ настойкой опія, скоро уничтожавшія припадки пиктокаціи.

Въ Нижегородской и Островской больницѣ (Воронежской губерніи) въ нѣсколькихъ случаяхъ рожи воспаленныя мѣста покрывались слоемъ *сырой ртутной мази*, по способу Рикора; употребленіе этого средства не всегда ограничивало распространеніе болѣзни и притомъ иногда сопровождалось спонотеченіемъ, развивавшимся послѣ 3—4 кратнаго употребленія мази. Болѣе полезнымъ оказывалось наружное употребленіе настойки *іода*; для уничтоженія рожистаго воспаленія перѣдко было достаточно одинъ разъ намазать ею пораженное мѣсто. — Лечение *коллодіумомъ* употреблялось съ успѣхомъ въ С.-Петербургѣ; въ Пензенской больницѣ находили выгоднымъ смѣшивать его съ небольшимъ количествомъ Венеціанскаго терпентина. Въ Орловской больницѣ этотъ способъ леченія рожи оказывался менѣе удовлетворительнымъ, чѣмъ другіе, и иногда совершенно безплоднымъ. — Въ Житомирской больницѣ онъ былъ удачно замѣняемъ наружнымъ употребленіемъ *раствора аравійской камеди съ сѣрниокислымъ желѣзомъ*, по совѣту Вельпо, современно съ внутреннимъ употребленіемъ рвотныхъ средствъ. Той же самой цѣли достигали въ Могилевской губернской больницѣ, покрывая пораженныя рожею мѣста слоемъ *несоленого свиного сала* и назначая при томъ внутрь слабительныя. —



Вообще рожа имѣла въ тѣхъ только случаяхъ смертельный исходъ, гдѣ она обнаруживалась послѣ другихъ болѣзней, какъ то горячекъ, тифа, шеймоши, холеры, иіэміи, и гдѣ она или отличалась съ самаго начала наклонностію къ гангренозной формѣ, или отъ случайныхъ условій въ нее переходила. Общее содержаніе смертности отъ рожи въ гражданскихъ больницахъ равнялось 1:20. —

---

Отъ ревматизмовъ было пользовано въ теченіе года 18,044 больныхъ. Большая часть случаевъ (около  $\frac{2}{3}$ ) принадлежала формѣ хронической безъ лихорадочныхъ явленій, и притомъ членосоставному ревматизму. — Въ числѣ отдѣльныхъ его случаевъ замѣчательно въ практическомъ отношеніи наблюденіе, принадлежащее Харьковской больницѣ:

Больному ревматизмомъ колѣннаго состава съ сильными и постоянными болями поставлено было 10 пиявицъ вокругъ самага состава. На другой же день развилась у него флегмонозная рожа и быстро, несмотря на все врачебныя пособія, распространилась на всю нижнюю конечность и тазъ. Воспаленіе кѣтъчатки, перешедшее на всемъ пораженномъ мѣстѣ въ острогнойный отѣкъ съ помертвѣніемъ наружныхъ покрововъ, произвело общую піэмію съ смертельнымъ исходомъ.

Въ больницахъ Иркутской губерніи, гдѣ ревматизмъ вообще сильно развитъ, было наблюдаемо нѣсколько случаевъ его съ признаками сильного раздраженія спиннаго мозга и преимущественно болѣзненными судорожными вздрагиваніями всего тѣла. Въ нихъ съ успѣхомъ назначались небольшіе приемы опія въ соединеніи съ противуревматическими средствами. Изъ послѣднихъ въ Кяхтѣ, по свидѣтельству мѣстныхъ наблюдателей, ока-

зывались весьма полезными, особенно противъ хроническаго ревматизма; ванны изъ такъ-называемой *гуджеры*. Подъ этимъ именемъ тамъ извѣстенъ собираемый на солончакахъ выпотъ на поверхность земли соли, состоящей изъ смѣси сѣрно-и угле-кислыхъ кали и натра, съ примѣсью кремнистаго песка и земляныхъ частицъ. Отъ 3 до 4 фунтовъ этой смѣси разводится въ 8 ведрахъ горячей воды на ванну, въ которой больной долженъ сидѣть по 2 раза въ день, не менѣе 10 и не болѣе 30 минутъ.

Въ Венденской больницѣ (Анфляндской губерніи) въ двухъ случаяхъ членосоставнаго ревматизма появились опухоли паховыхъ железъ и вмѣстѣ съ тѣмъ быстро исчезли все признаки ревматическаго пораженія составовъ. У одного изъ больныхъ паховикъ разрѣшился, у другаго же перешелъ въ нагноеніе, продолжавшееся весьма долго. — Въ Минской губернской больницѣ былъ наблюдаемъ случай застарѣлаго ревматизма съ надкостными наростами и также опухолью паховыхъ и сверхъ того подкрыльцовыхъ железъ:

Больной, 32 лѣтъ отъ роду, съ Августа 1855 года началъ страдать ревматическими болями нижнихъ конечностей, противъ которыхъ онъ безуспѣшно употреблялъ разнородныя средства и наконецъ гидротатическое леченіе, окончательно ему повредившее. 14 Января 1856 года онъ поступилъ въ больницу въ совершенномъ истощеніи и съ потерей возможности не только ходить, но даже поворачиваться на кровати. Всякое движеніе какъ нижнихъ, такъ и верхнихъ конечностей, сопровождалось сильнѣйшею болью, выводившею больного изъ терпѣнія. На тѣхъ и другихъ, не исключая и бедренныхъ костей, было нѣсколько объемистыхъ холодныхъ твердыхъ наростовъ (*tophi*). Они начали образовываться еще съ Октября 1855 года сперва на лѣвой голени, а потомъ на другихъ мѣстахъ и преимущественно усилились во время леченія холодною водою въ Декабрѣ 1855 года; въ то же время обра-



зовались на обѣихъ сторонахъ значительныя опухоли железъ въ паху и подъ мышками. Ожесточеніе болѣй обыкновенно наступало ночью и лишало больного сна, что крайне его ослабляло. Сифилитическою болѣзнію онъ никогда не страдалъ.

Внутреннее леченіе въ этомъ случаѣ ограничивалось употребленіемъ іодистаго поташа, въ водяномъ растворѣ сперва по скрупулу, а потомъ въ постепенно бѣльшихъ приѣмахъ и до цѣлой драхмы, въ сутки. Вмѣстѣ съ тѣмъ больному начинались не большіе приѣмы уксусо-кислаго морфія. Черезъ двѣ недѣли внутреннего употребленія іодистаго поташа опухоли конечностей и железъ, какъ въ паху, такъ и подъ мышками начали разрѣшаться съ видимымъ увеличеніемъ силъ больного и уменьшеніемъ признаковъ истощенія. Пятинедѣльнаго употребленія средства было достаточно для совершеннаго уничтоженія какъ наростовъ и опухолей, такъ и мучительныхъ болѣй въ конечностяхъ; общее количество лекарства, принятаго въ продолженіе этого срока, дошло до 14 драхмъ. 23 Февраля больной вышелъ изъ больницы совершенно здоровымъ и значительно поправившимъ во всемъ тѣлѣ.

Изъ случаевъ смертельнаго исхода замѣчательно вскрытіе тѣла больного Каменецъ-Подольской тюремной больницы, страдавшаго въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ хроническимъ ревматизмомъ различныхъ составовъ, именно обѣихъ бедренно-тазовыхъ, колѣнныхъ и плечевыхъ, съ временнымъ появленіемъ ломоты въ составѣхъ ягоди и стопы. Вслѣдствіе постоянныхъ болѣй, больной принужденъ былъ почти всегда оставаться въ неподвижномъ полусогбенномъ положеніи, отчего у него образовались свденія мышцъ сгибающихъ бедро. Наконецъ развилась бугорчатая чахотка, отъ которой онъ и умеръ.

При вскрытіи найдено въ обѣихъ легкихъ огромное количество желтыхъ бугорковъ, скученныхъ и въ видѣ инфильтраціи: вообще всѣ внутренніе органы были въ анэмическомъ состояніи. Членосоставные концы костей сочлененій, одержимыхъ постоянными ломотными болями, сдѣлались такъ мягки, что легко рѣза-

лись скапелемъ и до того ломки; что напр. шейка бедра отъ обыкновеннаго поворота на наружу переломилась; цвѣтъ костей представлялся блѣдно-желтымъ; въ клѣточкахъ ихъ было обильное отложеніе жиру. Въ составахъ синовіи почти вовсе не было, впрочемъ поверхность ихъ не представляла никакихъ измѣненій и была гладкою, блестящею, но сухою.

Въ общемъ числѣ случаевъ смертельнаго исхода отъ острыхъ сыпей, пользовавшихся въ гражданскихъ больницахъ, большая часть принадлежала натуральной оспѣ. Смертность отъ нея зависѣла какъ иногда отъ слишкомъ поздняго доставленія больныхъ, такъ отъ усложненій болѣзни рожею, часто распространявшеюся на большія протяженія, воспаленіемъ легкихъ, венъ, поносомъ, пролежнями и отъ исходовъ въ гангрену, встрѣчавшихся преимущественно въ оспинахъ на слизистыхъ оболочкахъ. При томъ случаи натуральной оспы, пользовавшиеся въ гражданскихъ больницахъ, но большей части представляли болѣзнь въ полной силѣ ея развитія, неослабленнаго почти ни у одного больного своевременнымъ предохранительнымъ прививаніемъ.

Въ числѣ ихъ замѣчательнѣ примѣръ опасныхъ явленій въ періодѣ высыпанія оспы:

Больная, отъ роду 7 лѣтъ, слабаго тѣлосложенія, поступила въ Харьковскую больницу 7 Ноября съ явными припадками воспаления мозга. До того она жаловалась на сильную боль головы и постоянный общій жаръ; но скоро по поступленіи развилось у нея безсознательное состояніе; сонъ спячкою и бредомъ; глаза сдѣлались красными, слезящимися, въ мускулахъ обнаруживались сильныя судорожныя движенія, сардоническій смѣхъ и по временамъ тризмъ; при томъ замѣчалось сильное біеніе сонныхъ артерій и отъ времени до времени рвота безъ всякаго при томъ страданія желудка и кишекъ. Горячка у больной синохальнаго харак-



тера, пульсъ частый, сильный, кожа суха и горяча. Назначенъ противовоспалительный способъ леченія: пиявки позади ушей, къ затылку горчичники, внутрь пол-ушца клещевиннаго масла. 8 Ноября сила припадковъ не уменьшалась, но на нижнихъ конечностяхъ начала появляться сыпь, схожая съ оспою. Назначена сладкая ртуть по грану каждыя два часа, мазь изъ рвотнаго камня для втиранія въ затылокъ; горчичники къ ногамъ, настой липоваго цвѣта для питья. 9 числа отъ втиранія мази на затылкѣ появилась сыпь, оспа же на нижнихъ конечностяхъ увеличилась и показалаcя сверхъ того на туловищѣ и верхнихъ конечностяхъ; мозговые припадки ослабли. Рвота прекратилась, судорожныя явленія появлялись рѣже, больная меньше бредила, начала приходить въ сознаніе, лихорадочное состояніе ослабло; средства тѣ же. 10 Ноября всѣ мозговые припадки совершенно прекратились, оспа появилась на всемъ тѣлѣ; сознаніе больной полное, судорогъ нѣтъ; сопорозное состояніе прошло и дальнѣйшее теченіе болѣзни было нормальное, безъ осложнений и съ правильнымъ состояніемъ всѣхъ отправленій. Больная выздоровѣла.

Леченіе оспы сообразовалось съ видомъ и степенью горячечнаго состоянія и случайныхъ осложнений ея. По уменьшеніи соотвѣстственными врачебными средствами синихальныхъ явленій и прилива крови къ мозгу или легкимъ, въ дальнѣйшемъ теченіи горячки была обыкновенно назначаема хлорова вода. Для ограниченія мѣстныхъ явленій, при сильномъ и разрушительномъ развитіи оспины, особенно на лицѣ, иногда оказывалось необходимымъ употребленіе наружныхъ средствъ, въ числѣ которыхъ болѣе прочихъ приносило пользы накладываніе на оспины ртутнаго пластыря.

---

Изъ ограниченнаго числа случаевъ остраго отравленія крови введеніемъ въ нее животной заразы замѣча-

тельно сдѣланное въ Полтавской болыппѣ наблюденіе у человѣка *остраго сана* (*Malleus humidus*).

Больной, 50 лѣтъ, поступилъ въ больницу 28 Апрѣля 1856 года. Изъ распросовъ оказывалось, что онъ обращался съ лошадьми, пораженными сапомъ. При поступленіи онъ еще жаловался на боль головы и сочлененій, усиливавшуюся при давленіи и движеніи; но скоро наступило тифозное состояніе, пульсъ сдѣлался слабымъ и весьма частымъ, языкъ сухимъ и покрытымъ буроватою корою; температура тѣла была возвышена, кожа покрыта клейкимъ вонючимъ потомъ. Больной притомъ чрезвычайно слабъ и находится въ бреду; изверженія низомъ водянисты, обильны, вонючи и непроизвольны.

При изслѣдованіи груди въ передней сторонѣ нижней доли праваго легкаго звукъ оказывался туповатымъ; при выслушиваніи этого мѣста слышны были трескучій хрипъ (*ronchus crepitans*) и бронхіальное дыханіе. На лицѣ больного видна розжистая краснота съ опухолью вѣкъ: соединительная оболочка глазъ красна съ густымъ и ѣдкимъ отдѣленіемъ. На тыльной поверхности кисти въ локтевомъ составѣ и въ подмышечныхъ впадинахъ, также въ сочлененіяхъ бедра и стопы съ голенью замѣтны нарывы, величиною въ голубиное яйцо, конической формы и около нихъ флегмонозное воспаленіе. За тѣмъ на всемъ тѣлѣ показались небольшіе, какъ заостренные, такъ и плоскіе нарывы, а равно на слизистой оболочкѣ рта и носа. При вскрытіи изъ нихъ вытекалъ гной водянистый и смѣшанный съ клочками разрушенной клетчатки и кровью. Слизистая оболочка носа была красна и въ опухшемъ состояніи, съ отдѣленіемъ густой и вонючей слизи; въ такомъ же видѣ представлялась и слизистая оболочка рта, притомъ кровоточивая и покрытая нарывами, язвами и струпамн. Въ продолженіи трехъ дней не видно было никакой особенной перемѣны въ горячечномъ состояніи больного, но силы его истощались, мѣстные же явленія постоянно усиливались: появлялись новыя нарывы и язвы, а прежнія увеличивались въ объемъ и проникали въ глубину; съ четвертаго дня по поступленіи больной впалъ въ




коматозное состояніе, пульсъ его сдѣлался перемежающимся, дыханіе затруднительнымъ и прерывистымъ, а на шестой день послѣдовала смерть.

Для лучшаго уясненія этого замѣчательнаго случая прилагается рисунокъ (Tab. 11.) переносныхъ нарывовъ наружной поверхности тѣла при септѣ у человѣка, замѣствованный изъ совершенно тождественнаго наблюденія, еще прежде сообщеннаго Медицинскому Департаменту. Отъ вышеприведеннаго случая оно отличалось болѣе быстрымъ теченіемъ болѣзни, продолжавшейся отъ зараженія до смерти только 48 часовъ и нѣкоторыми дополнительными признаками общей піэміи, въ числѣ которыхъ было отложеніе гноя въ камерахъ глаза и въ уринѣ при жизни больнаго. Нарывы покрывали всю грудь, животъ, верхнія конечности и бедра, ограничиваясь притомъ переднею и боковыми поверхностями тѣла; на спинѣ же, какъ равно на всей головѣ, берцахъ и стопахъ ихъ вовсе не было. Объ общемъ числѣ ихъ на тѣлѣ можно приблизительно судить по тому множеству, которымъ въ прилагаемомъ рисункѣ устьяно плечо. Мѣлкіе изъ нарывовъ ограничивались наружными покровами и подкожною клѣтчаткою; бѣльшіе проникали въ существо мышницъ; нѣкоторые изъ нихъ доходили до величины лимона. Какъ тѣ, такъ и другіе были окружены желтоватымъ кольцомъ, различной ширины. На бѣльшихъ замѣчались въ центрѣ пуповидныя углубленія. Уплотненной піогенической поверхности ни въ одномъ нарывѣ не было. Вены на всемъ протяженіи тѣла, при самомъ внимательномъ изслѣдованіи, не представляли никакихъ признаковъ воспалительнаго состоянія. —

Два случая злокачественнаго прыща (*pustula maligna*), были наблюдаемы въ мужскомъ отдѣленіи С.-Петербургской больницы чернорабочихъ. Оба больные прибыли въ боль-







ницу въ одинъ и тотъ же мѣсяцъ и съ одной и той же волосяной фабрики.

Е..... С..... 30 лѣтъ, хорошаго тѣлосложенія, поступилъ на четвертый день болѣзни; онъ имѣлъ нѣсколько углубленный, величиною въ гривенникъ, черный прыщъ на правой щекѣ подѣ скуловымъ отросткомъ и нѣсколько прозрачныхъ пузырьковъ на воспаленной и опухшей окрестности, безъ лихорадочнаго состоянія. Больному была назначена испанская мушка, величиною болѣе окружности прыща, а внутрь камфора. Послѣ четвертаго дня прыщъ достигъ величины полтинника, но не распространялся болѣе, рожистая опухоль окрестности увеличилась, пульсъ только нѣсколькими ударами ускорился; снаружи по снятіи мушки на образовавшіеся подѣ нею струпы была приложена раздражающая мазь (*Unguent. irritans*). На 9 день началось нагноеніе отъ краевъ; окружающія мягкія части болѣе опухли и воспалились, пульсъ сдѣлался ускореннымъ, аппетитъ уменьшился, голова оставалась свободною. Внутрь и снаружи прописана была хлоровая вода. На 12 день струпы, придерживавшіеся только на срединѣ, были удалены. На 14 день дно язвы было чистое, нагноеніе хорошее, опухоль окрестности незначительна, аппетитъ улучшился, а послѣ 4 недѣль больной былъ выпущенъ здоровымъ.

А..... П..... 22 лѣтъ, также хорошаго тѣлосложенія, прибылъ въ больницу 20 Ноября, послѣ 2 недѣльнаго страданія; у него былъ маленькій черный прыщъ величиною въ пятакъ на лѣвомъ вискѣ, безъ яркой красноты, но съ значительною опухолью; языкъ больного былъ обложенъ, испражненія низомъ нормальны, пульсъ не совсѣмъ спокойный. Мушка на прыщъ, внутрь мышьякъ. 23 Ноября прыщъ сдѣлался гораздо больше, также и воспаленная опухоль въ окрестности; преимущественно распространялась она позади лѣваго уха, ниже сосцевиднаго отростка на шею, но притомъ лихорадка была умѣренная и голова у больного не болѣла; снаружи была употреблена мазь изъ испанскихъ мушекъ, а на опухоль шеи камфорное масло. 25 Ноября прыщъ достигъ величины серебрянаго рубля и отдѣлился ясною демаркаціонною линіею



ею, опухоль за ухомъ и на шеѣ сдѣлалась меньше и ограничилась; пульсъ былъ спокойный. 26 Ноября появилось нагноеніе въ окружности; опухоль въ окрестности дѣлалась все менѣе и мягче; для перевязки назначенъ настой ромашки и хлористая вода. 30 Ноября струпу отдѣлеть; на средній еще не совершенно очистившагося дна видно было, что язва проникала довольно далеко въ глубину. 2 Декабря дно уже было чисто, опухоль въ окружности почти пропала и 16 Декабря больной выпущенъ изъ больницы здоровымъ.

Къ этой же категоріи отнесенъ случай ужаленія змѣею, пользовавшийся въ Житомирской больницѣ. Ужаленіе послѣдовало съ внутренней стороны ногтя большого пальца правой ноги; въ этомъ мѣстѣ замѣчалось свѣтлорозовое блестящее мяско, эллиптической формы, значительно возвышавшееся надъ поверхностью кожи и имѣвшее до 5 линий въ большемъ и 3 въ меньшемъ діаметрѣ. При томъ вся стопа и нижняя половина голени были въ сильной опухолѣ, совершенно выравнивавшей возвышенности мышечковъ. Кожа на нпхъ была нѣсколько краснѣе обыкновеннаго и удерживала вдавленіе пальца. — Горячечныя явленія были слабо развиты. Лечение ограничивалось приѣмомъ сладкой ртути въ 6 гранъ и мѣстнымъ употребленіемъ хлористой извести. На 5-й день отъ укушенія больной совершенно выздоровѣлъ.

---

При леченіи эпидемическаго коклюша въ больницахъ Ковенской губерніи было нѣсколько разъ испытано предложенное французскими врачами *прививаніе предохранительной оспы*. Выводы изъ таковыхъ наблюденій привели къ слѣдующимъ даннымъ:

1) предохранительная оспа при коклюшѣ правильно переходитъ всѣ свои періоды, при томъ

2) иногда имѣетъ очевидно благоприятное вліяніе на ходъ его, сокращая срокъ болѣзни и уменьшая силу припадковъ;

3) во многихъ же случаяхъ не обнаруживаетъ на коклюшъ никакого дѣйствія.

Въ нѣсколькихъ случаяхъ оказывалось противъ него особенно полезнымъ внутреннее употребленіе *танина* по 6 гранъ въ сутки, въ соединеніи съ соленымъ настоемъ *Александрійскаго листа*. Иногда 6-ти дневнаго употребленія этихъ средствъ было достаточно для совершеннаго уничтоженія болѣзни. — Въ Гродненской больницѣ по устраненіи усложненій употребляли противъ нея съ пользою *спиртыю съ кошенилю*, а подъ конецъ леченія *танинъ*.

---

Въ общемъ числѣ воспаленій, пользовавшихся въ теченіи истекшаго года въ гражданскихъ больницахъ, болѣе  $\frac{1}{2}$  (17224 : 30916) составляютъ воспаленія легкихъ и плейры, съ смертностію 1 : 7, 4. Независимо отъ сильной степени развитія воспалительнаго процесса, не уступавашаго иногда никакимъ успіямъ искусства, она обуславливалась въ значительной части случаевъ общимъ характеромъ воспаленія и усложненіями его. Изъ числа послѣднихъ чаще всего встрѣчались при воспаленіяхъ плейры и особенно легкихъ болѣзни печени и мозга, перемежающаяся лихорадка и кровавый поносъ; характеръ же самыхъ воспаленій мѣстами отъ общихъ болѣзнетворныхъ причинъ былъ динамическимъ и скорбутнымъ и въ индивидуальныхъ случаяхъ туберкулѣзнымъ. Лечение воспаленій грудныхъ органовъ должно было сообразоваться съ этими условіями. При формахъ чисто-воспалительныхъ употреблялись съ пользою какъ общія, такъ и



мѣстныя кровопусканія, обнаруживавшія неблагопріятное дѣйствіе при адинамическомъ и скорбутномъ характерѣ. — *Способъ Пешье* оказывался вовсе непримѣнимымъ въ С.-Петербургской больницѣ чернорабочихъ; при употребленіи его весьма скоро обнаруживались признаки разжиженія крови, доходившаго иногда до опасныхъ размѣровъ. Скрывались ли причины этого въ условіяхъ дурнаго питанія и склонности класса чернорабочихъ къ спиртнымъ напиткамъ, или основывались на другихъ обстоятельствахъ — осталось не опредѣленнымъ. — Въ больницахъ Псковской губерніи этотъ способъ въ большемъ числѣ случаевъ оказывался весьма полезнымъ.

Замѣчательны сравнительные выводы о дѣйствіи различныхъ средствъ на пнеймонію, сдѣланные въ Нижегородской больницѣ: кровопусканіе было употреблено въ 13 случаяхъ пнеймоній; очевидное ослабленіе припадковъ и переломъ болѣзни обнаружили непосредственно послѣ него въ 2 только случаяхъ, а въ 4 перанѣ, какъ чрезъ нѣсколько дней, когда ихъ можно было приписать естественному ходу воспаленія; въ 7 же случаяхъ общее кровопусканіе не обнаружало никакого вліянія на ходъ воспаленія легкихъ, совершавшаго свое теченіе въ продолженіи отъ 2 до 6 недѣльнаго срока. — Мѣстныя кровопусканія при ставленіемъ пиявицъ и банокъ были съ пользою употреблены въ 27 случаяхъ. — Безъ предпосланнаго кровопусканія *селитра* давалась внутрь съ очевиднымъ успѣхомъ 17 больнымъ, съ сомнительною пользою, или безъ нея, въ 15 случаяхъ. — Внутреннее употребленіе *железа* назначалось 20 больнымъ, въ томъ числѣ 13 съ очевиднымъ успѣхомъ, 7 безъ всякой пользы; изъ послѣднихъ умерло 3. Наконецъ 9 изъ 72 пнеймониковъ выздоровѣли при одномъ *выжидательномъ* способѣ леченія и удаленія усложненій; переломъ болѣзни слѣдовалъ на 7, 8 и 9 день, а совершенное возстановленіе здоровья

въ концѣ 2 или 3 недѣли отъ начала воспаленія. — Въ Сумской больницѣ Харьковской губерніи выжидательный способъ леченія пнеймоніи былъ испытанъ въ 8 случаяхъ: 4 изъ нихъ окончилась смертію, въ остальныхъ должно было прибѣгнуть къ употребленію мѣстныхъ кровопусканій и отвлекающихъ средствъ.

Въ С.-Петербургской больницѣ для чернорабочихъ въ 15 случаяхъ воспаленія легкихъ съ успѣхомъ назначался внутрь водяной растворъ *сулемы* по одному грану въ сутки; послѣ 2—3 дневнаго употребленія его мокрота теряла ржавокровавый цвѣтъ и выпотъ начиналъ всасываться.

Въ числѣ случаевъ воспаленія печени встрѣчались исходы въ нагноеніе существа ея и образованіе нарывовъ. Таковыхъ было два въ С.-Петербургской больницѣ чернорабочихъ; оба они окончилась смертію, такъ что діагнозъ подтвердился вскрытіемъ. У одного изъ больныхъ нарывъ, занимавшій лѣвую долю печени, открылся въ брюшную полость съ быстрымъ наступленіемъ смертельнаго исхода отъ воспаленія брюшины. — Въ одномъ изъ наблюденій, принадлежащихъ Пензенской больницѣ, больной страдалъ нѣсколько разъ повторявшимся воспаленіемъ печени, въ сопровожденіи перемежающейся лихорадки и кончилъ жизнь при явленіяхъ піэміи. Вскрытіе его обнаружило слѣдующія измѣненія:

Все тѣло въ сильной степени исхуданія; цвѣтъ кожи повсюду землянисто-желтый. Легкія блѣдны и безкровны, правое срослось съ подреберьемъ давнимъ пластическимъ выпотомъ. Въ околосердечной сумкѣ немного серозной влаги; существо сердца вяло, въ желудочкахъ небольшое количество жидкой крови. Печень неимоверной величины, съ поверхностію неровною, бугроватою. Существо ея желтовато-коричневаго цвѣта; изъ разрѣзовъ его повсемѣстно вытекаетъ въ большомъ количествѣ густой гной, смѣшанный съ жидкою кровью. На задней поверхности печени, гдѣ она при-



легасть къ 12-ти перстной кишкѣ, большой нарывъ, глубоко вѣдряющійся въ существо органа и наполненный густымъ гноемъ. Стѣнки желчнаго пузыря утолщены; слизистая оболочка его сѣраго шпфернаго цвѣта; въ полости его, вмѣсто желчи, довольно большое количество густой, тягучей и совершенно прозрачной жидкости. Объемъ селезенки вчетверо болѣе нормальнаго; цвѣтъ ея наружной поверхности блѣдный, матовый, отъ утолщенія капсулы. На заднемъ краѣ ея большое изъязвленіе, покрытое густымъ гноемъ. Существо селезенки безкровно и зернисто. Желудокъ и кишки въ конгестивномъ состояніи. Въ остальныхъ органахъ измѣненій нѣтъ.

Въ Житомирскую больницу была принята больная, долго страдавшая перемежающеюся лихорадкою, въ сильномъ изнуреніи и съ признаками брюшной водянки, отъ которой, вскорѣ по поступленіи, она и умерла. При вскрытіи тѣла ея оказалось слѣдующее:

Существо мозга блѣдно, анэмпировано и въ сильномъ отѣчномъ состояніи. Въ серозныхъ полостяхъ груди, околосердечной сумки и брюшины огромное количество серознаго экзудата. Не взирая на давленіе его, объемъ печени чрезвычайно увеличенъ; цвѣтъ существа ея темно-вишневый; снаружи на выпуклой верхней поверхности четыре утолщенныхъ круглыхъ пятна, бѣлаго перламутоваго цвѣта, каждое величиною въ 10-ти копѣечную монету; средняя ихъ вдавлена внутрь. Въ существѣ печени, на небольшой глубинѣ отъ верхней поверхности, 3 нарыва, каждый величиною въ голубиное яйцо.

При изслѣдованіи головы найдена въ этомъ случаѣ прирожденная разсѣлина между костями черепа, отъ недостаточнаго процесса окостѣнія (*schistosephalus*). Она имѣла звѣздовидную форму, величиною равнялась полтиннику, занимала передніе верхніе углы теменныхъ костей и пропускала сквозь себя твердую мозговую оболочку. Эта послѣдняя, выходя на наружную поверхность черепицы, растпалась по ней въ видѣ грибной шляпки, съ діаметромъ вдвое большимъ, чѣмъ сама разсѣлина. Часть оболочки,

помѣщавшаяся въ ней, сложена была въ складки и наружною поверхностію своею срослась съ краями ея. Равно и въ той части, которая составляла мѣшокъ этой грыжи твердой мозговой оболочки, не было полости отъ взаимнаго сращенія плотно прилежавшихъ другъ къ другу стѣнокъ ея. Наружная поверхность грыжевого мѣшка соединялась слабою клѣтчаткою съ сухожильнымъ покровомъ черепицы, подъ которымъ при наружномъ изслѣдованіи эта врожденная неправильность представлялась опухолью. — Вдоль стрѣлообразнаго шва были еще 3 небольшія разсѣлины, размѣровъ въ 3 копѣечную серебряную монету, лишь заткнутые чуть выдававшиеся въ этихъ мѣстахъ твердою мозговою оболочкою, съ приращеніемъ ея къ краямъ ихъ.

Въ одномъ случаѣ воспаленія печени нарывъ ея существа открылся наружу, съ исходомъ въ выздоровленіе:

Больной, 36 лѣтъ, довольно крѣпкаго тѣлосложенія, поступилъ въ Виленскую Еврейскую больницу съ явственными признаками желтицы. — Изъ разказа его оказывалось, что за три дня до того, послѣ значительныхъ душевныхъ огорченій, онъ почувствовалъ въ правомъ боку сильнѣйшую боль, сопровождавшуюся по временамъ колющемъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ замѣтилъ желтизу кожи на всемъ тѣлѣ; затѣмъ показалась у него несносная головная боль, преимущественно въ лобной части, усталость и лихорадочное состояніе съ гастрическими признаками, что и заставило его искать помощи въ больницѣ. — При изслѣдованіи больного прежде всего поражалъ не нормальный цвѣтъ кожи, слизистыхъ оболочекъ и отдѣленій, преимущественно же мочи, въ которой была замѣтна значительная примѣсь желчи, что обнаруживалось какъ физическими ея признаками, такъ и дѣйствіемъ химическихъ реакцій; испражненія кишечнаго канала представлялись совершенно неокрашенными и бѣловатыми. Печень была увеличена въ объемъ, такъ что край ея выступалъ пальца на три изъ-подъ праваго подреберья; на ощупь она представлялась твердою, поверхность ея бугроватою и чрезвычайно чувствительною при малѣйшемъ дотрогиваніи; движенія больного и притомъ самыя легкія вызывали въ



этомъ органѣ колючія боли; — лихорадочное состояніе было довольно сильно развито; головная боль, тошнота и отсутствіе аппетита составляли постоянныя явленія. Больному еще дома сдѣлано было общее кровопусканіе; въ больницѣ приставлены были къ сторонѣ печени 18 пиявицъ, внутрь назначена сладкая ртуть по два грапа каждыя 2 часа, снаружи втиранія ртутной мази съ блекотнымъ масломъ и теплыя припарки къ сторонѣ печени. Больной имѣлъ ночью нѣсколько испражнений, но еще безцвѣтныхъ; объемъ печени повидимому нѣсколько уменьшился, лихорадочное состояніе и головная боль утихли, но чувствительность печени оставалась въ той же степени; назначено поставить 20-ть банокъ къ сторонѣ печени, продолжать теплыя припарки и втираніе мази, внутрь же прописанъ декоктъ изъ пырея съ нашатыремъ, водною настойкою ревеня и пырейнымъ сиропомъ. При употребленіи этихъ средствъ твердость и боль въ сторонѣ печени нисколько не уменьшились, напротивъ того покровы живота ниже праваго подреберья стали возвышаться и краснѣть, притомъ боль распространилась вверхъ до лопатки той же стороны и внизъ по всему животу. При трех-дневномъ употребленіи теплыхъ припарокъ краснота покрововъ живота и возвышенность ихъ ниже праваго подреберья постепенно усиливалась и наконецъ показалось въ этомъ мѣстѣ явственное зыбленіе нарыва. По совѣщаніи врачей больницы сдѣлано было вскрытіе его тонкимъ троакаромъ, при чемъ вышло значительное количество гноя, смѣшаннаго съ сукровицею и желчью, воющаго запаха; вмѣстѣ съ тѣмъ подреберье, бывшее до того возвышеннымъ, впало, боли значительно уменьшились и движенія больного сдѣлались гораздо свободнѣе. Зондъ, введенный въ рану, погружался въ отвѣсномъ направленіи по крайней мѣрѣ на дюймъ. — Больному были назначены внутрь разрывающій отваръ съ примѣсью ревенной настойки, а снаружи вырѣскиванія изъ настоя ромашки. — При этомъ леченіи онъ съ каждымъ днемъ чувствовалъ себя лучше, объемъ печени постепенно приходитъ къ нормальному, огращеніе кожи пещезало и послѣ заживленія раны, послѣдовавшаго чрезъ мѣсяцъ, больной вышелъ изъ больницы совершенно здоровымъ.

Отъ воспаленія мозга и оболочекъ его со включеніемъ случаевъ размягченія мозгового существа, туберкулезныхъ и другихъ въ немъ отложеній было пользовано въ теченіи года 848 случаевъ, съ смертельнымъ исходомъ въ 270, что равняется содержанію 1:3, 1. Въ этомъ числѣ значительная часть больныхъ доставлялась въ больницы въ исходныхъ періодахъ болѣзней, въ сопорозномъ состояніи, съ потерей движенія, языка и сознанія, когда болѣзненный процессъ уже доходилъ до разрушительнаго вліянія на главнѣйшія отправленія мозговой системы. Къ тому же неблагоприятному теченію какъ воспаленій, такъ и вообще всѣхъ болѣзней мозга до поступленія больныхъ въ больницы нерѣдко содѣйствовали общія привычки простаго народа помогать своимъ недугамъ банею, возвышенною теплою на печахъ и палатахъ и употребленіемъ спиртныхъ напитковъ, именно тѣми потенціями, которыхъ вліяніе особенно вредно при страданіяхъ головного центра нервной системы.

Въ общемъ числѣ случаевъ этой категоріи замѣчательны слѣдующіе:

Больной, отъ роду 14 лѣтъ, сложенія довольно крѣпкаго, поступилъ въ С.-Петербургскую больницу чернорабочихъ 21 Октября 1856 года, съ давнею болью головы и гнойною течею изъ праваго уха, въ которомъ при изслѣдованіи усмотрѣнъ полипъ. Пульсъ больного спокоенъ, но медленнѣе обыкновеннаго, походка не тверда, умственные способности въ хорошемъ состояніи. До 30 Октября сильная повсемѣтная головная боль была постоянна, притомъ часто появлялась тошнота и раза два рвота; зрачки оставались расширенными; пульсъ былъ почти постоянно медленный, испраженія низомъ въ началѣ правильны, въ послѣдніе же дни замедлены; течь изъ уха постепенно увеличивалась. Около 30 Октября боль головы сдѣлалась невыносимою, пульсъ ускорился, явился общая гиперестезія и бредъ; въ такомъ состояніи больной умеръ 31 числа ночью. При вскрытіи черепа найдено слѣдую-



щее: оболочки мозга воспалены, особенно на основаніи, гдѣ на правой сторонѣ замѣтно въ нихъ обильное гнойное отложеніе; существо мозга сильно гиперэмировано; правая доля и ножки мозжечка къ мосту превращены въ нарывы, наполненные густымъ гноемъ; кругомъ этихъ частей признаки спльнаго воспаления; сообщенія нарывовъ мозжечка съ внутреннимъ слуховымъ отверстіемъ не найдено.

Въ одномъ изъ случаевъ воспаления мозга, пользованныхъ въ Витебской Губернской больницѣ, лихорадочныхъ явленій вовсе не было вплоть до смерти; изъ болѣзненныхъ симптомовъ замѣчались только неясность рѣчи, глухота и затрудненное глотаніе, притомъ бредъ, трясеніе рукъ и ногъ, задержаніе мочи и непроизвольное изверженіе низомъ.

При вскрытіи черепа оказалось, что центръ основанія мозга былъ покрытъ сѣровато-бѣлымъ студенистымъ выпотѣніемъ, расположеннымъ отъ пересѣченія оптическихъ нервовъ чрезъ Вароліевъ мостъ вплоть до продолговатаго мозга. Ширина поверхности, имъ покрытой, соответствовала ширинѣ Вароліева моста, толщина выпота была  $1\frac{1}{2}$  линіи. Въ окружности же ни въ оболочкахъ, ни въ существѣ мозга не замѣчалось никакихъ анатомическихъ измѣненій. — Ограниченность и мѣсто выпотѣнія соответствовали паралитическимъ явленіямъ при жизни.

Въ той же больницѣ былъ наблюдаемъ случай обильнаго выпота въ мозговомъ существѣ съ образованіемъ крупознаго продукта:

Больная, 40 лѣтъ отъ роду, о предшествовавшемъ состояніи своего здоровья могла только сообщить, что страдала въ продолженіи двухъ послѣднихъ лѣтъ постоянною болью головы, особенно усилившеюся предъ поступленіемъ ея въ больницу. Правый глазъ у нея былъ скошенъ наружу, но отъ какой причины и съ какого времени она не могла опредѣлить; затѣмъ она ни на что не жаловалась и все отправленія организма ея совершались повидимому правильно. Не смотря на дѣятельное 6-ти педѣльное употребленіе

отвлекающихъ средствъ, головная боль нисколько не облегчалась. 16 Марта, около 6 часовъ вечера, больная, шедши въ коридоръ, послѣ совершенно спокойнаго сна, упала; вскорѣ послѣ того обнаружилась у нея обильная рвота, и до полуночи она еще охала, а потомъ замолкла и перестала отвѣчать на вопросы. 17 Марта въ 10 часу утра состояніе ея было слѣдующее: положеніе горизонтальное на спинѣ, правый глазъ немного открытъ, лѣвый закрытъ, зрачки обоихъ расширены и отъ дѣйствія свѣта не сокращаются, зубы стиснуты, дыханіе рѣдкое, пульсъ медленный, не болѣе 40 ударовъ въ минуту, отдѣленіе почекъ и кишекъ задержаны съ полуночи; конечности, будучи подняты вверхъ, падаютъ по тяжести; температура тѣла во всѣхъ частяхъ нормальна; сознание совершенно потеряно. Въ 5 часовъ вечера состояніе больной то же, только языкъ высунуть и стиснуть между зубами, отъ чего показывается изо рту слюна съ кровью, дыханіе хриплое; изверженія мочи и на низъ задержаны; лихорадочныхъ признаковъ нѣтъ. Нѣсколько позднѣе явился у больной судороги, продолжавшіяся 2 часа; въ продолженіи ихъ она вновь стояла. На слѣдующій день утромъ больная оставалась въ томъ же безсознательномъ положеніи и лежала неподвижно вытянувшись; притомъ, чтобы сгибать конечности ея, нужно было употребить нѣкоторую силу, послѣ чего онѣ опять принимали вытянутое положеніе. Около полудня того же дня она умерла.

Вскрытіе тѣла ея обнаружило слѣдующее: твердая мозговая оболочка найдена неизмѣненною; но при отдѣленіи ея отъ поверхности мозга вытекала серозная жидкость въ обильномъ количествѣ, особенно изъ того мѣста въ передней части лѣваго полушарія, гдѣ плотнѣе было приращеніе ея къ мозгу. По совершенномъ ея отдѣленіи въ передней части лѣваго полушарія представилось глазамъ продолговатое тѣло, отличавшееся физическими признаками отъ прочаго существа мозга; оно лежало почти свободно и довольно легко отдѣлялось. Это былъ крупозный экссудатъ, очертанія трехгранной призмы, съ довольно ясно обозначенными углами, — длиною въ одинъ вершокъ, шириною въ  $\frac{3}{4}$ , вышиною въ  $\frac{1}{2}$  вершка,



Положеніе его было вдоль самаго края дольной мозговой разсѣлины, при чемъ одна сторона его обращена была къ ней самой, а другая внизъ, гдѣ она составляла крышку скрытой подъ нею полости; третья же сторона обращена была вверхъ къ твердой мозговой оболочкѣ и съ нею склеивалась. Съ существомъ мозга эксудатъ соединялся только сзади; плотность его была незначительна, такъ что онъ легко разрывался, въ разрѣзѣ же представлялъ однородную массу, замѣтно волокнистаго устройства. По отдѣленіи этого крупознаго выпота открылась полость, величиною въ гусиное яйцо, — направлявшаяся въ переднюю часть полушарія и наполненная серозною жидкостію. Сверху она закрывалась вышеописаннымъ выпотомъ, а основаніемъ ея служилъ тонкій слой мозгового существа надъ лѣвымъ боковымъ желудочкомъ. При дальнѣйшемъ изслѣдованіи открылось, что у внутренней стѣнки этой огромной полости находилось отверстіе, которое вело въ лѣвый боковой желудочекъ. Она имѣла продолговатую форму и внутри была выстлана особенною гладкою перепонкою; мозговое существо въ ближайшей окружности ея было размягчено, перепонка же, выстилавшая полость, была такъ слабо соединена съ мозгомъ, что отдѣлялась отъ него безъ пособія инструмента. Въ боковыхъ желудочкахъ заключалось большое скопленіе серозной жидкости. Самое существо мозга было малокровно. Легкія были сильно гиперемированы, кишки, особенно толстыя, содержали твердые испражненія, мочевой пузырь былъ сильно растянутъ мочею.

Слѣдующее наблюденіе, принадлежащее Верроской больницѣ, замѣчательно также по медленности теченія болѣзни и усложненію ея признаками угнетенія умственныхъ способностей:

Больной, 26 лѣтъ, слабаго тѣлосложенія, сданъ былъ въ больницу по подозрѣнію въ психическомъ разстройствѣ. Зрачки его были сильно расширены; пульсъ особенно медленъ. Обыкновенно онъ сидѣлъ или лежалъ спокойно на кровати, не говорилъ ни слова съ окружающими, весьма рѣдко отвѣчалъ на вопросы и не требовалъ ни пищи, ни питья, но когда ему подавали, то поглощалъ то

или другое съ звѣрскою жадностію. Ночью, когда всѣ кругомъ его спали, онъ обыкновенно бродилъ по комнатамъ и нѣсколько разъ покушался уйти. Болѣзнь была признана за хроническое страданіе мозга; предсказаніе исхода было неблагопріятно.

Снаружи было повторительно дѣлано раздраженіе парвнымъ пластыремъ на затылкѣ и обритомъ тѣмени; сверхъ того на затылкѣ же была сдѣлана заволочка. Внутри назначались рвотный камень въ большихъ и малыхъ приемахъ, наперсточная трава, какъ равно и другія средства, но они не приносили никакого облегченія.

На третьей недѣлѣ пребыванія больного въ больницѣ случайно замѣтили, что онъ потерялъ зрѣніе на лѣвомъ глазу, чрезъ нѣсколько дней то же послѣдовало и съ правымъ; затѣмъ отнялся у него языкъ, а въ концѣ 4-ой недѣли послѣдовала смерть.

При вскрытіи тѣла оказались слѣдующія явленія: твердая оболочка мозга мѣстами значительно утолщена и во многихъ отдѣльныхъ точкахъ плотно срослась съ черепицею. Существо мозга темнѣе обыкновеннаго, мѣстами цвѣта сѣраго и синеватаго; сосуды его растянуты темною кровью; корковое вещество, а еще болѣе лежація подъ нимъ части мозга размягчены до такой степени, что большая часть мозговыхъ извилинъ и углубленій между ними совершенно слились вмѣстѣ и исчезли. Правый желудочекъ наполненъ желтоватою студенистою массою; особенно въ значительномъ количествѣ лежитъ она на основаніи мозга и покрываетъ зрительные нервы. Мозжечекъ также сѣроватаго цвѣта, но не размягченъ.

Въ органахъ груди и живота ничего замѣчательнаго не найдено.

Въ Новоархангельской больницѣ Россійскихъ Колоній въ Америкѣ былъ также наблюдаемъ случай размягченія мозга, обнаружившійся при жизни слѣпотою на оба глаза и сверхъ того частыми эпилептическими припадками. При вскрытіи оказалось, что размягченіе занимало обѣ переднія доли мозга, прозрачную преграду и боковые желудочки. Вмѣстѣ съ тѣмъ было сращеніе твердой мозговой оболочки съ паутинною и увеличенная толщина первой на всемъ пространствѣ размягченія.



Сильную степень размягченія мозга, какъ исхода воспаления его, представляетъ слѣдующее наблюдение, принадлежащее Житомирской больницѣ:

Больной, 24 лѣтъ отъ роду, былъ болѣвъ дома двѣ недѣли безъ всякаго пользованія и доставленъ въ больницу людьми, не знавшими никакихъ подробностей о причинахъ его болѣзни, безъ сознанія, въ пзступленномъ бреду; зрачки его расширены, лицо красно, движенія нижнихъ конечностей замедлены, въ рукахъ же постоянное размахиваніе; пульсъ сильно ускоренъ. Два приѣма по одной каплѣ кротонава масла и цѣлый скрупулъ сладкой ртутн произвели одно пзверженіе пизомъ и то чрезъ сутки. — Съ тѣхъ поръ мозговые припадки въ теченіи 14 дней лишь дѣлались адинамическими; сопорозное состояніе и онѣмѣніе всего тѣла возрастали, отдѣленіе кишечнаго канала было замедлено, не смотря на употребленіе проносныхъ средствъ, моча отдѣлялась безъ сознанія больного. Въ это время ему назначались растиранія всего тѣла, дѹши на голову въ теплой ваннѣ, пивки къ ноздрямъ, втиранія ртутной мази въ шею, камфора съ опиѣмъ и соляная кислота, но безъ всякаго успѣха. При продолженіи явленій воспаления мозга больной умеръ въ коматозномъ состояніи.

Вскрытіе трупа обнаружило сплошное гидроцефалическое размягченіе мозговаго вещества; мозгъ былъ до того размягченъ, что при горизонтальномъ положеніи тѣла по отдѣленіи черепницы твердая оболочка, слѣдуя давленію его, свѣшивалась внизъ, какъ пузырь, наполненный жидкимъ содержимымъ. По отдѣленіи оболочки, мозговая мякоть на подобіе подогрѣтаго сала, или полужидкаго меда, стекала внизъ изъ черепной полости. Между пальцами она совершенно легко растиралась, различіе существъ было совершенно потеряно. Незамѣтно было и церебральной влаги въ спавшихся мозговыхъ желудочкахъ, но между серозными мозговыми оболочками въ большомъ количествѣ содержался мутный эксудатъ. Мозговые пазухи, въ особенности Герофилова, были наполнены свѣшнейся темною кровью; пахіоновы железы, величиной въ крупный горохъ, покрытыя бѣловиннымъ эксудатомъ, лежали

возлѣ вышениковъ, также наполненныхъ сѣвшеюся кровью. Въ полости околосердечной сумки довольно много вязкой зеленоватой жидкости, сама сумка утолщена, серозная оболочка ея молочно-бѣлаго цвѣта, сосуды сердца переполнены кровью. Печень увеличена въ объемѣ, цвѣту фіолетовокраснаго, и сильно гиперэмпирована. Кишки въ анэмическомъ состояніи.

Въ наблюдениі, принадлежащемъ Тверской больницѣ, ограниченное размягченіе мозгового существа сопровождалось гангренознымъ помертвѣніемъ парализованныхъ частей тѣла:

Больная, тѣлосложенія довольно крѣпкаго, поступила въ больницу 11 Декабря 1855 года въ слѣдующемъ состояніи: глаза ея инъецированы, лицо красное, губы синеваты, жиловѣніе сильное и твердое, сознание потеряно, дыханіе трудное и хрипучее, зрачки разширены, вся правая сторона тѣла парализована, изверженія мочи и низомъ не произвольны. Не смотря на повторенныя мѣстныя и общія кровопусканія, отвлекающія и разнородныя наружныя и внутреннія средства, больная въ продолженіи 5 дней находилась въ одинаковомъ состояніи и хотя наконецъ начала понемногу сознать окружающіе предметы и понимать вопросы, но отвѣчать на нихъ не могла по параличному состоянію языка. Спустя нѣсколько дней она снова впала въ безсознательное состояніе, причемъ постоянно издавала болѣзненные стоны и часто хваталась лѣвою рукою за голову. Назначены охлаждающія и успокоивающія средства, на голову же мушка. На 12 день отъ прибытія больной въ больницу, на пальцахъ и половинѣ ступни правой нижней конечности ея, пораженной параличемъ, обнаружился антоновъ огонь, быстро распространявшійся въ глубину, такъ что чрезъ нѣсколько дней кости пальцевъ и ступни обнажились и отпали. Больной назначались внутрь кислоты въ слизистыхъ отварахъ, а снаружи ароматныя и тоническія средства; но гангренозное размягченіе не останавливалось. Общее состояніе больной дѣлалось съ каждымъ днемъ хуже отъ истощенія; постоянно лежала она безъ всякаго движенія, но на боль не жаловалась; на-



конецъ начало у нея замѣтно ослабѣвать и совершенно отнялось зрѣніе и чрезъ нѣсколько дней послѣдовала смерть при явленіяхъ нѣмніи. Вскрытіе обнаружило слѣдующее: трупная окоченелость незначительна, истощеніе всего тѣла въ высшей степени. Твердая мозговая оболочка матоваго тусклаго цвѣта; сосуды мозга безкровны. Поверхность его въ сильно отѣчномъ состояніи; углубленій между извилинами почти не замѣтно; существо большого лѣваго полушарія на довольно значительномъ пространствѣ уплотнено и цвѣта желтоватаго; при разрѣзѣ этого мѣста въ мозговой мякоти около полосатыхъ тѣлъ открылась полость, величиною въ голубиное яйцо, со стѣнками неровными, какъ-бы изъязвленными и затвердѣвшими; она была наполнена существомъ мозга размяченнымъ въ полужидкую водянистогнойную массу желтозеленоватаго цвѣта. Въ прочихъ органахъ, кромѣ малокровія, ничего особеннаго не найдено. Желудокъ и кишки чрезвычайно сжаты и на слизистой оболочкѣ ихъ слѣды катарральнаго состоянія.


Въ Таращанской больницѣ Кіевской губерніи былъ пользованъ больной, поступившій, безъ анамнестическихъ данныхъ, съ совершеннымъ общимъ параличемъ нижнихъ и верхнихъ конечностей, всѣхъ органовъ чувствъ и кишечнаго канала и общею анестезіею на всемъ протяженіи кожи. Ни одной части тѣла онъ не могъ привести въ произвольное движеніе. Въ теченіи болѣзни его при таковыхъ признакахъ на поверхности тѣла въ разныхъ мѣстахъ начали обнаруживаться обширныя гангренозныя язвы, особенно на спинѣ, колѣняхъ и мошонкѣ; цѣлыми кусками отваливались помертвѣвшія массы, обнажая кости и составы; — наконецъ прямая кишка, выпавшая отъ паралича сфинктера, помертвѣла и обратилась въ гангренозную язву.

Между случаями болѣзни спиннаго мозга чаще другихъ видовъ встрѣчался раздраженіе и воспаленіе его покрововъ и существа, съ исходомъ послѣдняго въ размягченіе. Воспаленіе оболочекъ было по большей части

ревматическаго свойства; оно обыкновенно сопровождалось значительнымъ лихорадочнымъ состояніемъ, сильною болью спины, тоническими конвульсіями конечностей, особенно въ сгибающихся мышцахъ и эксцентрическими болями туловища и членовъ. Отправленія черепнаго мозга оставались при томъ нормальными. Лечение таковыхъ случаевъ обыкновенно ограничивалось употребленіемъ отвлекающихъ и противувоспалительныхъ средствъ, въ числѣ которыхъ кровопусканія, сладкая ртуть и втиранія ртутной мази вдоль спины занимали главное мѣсто. Въ С.-Петербургской больницѣ чернорабочихъ притомъ съ успѣхомъ употреблялось завертываніе больныхъ въ мокрыя холодныя простыни.

Случаи воспаления мякоти спиннаго мозга встрѣчались гораздо рѣже; при нихъ, кромѣ большей части вышеисчисленныхъ явленій, обнаруживалось въ различной степени паралитическое состояніе конечностей и мышечныхъ тканей кишечнаго канала и органовъ мочевой и половой системы. Начиная отъ гипереміи и застоя крови, вслѣдствіе прекращенія привычныхъ и физиологическихъ отдѣленій, до отложенія туберкуловъ при общемъ туберкулѣзномъ худосочіи, причины воспаления спиннаго мозга были различны. Ими опредѣлялись какъ методы леченія, такъ и возможность успѣха его. — По различію мѣста воспаления мозга рефлективные и паралитическія явленія обнаруживались въ различныхъ органахъ и частяхъ тѣла.

Въ одномъ изъ наблюдений этой категоріи, принадлежащемъ Пензенской больницѣ, при воспаленіи спиннаго мозга у больного въ видѣ частыхъ періодическихъ приступовъ являлось судорожное сокращеніе діафрагмы, при чемъ съ особеннымъ напряженіемъ выталкивались изъ груди звуки, похожіе на отдаленный собачій лай. Отвѣченія къ сторонѣ діафрагмы, при употребленіи соотвѣ-





ственныхъ внутреннихъ средствъ, и въ числѣ ихъ внемута съ морфіемъ, скоро прекратили болѣзнь. — Въ другомъ случаѣ воспаленіе существа спиннаго мозга сопровождалось сильнѣйшею болью во всей спинѣ, полупаралитическимъ состояніемъ верхнихъ конечностей и мочевого пузыря, съ частымъ изверженіемъ семени. Приставленія пиявицъ, 24 банокъ и инанской мушки вдоль спины, современно съ внутреннимъ употребленіемъ сначала сладкой ртути по 2 грана чрезъ 2 часа, а потомъ фосфорной кислоты съ водою — было достаточно для возстановленія больного. Наблюденіе, принадлежащее С.-Петербургской больницѣ чернорабочихъ замѣчательно въ практическомъ отношеніи:

Больной поступилъ съ полною параплегією движенія при ослабленной чувствительности нижнихъ конечностей; по временамъ являлись въ нихъ судорожныя сокращенія, скоро впрочемъ проходившія; отправления сфинктеровъ были нормальны; въ поясничныхъ позвонкахъ замѣчалась опухоль и при давленіи легкая, но постоянная, боль. Питаніе организма оставалось правильнымъ. Въ продолженіи 6 мѣсячнаго пользованія болѣзнь не уступала никакимъ средствамъ; въ числѣ ихъ чилбуха, хина, электромагнетизмъ, ванны изъ экстракта сосновыхъ иглъ упорно употреблялись безъ всякой пользы. Больной былъ наконецъ оставленъ вовсе безъ внутреннихъ пособій, при однихъ втираніяхъ въ ноги и поясницу настойки еловыхъ шишекъ. Вдругъ безъ видимой причины начало съ каждымъ днемъ возстановляться движеніе въ его конечностяхъ, боль въ позвонкахъ совершенно исчезла и въ теченіи мѣсяца совершенно возстановилось здоровье больного.

Бугорчатое воспаленіе въ спинномъ мозгу постоянно сопровождалось признаками общаго худосочія и нерѣдко отложеніемъ бугорковъ въ костяномъ существѣ позвоночныхъ тѣлъ.

Къ рубрикѣ воспаленія венъ, съ развитіемъ піэми-

ческихъ явленій отъ всосанія гноя, долженъ быть отнесенъ слѣдующій случай:

Больной, призрѣвавшійся въ Житомирской богадѣльнѣ, 55 лѣтъ отъ роду, имѣлъ многолѣтніе явственные завалы печени и селезенки, а также опухоль брыжеечныхъ железъ съ истощеніемъ тѣла и накопленіемъ водяной жидкости въ полости живота и въ клѣтчаткѣ нижнихъ конечностей. 19 Ноября совершенно неожиданно обнаружилась у него лихорадка; особенно сильный, внезапно наступавшій, ознобъ продолжался часовъ по пяти и возвращался въ неопредѣленное время, смѣняясь каждый разъ жаромъ. Кожа больного сдѣлалась грязно-желтого цвѣта, оставшагося и по смерти, притомъ была суха и горяча. Въ началѣ, во время перваго свободнаго промежутка, былъ употребленъ сѣрноиселый хининъ съ вонючею камедью, но безъ пользы; лихорадочные приступы также были сильны и возвращались въ неопредѣленное время; скоро за тѣмъ развилась бредъ, безпокойство, заставлявшее больного метаться по кровати, и совершенный упадокъ силъ, съ переходомъ въ тифозныя явленія. Отдѣленія кишечнаго канала вытекали безъ сознанія больного; пульсъ его былъ частъ, мягокъ и неровенъ; на соединительной оболочкѣ глазъ появилось отдѣленіе гноя, а на роговой — язвы. Болѣзнь до смертельнаго исхода длилась 17 дней.

Вскрытіе трупа показало источникъ піэміи, тамъ, гдѣ при жизни его вовсе не подозрѣвали; это былъ нарывъ предстательной железы, вскрывшійся между мочевымъ пузыремъ и прямою кишкою. Венозное сплетеніе шейки мочевого пузыря было проводникомъ гнойнаго зараженія. Корешки воротной вены были наполнены кровью съ примѣсью гноя, вѣтви и стволъ ея комками фибринозныхъ сѣдовъ и гнойной жидкости. Печень увеличена въ объемѣ желто-бураго цвѣта, тѣстообразно мягка и переполнена жидкою кровью печенятаго цвѣта; серозный покровъ ея утолщенъ и тусклъ. Селезенка гипертрофирована, плотна, ломка, тверда и почти безкровна. Почки блѣдны, въ сильномъ перерожденіи, съ потерей контуровъ Мальпигіевыхъ тѣлъ и безъ различія трубчатого отъ



коркового вещества; капсулы ихъ уплотнены и покрыты комками жира; почечныя чашки обширныя и ожирѣлыя. Мочевой пузырь пустъ и съ нарывомъ не сообщается. Кишечный каналъ крайне сжатъ и вымоченъ водяною, мутною, бѣловатою съ клочками жидкостью, наполнявшею полость живота; въ толстыхъ кишкахъ малое количество нечистотъ. Легкія вялы, наполнены темными пятнами пигмента и мѣстами содержатъ переносимыя гнойныя отложенія.

Въ одномъ случаѣ, встрѣтившемся въ Нижегородской больницѣ, было наблюдаемо ограниченное воспаленіе мышечнаго существа сердца, увеличеннаго притомъ въ объемѣ. Въ утолщенной стѣнкѣ лѣваго желудочка, около начала Аорты, лежалъ нарывъ, въ лѣсной орѣхъ величиною, сообщавшійся съ полостію послѣдней.

---

Въ общемъ числѣ катарровъ около  $\frac{2}{3}$  принадлежатъ катарру желудка и кишекъ (9730:15,017), съ смертію 1:8. Такое невыгодное содержаніе смертности объясняется тѣмъ, что въ эту рубрику помѣщены различныя виды хроническихъ поносовъ, отъ изъязвленій кишечнаго канала, какъ послѣдствій горячечныхъ болѣзней. Хотя поносъ не былъ въ оныхъ самостоятелною болѣзнію, а лишь припадкомъ другихъ болѣзненныхъ состояній, но какъ, при поступленіи таковыхъ больныхъ въ больницы, предшествовавшія болѣзни или прекратились, или, если еще продолжались, то имѣли главнымъ припадкомъ поносъ, то всѣ подобныя случаи, отдѣльно отъ первичныхъ болѣзней, помѣщены подъ общимъ названіемъ кишечнаго катарра. Поносы были исходами долго продолжавшихся перемежающихся лихорадокъ, брюшнаго тифа, скорбута и общей водянки. Одержимые ими больные имѣли блѣдный, лейкофлегматическій видъ, большую жажду, иногда слезы покры-

тый, чаще красноватый, гладкий, или совершенно сухой и на поверхности растрескавшийся языкъ; аппетитъ то ненасытный, то умѣренный, а иногда совершенно угнѣтенный; кашель болѣе или менѣе сильный, иногда съ признаками образованія кавернъ въ одномъ или другомъ легкомъ; полный, надутый, а иногда спавшійся животъ, нерѣдко съ накопленіемъ значительнаго количества эксудата, и частыя испраженія на нпзъ. Эти послѣднія состояли или изъ кишечной слизи, окрашенной желчью, иногда изъ жидкости серозной, мутной, смѣшанной съ остатками непереваренной пищи, или зеленоватою и кровью окрашенной, постоянно съ запахомъ особенно сильнымъ. Количество ихъ было различно: въ нѣкоторыхъ случаяхъ было не болѣе 5—6 испраженій въ сутки, но больные притомъ чрезвычайно ослабѣвали; въ другихъ число ихъ доходило до 15—20, съ тѣмъ вмѣстѣ количество изверженій уменьшалось; minimum его представляли одни безплодные позывы на нпзъ. Въ меньшей степени болѣзни больные могли еще вставать и удовлетворять таковымъ, но вскорѣ силы ихъ упадали, изверженія дѣлались непроизвольными, иногда безъ сознанія больного; задній проходъ, будучи парализованъ, оставался открытымъ. Истощеніе больныхъ, какъ отъ предшествовавшихъ болѣзней, такъ и отъ поноса быстро усиливалось и доходило до послѣдней крайности. Нерѣдко являлись пролежни на крестцѣ, плечахъ и на всѣхъ мѣстахъ, выдерживавшихъ тяжесть тѣла при лежачемъ положеніи; они переходили въ гангрену и омертвѣніе, увеличивавшія какъ страданія больныхъ, такъ смрадъ и зловоніе въ палатахъ.

При вскрытіяхъ умершихъ отъ таковыхъ поносовъ, постоянно находили значительныя поврежденія на слизистой оболочкѣ кишечнаго канала. Вслѣдствіе длительнаго, часто повторявшагося и наконецъ только при общемъ



истощеніи исчезавшаго катаррального состоянія, она представлялась то сѣроватаго, то темно-сѣраго, или бураго и шифернаго цвѣта, расположеннаго въ видѣ точекъ, пятенъ и полосъ; при томъ иногда на всемъ протяженіи своемъ кишки были совершенно анэмическими и ослизлыми. Въ нижней части подвздошной кишки, особенно послѣ тифа, встрѣчались болѣе или менѣе значительныя изъязвленія, проникавшія иногда чрезъ всю толщю стѣнокъ до серозной оболочки, которая въ рѣдкихъ случаяхъ ими прободалась. Размѣры язвъ, особенно вблизи Баугиневой заслонки, были значительны; иногда вся внутренняя поверхность кишечнаго калибра этого мѣста, заслонка и часть начала толстыхъ кишекъ были обращены въ одну сплошную язву. Въ послѣднихъ чаще встрѣчались фолликулярныя язвы, небольшого размѣра, величиною въ гривенникъ и болѣе, съ возвышенными, неровными, отвердѣвшими краями, бурымъ, желтоватымъ, иногда какъ-бы фунгознымъ дномъ, на которомъ возвышались грибовидные наросты. Въ окружности язвъ слизистая оболочка была красна, набухла и размягчена; вообще число язвъ было обыкновенно значительно, мышечная ткань толстыхъ кишекъ подъ ними гипертрофирована, подсерозная клѣтчатка утолщена отъ инфильтраціи; стѣнки кишекъ вслѣдствіе того получали видъ значительной гипертрофіи. Печень обыкновенно въ состояніи анэміи, послѣдовательной атрофіи и отвердѣнія; селезенка почти всегда увеличена, иногда тверда, иногда размягчена. Почки безкровны, но ткань ихъ тверже обыкновеннаго. Въ брюшной полости болѣе или менѣе значительное накопленіе серозной жидкости.

Таковыя состоянія допускали лишь симптоматическое пользованіе; должно было по возможности уничтожать остатки раздраженія кишекъ, упадку силъ противудѣйствовать легкою и питательною пищею, преслѣдо-

вать продолжающуюся лихорадку употребленіемъ хинина и облегчать поносъ, или по крайней мѣрѣ замедлять его разрушительное вліяніе на организмъ. Средства, употреблявшіяся въ этихъ, случаяхъ были: *танинъ*, въ приѣмахъ отъ 2—3 гранъ на приѣмъ съ *опіемъ*, *уксусокислый свинецъ*, *селитрокислое серебро въ растворъ*, — но больные не всегда могли переносить его; — *квасцы*, *вытяжка ратанги*, *корень бараньей травы*, *катеху* и т. д. Нерѣдко послѣ того или иного средства поносъ усиливался, тогда слѣдовало его замѣнять другимъ. — Быстрое остановленіе поноса иногда причиняло чувство тяжести въ животѣ и раздутіе его. — Лучше всѣхъ средствъ дѣйствовали селитрокислое серебро и свинецъ. Кlistиры изъ перваго съ опіемъ и свинцомъ были часто употребляемы въ случаяхъ, гдѣ параличъ задняго прохода не препятствовалъ дѣйствию ихъ. — Снаружи на животъ ставили банки, накладывали теплыя припарки и горчичники; выздѣлывающихъ, — ихъ было немного, немедленно отдѣляли отъ прочихъ больныхъ, стараясь истощенныя силы ихъ подкрѣплять хорошею пищею, употребленіемъ вина и сбереженіемъ отъ возврата болѣзни. Возстановленіе силъ шло всегда и повсюду весьма медленно.

---

Въ числѣ случаевъ паралитическаго состоянія органовъ чувствъ замѣчательны слѣдующіе:

*Мышечный параличъ языка отъ давленія опухшихъ железъ на первыя вѣтви его; исходъ въ выздоровленіе.*

Больной 35 лѣтъ отъ роду, пользовавшійся постоянно хорошимъ здоровьемъ, поступилъ въ началѣ Іюля 1856 года въ Виленскую Еврейскую больницу съ явленіями тифозной горячки,



которая при тщательномъ леченіи разрѣшилась благополучно, такъ что въ послѣднихъ числахъ того же мѣсяца больной былъ выписанъ въ удовлетворительномъ состояніи здоровья. Спустя нѣсколько дней онъ вторично привезенъ въ больницу въ слѣдующемъ состояніи: при общемъ истощеніи отъ предшествовавшей тяжелой болѣзни цвѣтъ лица грязно-желтый, уклоненій въ симметріи обѣихъ сторонъ лица незамѣтно, чувствительность во всѣхъ точкахъ его нормальна; движенія личныхъ мускуловъ правильны; по на предлагаемые вопросы больной не отвѣчаетъ, произнося одни невнятные звуки; при осмотрѣ полости рта оказалось, что языкъ его, прилегая ко дну этой полости, имѣлъ плоскую форму, которой больной не былъ въ состояніи измѣнить, равно какъ и привести этотъ органъ въ движеніе. Чувствительность его впрочемъ не была измѣнена и при уколахъ больной чувствовалъ боль; ощущенія вкуса также не представляли уклоненій отъ нормы, непосредственно по прикосновенію къ языку веществъ противнаго вкуса можно было видѣть въ лицѣ больного непріятное впечатлѣніе. Открываніе рта сопровождалось болью, преимущественно около угловъ нижней челюсти; шейныя, подчелюстныя и околоушныя железы были нѣсколько увеличены въ объемъ и при изслѣдованіи чувствительны; вслѣдствіе того глотаніе больного было нѣсколько затруднено. Чувствительность и движеніе прочихъ частей тѣла, а равно зрѣніе, слухъ и обоняніе въ нормальномъ состояніи, умственные способности также не представляли никакихъ уклоненій: больной понималъ предлагаемые ему вопросы и сознательно отвѣчалъ на оныя тѣлодвиженіями. При вышеописанныхъ явленіяхъ замѣчалось незначительное лихорадочное состояніе: пульсъ былъ ускоренъ, твердоватъ, испражненія на низъ задержаны.

Болѣзнь признана мышечнымъ параличемъ языка, развившимся отъ давленія увеличенныхъ въ объемъ железъ на нервныя вѣтви, управляющія двигательными мышцами этого органа. 1 Августа сдѣлано больному общее кровопусканіе въ 6 унцевъ крови и представлено 12 піявицъ около подъязычной кости; внутрь назначена сладкая ртуть по 2 грана на пріемъ, чрезъ каждые два часа и

снаружи втираніе ртутной же мази; больной въ теченіи сутокъ принялъ 12 гранъ сладкой ртути; на слѣдующій день кромѣ значительнаго облегченія въ глотаніи никакихъ переменъ не замѣчено. Внутри назначенъ растворъ сѣрнокислой магнезін (одинъ унцъ) въ отварѣ тамариндовъ (одного унца на 6 унцовъ воды) съ маннымъ сиропомъ (одинъ унцъ), чрезъ каждые 2 часа по столовой ложкѣ; это средство больной принималъ въ теченіи 2 слѣдующихъ дней, и въ этомъ промежуткѣ времени железы уменьшились въ объемѣ, пульсъ сдѣлался нормальнымъ, выговоръ больного сталъ яснѣе, онъ хотя изрѣдка могъ произносить слова, но движенія языка еще оставались затрудненными. 4 Августа назначенъ больному настой бараньей травы (изъ 2 драхмъ на 6 унцовъ) чрезъ 2 часа по столовой ложкѣ. Это средство было продолжаемо въ теченіи трехъ слѣдующихъ сутокъ съ замѣтнымъ ежедневнымъ улучшеніемъ, наконецъ 7 Августа къ этому средству присоединено внутреннее употребленіе спиртной вытяжки чилибухи, по  $\frac{1}{4}$  грана на пріемъ 4 раза въ день; при четырехъ дневномъ употребленіи этого послѣдняго средства движенія языка больного стали постепенно свободнѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ рѣчь и выговоръ словъ нормальнѣе.

*Совершенный амаурозъ при гипереміи ретины съ образованіемъ варикозныхъ разширеній венъ на соединительной оболочкѣ глаза;—употребленіе прижиганій азотокислымъ серебромъ;—совершенное излеченіе.*

Больная, 16 лѣтъ отъ роду, поступила въ Житомирскую больницу 30 Іюля совершенно слѣпою, послѣ годоваго страданія глазами. Слепота обнаружилась еще за 4 недѣли до поступленія. Больная худощава; грудныя железы у нея еще не вполне развиты, періодическое очищеніе показалось въ 3 послѣдніе мѣсяца. Глаза она держитъ постоянно закрытыми, съ плотно сжатыми вѣками и сверхъ того прикрываетъ ихъ руками; къ такому положенію ее исключительно побуждаетъ нестерпимая боль. Глазныя яблоки по



наружному виду совершенно здоровы, на ощупь тверже обыкновеннаго, при прикосновеніи на ограниченномъ пространствѣ весьма чувствительны, но при общемъ, даже крѣпкомъ, давленіи боль въ нихъ сносима. По соединительной оболочкѣ какъ вѣкъ, такъ и глазныхъ яблоковъ видны въ разбросъ небольшія варикозныя разширенія венъ. Зрачекъ сжатъ, неподвиженъ, глазная глубина чернаго цвѣта, съ отливомъ нѣсколько мутнымъ. Боль головы весьма сильная; пульсъ нормальный; органическія отправления правильны, только послѣдняго періодическаго очищенія у больной не было. Развитію слѣпоты предшествовали свѣтобоязнь и тупая боль въ глазахъ; а за 5 недѣль до поступленія больной въ больницу была у нея сильная боль головы и подъ ложечкой. Больной съ самаго начала было сдѣлано кровопусканіе въ 10 унцевъ и за каждое ухо поставлено по 12 пиявицъ; внутрь данъ одинъ приемъ сладкой ртути въ 3 гранъ; сверхъ того назначены втиранія изъ меркуріальной мази съ вытяжкою красавицы въ лобъ и виски по два раза въ день, а на ночь полуванны съ солью, золой и горчицей.

31 Іюля. Складка соединительной оболочки между вѣками и твердою оболочкой образуетъ красный кругъ; въ глазахъ больной представляется желтый цвѣтъ. Сладкая ртуть по 2 грана каждые 2 часа, остальные средства тѣ же. — 1 Августа головная боль меньше, но боль въ переносѣ сильнѣе; приставлены двѣ пиявицы къ поздырямъ; внутрь назначенъ растворъ сѣрноукислой соды; наружныя средства тѣ же. —

2 Августа слабительное оставлено; къ наружнымъ половымъ органамъ приставлено 6 пиявицъ. — 3 и 4 Августа утромъ сильнѣйшая глазная боль, уменьшающаяся по полудни; вѣки постоянно закрыты. Чувство полноты въ подвздошной сторонѣ и боль спины, пульсъ полный и твердый. Кровопусканіе изъ ноги въ 6 унцовъ, за ушами поставлены мушки, внутрь прописана Senega въ порошокъ по 10 гранъ, каждые  $1\frac{1}{2}$  часа. Слѣдующіе дни по утрамъ замѣчалось усиленіе болей въ глазахъ, съ послабленіемъ по полудни, а потому назначенъ внутрь хининъ по 6 гранъ чрезъ каждые 5 часовъ, съ вытяжкою белладоны (по  $\frac{1}{4}$  грана) и цикуты

(по 2 грана) и порошкомъ корня сенегги (по 10 гранъ). Водяная влага въ передней камерѣ глаза, особенно въ нижней половинѣ, представляется полупрозрачною, какъ бы отъ присутствія какой-то примѣси. — На плечи больной поставлены фонтанели, на затылкѣ сдѣлано раздраженіе каленымъ желѣзомъ и потомъ замѣнено двумя заволоками. Къ 14 Августа боль въ глазахъ уменьшилась, а въ головѣ совершенно прекратилась; хининъ еще продолжается. Красноватое кольцо соединительной оболочки между вѣками и твердою оболочкою, изъ блѣдно-розовыхъ просовидныхъ шариковъ, помазано кускомъ азотокислаго серебра. — 17 Августа. Боли въ глазахъ совершенно прошли, но зрѣніе не возвращается; прижиганіе разширенныхъ сосудовъ принесло больной большее облегченіе и потому повторено; внутрь назначена вытяжка аконита по  $\frac{1}{4}$  грана чрезъ 3 часа, попеременно съ малыми приемами рвотнаго камня. При продолженіи прижиганій чрезъ каждые 4 дня, нагноеній заволокъ и фонтанелей, совместно съ внутреннимъ употребленіемъ сперва аконита, а потомъ вытяжки цыкуты (по одному грану чрезъ два часа) и рвотнаго камня всѣ страданія больной миновались и 30 Августа она въ первый разъ начала отличать очеркъ оконъ въ палатѣ и даже переплеть ихъ, въ видѣ туманныхъ полосъ. Съ 1 по 3 Сентября она принимала исключительно рвотный камень въ малыхъ приемахъ; 2 Сентября вся соединительная оболочка, по которой еще держались варикозные шарки, была вымазана азотокислымъ серебромъ; опухоль вѣкъ послѣ того разрѣшалась продолжительными обливаніями и свинцовымъ сахаромъ. Съ этихъ поръ ежедневное улучшеніе зрѣнія шло быстро, такъ что 19 Сентября больная, чрезъ 50 сутокъ по поступленіи, оставила больницу, совершенно исцѣлившись отъ слѣпоты своей.

*Потеря зрѣнія и движенія конечностей отъ испуга; —  
исходъ въ выздоровленіе.*

Женщина, лѣтъ 20 отъ роду, довольно слабаго тѣлосложенія, недѣли за двѣ до поступленія въ больницу отъ сильного нечаян-



наго испуга упала въ обморокъ и вмѣстѣ съ тѣмъ вдругъ лишилась зрѣнія до такой степени, что перестала даже различать свѣтъ отъ темноты. При этомъ движеніе въ конечностяхъ ея парализировалось до того, что она съ трудомъ могла удерживаться на ногахъ, а пальцами рукъ вовсе не могла владѣть. Пробывъ въ такомъ положеніи двѣ недѣли, Декабря 5 больная поступила въ Ярославскую больницу. Лице и общіе покровы ея тѣла были особенно блѣдны, пульсъ слабъ (до 75 біеній въ минуту), языкъ нѣсколько обложенъ бѣловатою слизью; глаза, исключая уменьшенной подвижности и разширенія зрачковъ, ничего особеннаго не представляли. Больная не страдаетъ никакими болями, жалуется только на онѣмѣніе конечностей и общую слабость; — видѣть же ничего не можетъ и не различаетъ свѣта. — Лечение ея состояло въ припавленіи пиявицъ за уши, открытіи фонтанели на затылкѣ и внутреннемъ употребленіи стрихнина въ восходящихъ приемахъ, іодистаго поташа и отъ времени до времени слабительныхъ средствъ. 15 Декабря больная въ первый разъ почувствовала частыя подергиванія въ конечностяхъ, продолжавшіяся отъ времени до времени и въ слѣдующіе дни, при чемъ онѣмѣніе начало постепенно уменьшаться и зрачки стали суживаться отъ дѣйствія свѣта. 25 Декабря безъ всякой видимой причины показались у больной лихорадочныя движенія: языкъ сталъ сохнуть, появилась головная боль и бессонница, вмѣстѣ съ тѣмъ больная начала, хотя неясно, различать предметы; вышенечисленные средства были замѣнены малыми приемами рвотнаго камня съ мидереровымъ спиртомъ и легкими слабительными; отъ чего лихорадочныя движенія уменьшились и постепенно прошли. Со 2 Января больная опять начала принимать іодистый поташъ и стрихнинъ. Общее состояніе ея здоровья поправилось, аппетитъ увеличился, зрѣніе день ото дня становилось лучше, движеніе въ конечностяхъ постепенно возвращалось. 20 Января она могла уже сама держать ложку и различала лица, а 2 Февраля вышла изъ больницы съ зрѣніемъ и движеніями конечностей совершенно возстановленными.

*Нѣмота послѣ оспы; возвращеніе дара слова чрезъ 6 лѣтъ  
при сильномъ испугѣ.*

12 Ноября 1856 году въ Минскую богадѣльню поступилъ тринадцатилѣтній нѣмой мальчикъ, съ совершенною глухотою праваго и слабымъ слухомъ лѣваго уха и рѣзкими слѣдами натуральной оспы не только по всему лицу, но даже на груди и отчасти на верхнихъ конечностяхъ. Изъ анэмнестическихъ свѣдѣній было извѣстно только, что больной съ седьмаго года жизни пользовался какъ вообще хорошимъ здоровьемъ, такъ равно слухомъ и даромъ рѣчи; но въ этомъ возрастѣ во время сильнѣйшей натуральной оспы совершенно онѣмѣлъ и потерялъ слухъ въ правомъ ухѣ, удержавъ его въ слабой степени въ лѣвомъ. Съ тѣхъ поръ употребленіе разнородныхъ средствъ для возстановленія слуха и рѣчи больного оставалось безуспѣшнымъ и родители, находясь въ крайнемъ положеніи, помѣстили его для пропитанія въ богадѣльню. Общее состояніе здоровья его было совершенно хорошо до 15 Декабря 1856 года; въ это время онъ сильно заболѣлъ воспаленіемъ легкихъ, преимущественно правой стороны. Употребленіе рвотнаго камня въ полныхъ пріемахъ оказалось недостаточнымъ для уничтоженія быстро развивающейся болѣзни и 16 Декабря предположено было сдѣлать больному общее кровопусканіе. Больной знаками обнаруживалъ свое несогласіе на эту мѣру, но угрожающее состояніе болѣзни требовало безотлагательнаго ея исполненія, что и послѣдовало 16 Декабря въ 11 часовъ утра. Во время самаго прокола вены больной произнесъ «Боже мой» еще не совершенно выразительно и съ этой минуты началось постепенное возстановленіе дара рѣчи и слуха въ правомъ ухѣ, такъ что 28 Декабря уже онъ могъ понятно разговаривать и хорошо слышалъ. Воспаленіе легкаго уступило дальнѣйшему пользованію безъ всякихъ послѣдствій.

Въ леченіи парализа отъ апоплектическаго удара въ нѣсколькихъ случаяхъ была съ успѣхомъ испытана *настойка укусунокислой мѣди*, приготовленная по способу



Радемахера. Въ числѣ таковыхъ наблюденій въ С.-Петербургской больницѣ чернорабочихъ въ одномъ параллельно распространялся на языкъ, верхнія и нижнія конечности; въ двухъ — на лѣвую половину и языкъ и въ одномъ на всю правую половину тѣла. Въ первомъ случаѣ были притомъ признаки потери сознанія. Мѣдная настойка назначалась внутрь по 15 капель, четыре раза въ сутки; кромѣ того больному съ потерей сознанія приложена была мушка на голову. При постоянномъ употребленіи упомянутого средства (до 60 капель въ сутки) одинъ больной выздоровѣлъ въ продолженіи двухъ недѣль; двое нѣсколько медленнѣе и одинъ вышелъ изъ больницы, не достигнувъ полного возстановленія движенія въ парализованныхъ конечностяхъ, но съ значительнымъ улучшеніемъ. Онъ принималъ мѣдную настойку въ продолженіи 6 недѣль сряду, причемъ отравленія пищеварительныхъ органовъ постоянно были нормальны.

Въ Пензенскую больницу поступила больная, 44 лѣтъ отъ роду, крѣпкаго тѣлосложенія, съ потерей регулы за два года до того отъ простуды. Въ началѣ это не обнаруживало особеннаго вліянія на ея здоровье, но за 6 мѣсяцевъ до поступленія въ больницу она начала жаловаться на сильныя головныя боли и совершенно лишилась чувствительности въ общихъ покровахъ головы и лица; причемъ впрочемъ общее состояніе ея здоровья оставалось довольно удовлетворительнымъ. Употребленіе слабительныхъ, проносныхъ, возстановляющихъ мѣсячное очищеніе, отвлекающихъ средствъ и вератрина осталось безъ успѣха. Наконецъ продолжительное употребленіе настойки уксуснокислой мѣди Радемахера сначала по 20, потомъ по 40 капель, по 4 раза въ день, совершенно возстановило чувствительность общихъ покрововъ головы и лица. Замѣчательно, что притомъ возвратилось и мѣсячное очищеніе.

Въ одномъ случаѣ застарѣлаго паралича нижнихъ конечностей въ Вилькомірской уѣздной больницѣ Ковенской губерніи съ успѣхомъ было испытано 6-ти-недѣльное внутреннее употребленіе мозжечкового масла по 4 капли чрезъ 3 часа.

Въ Пензенской больницѣ былъ замѣчательный случай паралича языка, съ сильными головными болями, потемнѣніемъ зрѣнія, постояннымъ разширеніемъ зрачковъ и періодическимъ появленіемъ меланхоліи. Пищевареніе у больного было въ порядкѣ, пульсъ нѣсколько ускоренъ и твердъ. На головѣ и бедрахъ оказались ограниченныя опухоли отъ воспаленія надкостной плевы. Признавъ ихъ за сифилитическія, врачъ назначилъ больному внутреннее употребленіе сарсапарильнаго декокта и іодистаго поташа, отъ 10 до 30 гранъ въ день; при такомъ леченіи совершенное выздоровленіе послѣдовало чрезъ 4 недѣли.

Въ Симбирской больницѣ встрѣтился случай пляски Св. Витта у рекрута изъ Татаръ. Признаки болѣзни обнаружались на 2-й день послѣ приѣма его отъ испуга и послѣдовавшей затѣмъ значительной простуды. Судорожныя движенія были въ этомъ случаѣ такъ велики и постоянны, что едва возможно было, и то съ трудомъ, сколько нибудь кормить больного; о правильныхъ приѣмахъ лекарствъ, особенно жидкихъ, нельзя было и думать. Мышцы лица, рукъ, ногъ и туловища непрерывно сокращались судорожно по всеѣмъ направленіямъ и особенно сильны были безпрестанныя подергиванія и искривленія шеи и головы. Первыя, противусудорожныя, противоревматическія средства и раздраженія на разныхъ частяхъ тѣла, долго поддерживаемыя, не оказали въ теченіи болѣзни никакой перемѣны; дважды развивался у больного жаръ съ явственными признаками раздраженія мозга; въ



первый разъ продолжался онъ 9, во второй 14 дней, — въ это время судороги совершенно прекращались и больной успокоивался, но по наступленіи критическихъ явленій вновь обнаруживались, начинаясь обыкновенно подергиваніемъ рукъ и искривленіемъ шеи и постепенно достигали полного своего развитія. Больной пробылъ въ больницѣ около 7 мѣсяцевъ и выпущенъ изъ нея неизлеченнымъ.

Въ леченіи падучей болѣзни въ Одесской больницѣ было испытано внутреннее употребленіе *окиси цинка* въ восходящихъ приѣмахъ, доходившихъ до 15 гранъ въ день; въ одномъ случаѣ оно совершенно излечило больного, у котораго эпилептическіе припадки повторялись по 3—4 раза въ день, въ остальныхъ же случаяхъ осталось без-полезнымъ.

---

Въ судебно-діагностическомъ отношеніи заслуживаетъ вниманія слѣдующее наблюденіе смертельнаго поврежденія головы съ апоплексическимъ кровоизліяніемъ въ полость черепа:

*Насильственное отдѣленіе носа при переломѣ костей черепа, безъ наружныхъ признаковъ ушиба; — кровоизліяніе въ полость черепа изъ разорванныхъ сосудовъ; исходъ въ смерть.*

Больной, лѣтъ 60 отъ роду, былъ доставленъ въ Житомирскую больницу 2 Декабря ночью по морозной мятели, безъ данныхъ для поясненія предшествовавшихъ обстоятельствъ и причинъ его болѣзни. При первомъ изслѣдованіи, сдѣланномъ немедленно по поступленіи его въ больницу, оказалось, что нижняя треть носа была оторвана и висѣла на лоскутѣ кожи, уцѣлѣвшемъ возлѣ правой

ноздри. Поданіе врачебной помощи начато съ того, что оторванная часть была пришта дана достаточнымъ количествомъ булавокъ. Во время этого больной пошатываясь сидѣлъ безъ посторонней помощи и старался освободиться отъ операціи, которой боль онъ вполне чувствовалъ. Запахъ водки изъ рта его былъ притомъ весьма чувствителенъ, вѣки были полузакрыты, самосознаніе почти потеряно до того, что состояніе его можно было принять за высшую степень опьяненія; больному было дано  $\frac{1}{2}$  унца миндерерова спирта съ двумя каплями жидкаго аммонія въ чашкѣ воды, которую онъ хорошо проглотилъ. Ночью онъ спалъ повидимому нормальнымъ сномъ; пульсъ его былъ правиленъ; разбуженный утромъ онъ не отвѣчалъ на вопросы, а только окинулъ глазами комнату, сѣвши на кровати и, выпивъ данное ему лекарство, вновь уснулъ еще болѣе глубокимъ сномъ. — Во время этого сна ему втерли въ шею  $\frac{1}{2}$  унца сѣрой ртутной мази; къ вечеру сонъ сдѣлался храпящимъ, съ глубокимъ рѣдкимъ дыханіемъ; моча отдѣлялась въ продолженіе дня обильно въ постель, но нанизъ не было. Все тѣло больного было вытерто щетками, омоченными въ смѣсь терпентиннаго масла съ жидкимъ аммоніемъ; поставлено промывательное изъ вонючей камеди съ поваренною солью и уксусо-кислымъ амміакомъ, внутрь же дана сладкая ртуть (по 10 гранъ) съ камforoю (по одному грану на пріемъ). — Во время приложенія промывательнаго и проглатыванія порошка больной раскрывалъ глаза, смотрѣлъ на окружающихъ, но оставался безмолвенъ; движенія его не были повидимому ограничены. Въ такомъ положеніи, близкомъ къ глубокому сну, больной оставался до смерти, послѣдовавшей на 5 день по поступленіи его въ больницу.

Исслѣдованіе послѣ смерти показало, что оторванный конецъ носа, не смотря на состояніе больного, представлявшее собою со времени операціи медленную агонію, совершенно приросъ. При вскрытіи полости черепа оказалось, что, несмотря на отсутствіе опухоли и малѣйшихъ признаковъ ушиба на головѣ, кости черепа были разломаны. Отъ старости онѣ были вообще очень тонки и хрупки. Передній нижній уголь лѣвой темянной кости, совершенно



сросшейся въ швахъ своихъ съ соединими, былъ отъ нихъ отдѣленъ и вдавленъ внутрь. Длина боковъ этого трехугольнаго отломка была болѣе дюйма. Проходящая тутъ въ своей бороздѣ средняя артерія мозговыхъ оболочекъ (*art. meningea media*) была разорвана и кровавый свертокъ излившейся изъ нея крови, въ 6-ть дюймовъ діаметра и  $1\frac{1}{2}$  дюйма самой большей толщины въ центрѣ, лежалъ на твердой мозговой оболочкѣ, между ею и внутреннею поверхностію височной, темянной, отчасти лобной и большаго крыла основной кости.

Одинъ изъ случаевъ сотрясенія мозга отъ сильнаго ушиба замѣчательнъ по исходу своему въ выздоровленіе:

Субъектъ этого наблюденія находился въ саду, когда внезапно начавшійся ураганъ сломалъ огромное дерево, которое ударило его въ голову и придавило къ землѣ. Подъ этимъ деревомъ онъ найденъ былъ безъ всякихъ признаковъ жизни, плавающимъ въ крови, вытекавшей изъ рта и носа; одно ухо было отбито у него совершенно. При дѣйствіи кровопусканія, болѣе чѣмъ въ одинъ фунтъ, продолжительныхъ растираній всего тѣла и раздражающихъ промывательныхъ, только черезъ 3 часа показались у больнаго признаки жизни. Тогда было сдѣлано ему еще кровопусканіе изъ другой руки, около фунта, и внутрь назначенъ растворъ селитры съ рвотнымъ камнемъ. — На 3 день больной началъ понемногу приходить въ себя, но расширенныя неподвижныя зрачки обличали значительный эксудатъ въ мозгу его. Внутри назначена была сладкая ртуть, чрезъ 2 часа по одному грану, а снаружи мушка на затылокъ и для перевязки ея сѣрая ртутная мазь поровну со спускомъ. — На обрѣтую голову также ставили мушки въ разныхъ мѣстахъ одна за другою до тѣхъ поръ, пока признаки выпотѣнія совершенно не уничтожились. Чрезъ мѣсяцъ больной оставилъ больницу здоровымъ безъ малѣйшихъ признаковъ послѣдовательнаго страданія мозга.

Изъ случаевъ апоплексіи замѣчательны нѣкоторые по мѣсту изліянія крови въ существѣ головного центра нервной системы. Въ числѣ ихъ въ трехъ оно послѣдовало въ мякоть мозжечка съ разрывомъ ея. Одно изъ этихъ

наблюдений принадлежит Орловской и два Калужской больницы; всѣ три случая окончились смертію.

Въ Рѣчицкую уѣздную больницу (Минской губерніи) былъ доставленъ убитый молніею. При изслѣдованіи тѣла его найдены раны на лѣвомъ темени, съ разрывомъ наружныхъ покрововъ головы, *разщепъ костей черепа на одной внутренней поверхности ихъ* по направленію стрѣлообразнаго шва и обильное изліяніе черной жидкой крови въ полость мозга. Вмѣстѣ съ тѣмъ печень оказалась увеличенною въ объемѣ и вѣсила до 6 фунтовъ; изъ поверхностей разрѣзаея истекала въ большомъ количествѣ темная жидкая кровь.

Отъ разныхъ видовъ психическихъ болѣзней въ домахъ умалишенныхъ и больницахъ почти исключительно губернскихъ городовъ было пользовано въ теченіи 1856 года 3,616 человекъ, изъ которыхъ выздоровѣло и выпущено съ облегченіемъ припадковъ 2,078, умерло 388, и осталось къ 1857 году 1,150. Въ отношеніи численности больныхъ этой категоріи отдѣльныя больницы слѣдовали въ такомъ порядкѣ: помѣшанныхъ призрѣвалось отъ 140—150 въ больницахъ Харьковской и Херсонской,

» 130—140 »	»	Полтавской, Екатеринославской и Тверской,
» 120—130 »	»	Рижской, Ковенской и Черниговской,
» 110—120 »	»	Тамбовской и Курской,
» 100—110 »	»	Калужской, Воронежской, Виленской и Ярославской,
» 90—100 »	»	Орловской, Симферопольской, Нижегородской, Подольской и Тульской,
» 70—80 »	»	Рязанской, Пермской и Иркутской,



отъ 60— 70	въ больницахъ	Вятской и Новгородской,
» 50— 60	»	Житомирской, Вологодской, Владимірской, Могилевской и Псковской,
» 40— 50	»	Кишиневской, Пензенской, Тобольской, Самарской, Смо- ленской, Ревельской и Астра- ханской,
» 30— 40	»	Мпавской, Ставропольской Симбирской, Минской, Са- ратовской, Витебской и Том- ской,
» 20— 30	»	Гродненской, Ковенской и Архангельской,
» 10— 20	»	Петрозаводской, Тифлиской, Уфимской и Костромской.

Въ общемъ числѣ случаевъ психическаго разстрой-  
ства около  $\frac{1}{6}$  принадлежали запоемъ (561 : 3616); въ осталь-  
ной части значительно чаще другихъ формъ встрѣчались  
маніи и мономаніи (до  $\frac{4}{6}$ ), менѣе часто меланхолія и рѣже  
всѣхъ виды болѣзненной глупости (*fatuitas*) и идиотизма.

Привычное злоупотребленіе спиртныхъ напитковъ  
являлось, какъ и прежде, одною изъ болѣе постоянныхъ  
причинъ заболѣванія различными видами умственного  
разстройства. Изъ анамнестическихъ данныхъ оказалось  
въ Полтавской больницѣ, что на 103 больныхъ этой ка-  
тегоріи только 13 не разстроивали до болѣзни своихъ  
способностей привычнымъ неумѣреннымъ употребле-  
ніемъ спирта; въ томъ числѣ изъ 55 мужчинъ только 3.  
Притомъ въ перѣдкахъ случаяхъ помѣшательства мѣст-  
ные наблюдатели находили въ первыхъ періодахъ нѣ-  
сколько общихъ признаковъ съ запоемъ, въ томъ числѣ  
особенно часто встрѣчавшееся трясеніе членовъ и языка,  
равно какъ видѣнія насѣкомыхъ и бѣсиковъ; а въ общемъ

характеръ различныхъ формъ помѣшательства замѣчали преобладаніе идіотическаго элемента, вслѣдствіе постепеннаго притупленія умственныхъ способностей. Въ Рязанской больницѣ также во многихъ случаяхъ открывалась этиологическая связь злоупотребленія спиртныхъ напитковъ съ происхожденіемъ психическихъ болѣзней.

Въ числѣ отдѣльныхъ наблюденій разныхъ видовъ помѣшательства замѣчательны слѣдующія:

31 Января 1856 года въ Новгородскую губернскую больницу поступилъ крестьянинъ въ совершенномъ отсутствіи умственныхъ способностей. Вся поверхность тѣла его была притомъ покрыта сплывѣннѣйшею оспою въ началѣ подсыханія въ видѣ сплошнаго струпа. Изъ объясненія родныхъ оказывалось, что до этой болѣзни способности его были въ совершенномъ порядкѣ. Не смотря на тяжкую болѣзнь и сплывную лихорадку адинамического характера состояніе больного не предвѣщало опасности для жизни. Но проявленіе мысли было у него совершенно извращено. Хорошо вслушиваясь въ предлагаемый вопросъ, онъ отвѣчалъ на него совершенно другое, притомъ было замѣтно, что мысли его оканчивались или пустымъ наборомъ словъ, или оставались неоконченными. Съ дальнѣйшимъ ходомъ болѣзни — подсыхая сыпь на нѣкоторыхъ частяхъ тѣла начала отдѣляться, большой видимо сталъ поправляться въ сплахъ, но состояніе умственныхъ способностей еще болѣе разстроилось, такъ что уже ни врожденный законъ стыдливости, ни ласки, ни угрозы не могли остановить его отъ болѣзненнаго цинизма, свойственнаго животнымъ. Предполагая этиологическую связь мозговаго страданія съ обильнѣйшею сыпью, которая въ послѣдствіи превратилась въ сплошную струпу, совершенно закрывшій поры кожи, врачъ призналъ необходимымъ назначить больному внутреннее употребленіе потогонныхъ средствъ и соленыя ванны въ 30° по Реом., чрезъ каждыя два дня. При такомъ пользованіи признаки умопомѣшательства въ продолженіи 3 недѣль постепенно исчезли.

Въ Бериславской больницѣ (Херсонской губерніи) былъ пользованъ случай маниі, развившейся у совер-



шенно здороваго субъекта отъ удара солнечныхъ лучей въ голову при 22° R. Съ этого самаго времени больной началъ бредить, но оставался на ногахъ и продолжалъ заниматься своими работами. На 4 день болѣзни вечеромъ пробудилось въ немъ покушеніе къ самоубійству, въ слѣдствіе чего онъ нанесъ себѣ глубокую рану на шеѣ, съ поперечнымъ разрѣзомъ дыхательнаго и пищевода наго горла. При поступленіи въ такомъ положеніи въ больницу онъ уже не бредилъ и убѣдительно просилъ о пособіи; но какъ только были наложены лигатуры, то бредъ возвратился; больной сорвалъ ихъ, послѣ чего вновь послѣдовавшее кровотеченіе опять на время прекратило бредъ. Лечение состояло изъ кровопусканій, отвлекающихъ, внутренняго употребленія сладкой ртути и другихъ противувоспалительныхъ средствъ. Выздоровленіе послѣдовало медленно и только чрезъ 4 мѣсяца больной выпущенъ изъ больницы совершенно здоровымъ. На мѣстѣ раны шеи осталась незначительная фистула.

Въ Ставропольской больницѣ сдѣлано наблюденіе мании, развившейся у субъекта крѣпкаго атлетическаго тѣлосложенія отъ нетрезвой жизни, замѣчательное въ томъ отношеніи, что въ припадкахъ изступленія и бѣшенства больной удовлетворялъ жажду усиленной дѣятельности мышечныхъ силъ иногда совершенно особеннымъ образомъ. Вырываясь на дворъ больницы, онъ поднималъ и переносилъ съ одного мѣста на другое камни вѣсомъ до 6 пудовъ, — пока не наступало совершенное утомленіе; окружавшимъ же его лицамъ никакого вреда не дѣлалъ. Этотъ случай окончился выздоровленіемъ.

Въ Харьковской больницѣ встрѣтился случай послѣ-родовой мании (*mania puerperalis*). На 5 день послѣ благополучныхъ родовъ у больной при сильныхъ воспалительныхъ боляхъ въ животѣ обнаружился неумолкаемый бѣшенный бредъ, со всѣми явленіями остраго воспаленія

оболочекъ мозга. Въ такомъ положеніи она была принята въ больницу, гдѣ чрезъ 36 часовъ скончалась. При вскрытіи тѣла найдены оболочки мозга воспаленными съ обильнымъ между ними накопленіемъ жидкаго эксудата; въ брюшинѣ и брюшныхъ покровахъ матки и кишекъ сильная инъекція темной крови съ примѣсью гноя; въ полости живота обильный эксудатъ зеленоватаго цвѣта съ плавающими въ немъ фибринозными клочьями. Матка не совершенно сокращена: полость ея величиною въ большой кулакъ; на лѣвой внутренней стѣнкѣ оной еще не сгладившіеся слѣды прикрѣпленія послѣда, около нихъ существо матки и венозныя сплетенія представляютъ признаки воспаленія съ исходомъ въ нагноеніе.

Нѣкоторые изъ случаевъ мономаніи отличались замѣчательною ограниченностію содержанія ложныхъ представлений. Одинъ изъ больныхъ Полтавской больницы помѣшался на томъ, что въ церкви на его родинѣ противъ престола не стояло иконы Николая Чудотворца; о вещахъ, не касавшихся этого предмета, больной судилъ совершенно здраво. Другой не обнаруживалъ ни малѣйшаго слѣда помѣшательства при продолжительномъ разговорѣ о самыхъ различныхъ предметахъ, но стоило спросить его объ одной имъ любимой, недавно скончавшейся, особѣ и онъ начиналъ увѣрять, что она жива, при чемъ бредъ постепенно развивался и усиливался. — Одностороннее помѣшательство больного въ Житомирской больницѣ состояло въ томъ, что дома его кормили гнилымъ мясомъ и падалю, отчего у него кровь и мясо обратились въ гниль. Развивая эту идею въ разговорѣ, онъ приходилъ къ убѣжденію, что предводителъствуетъ войскомъ и притомъ обыкновенно командовалъ, не обращая ни на что вниманія. Предъ выздоровленіемъ у него развилась перемежающаяся лихорадка.

Въ Полтавской больницѣ былъ пользованъ случай ум-



ственного разстройства отъ ревности, при неправильномъ строеніи полового органа. Больной, 28 лѣтъ отъ роду, съ идіотическимъ выраженіемъ лица, помѣшался на томъ, что жена его влюблена въ брата. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ ведетъ себя совершенно скромно, ни съ кѣмъ не ссорится и вообще постоянно обнаруживаетъ неестественную стыдливость, но какъ только напоминаютъ ему, что жена или братъ намѣрены пріѣхать, онъ приходитъ въ бѣшенство и при томъ всегда однообразно въ знакъ угрозы поднимаетъ кулакъ. Половой органъ этого больного вообще слабо развитъ, лѣвое ядро значительно увеличено, а правое не болѣе лѣснаго орѣха.

Въ другомъ наблюденіи той же больницы замужняя женщина, мать нѣсколькихъ дѣтей, послѣ какой-то сыни и нарывовъ на всемъ тѣлѣ, на 49 году жизни, помѣшалась на томъ, что она переродилась тѣлесно и вновь получила дѣвственность. Для убѣжденія въ этомъ она согласна подвергнуться акушерскому изслѣдованію. Вмѣстѣ съ такимъ тѣлеснымъ перерожденіемъ больная предполагаетъ въ себѣ и духовное, и потому не считаетъ себя принадлежащею ни къ какой религіи, хотя и не отвергаетъ необходимости избрать для себя одну.

Наконецъ тамъ же представился наблюденію случай проманиі на 18 лѣтней дѣвушкѣ, съ пѣжными чертами лица, открытымъ и простодушнымъ взглядомъ. Въ продолженіе двухъ послѣднихъ лѣтъ у нея было правильное мѣсячное очищеніе. Ее схватили въ минуту поджога. Самое внимательное наблюденіе не обнаружило въ ней послѣ того ни одного изъ признаковъ умопомѣшательства; на всѣ вопросы она отвѣчала охотно и правильно, при распросахъ о поступкѣ своемъ откровенно въ немъ сознавалась, относительно же побудившей къ оному причины говорила, что пропзвела его во время помраченія ума, когда сама себя не помнила.

Лечение различных видов помѣшательства сообразовалось съ ихъ характеромъ, степенью и очевидными или предполагаемыми причинами происхожденія, а также съ объективными признаками патологическихъ состояній, ихъ сопровождавшихъ.

Изъ числа выздоровѣвшихъ въ Рязанской больницѣ замѣчательны случаи прекращенія мании при появленіи перемежающейся лихорадки.

Больной крестьянинъ, атлетическаго сложенія, 26 лѣтъ отъ роду, доставленъ былъ въ больницу въ бѣшенномъ бреду, непрерывно говорилъ, кричалъ, пѣлъ, кидался на окружающихъ и рвалъ на себѣ бѣлье. Тотчасъ по поступленіи ему было сдѣлано кровопусканіе, чему показаніемъ служилъ приливъ крови въ головѣ, обнаруживавшійся краснымъ вздутымъ лицомъ, глазами налитымъ кровью и какъ бы выходившимъ изъ орбитъ, да и пульсъ былъ полный, твердый, но не частый (70 ударовъ въ минуту). Сверхъ того на затылокъ больного поставлена была мушка, а на голову положены холодныя примочки; внутрь прописана селитряная охлаждающая микстура, которой впрочемъ больной не принималъ. Послѣ этихъ средствъ признаки прилива крови въ головѣ исчезли, больной заснулъ и затѣмъ былъ покойнѣе, но бредъ его продолжался и возвращался неистовства, какъ только предлагали ему принимать лекарство. Въ такомъ положеніи онъ былъ въ продолженіи 10 недѣль, какъ вдругъ безъ всякой видимой причины обнаружился у него полный пароксизмъ перемежающейся лихорадки; непосредственно затѣмъ наступила перемежка и больной, какъ бы пробудившійся отъ глубокаго сна, пришелъ въ себя, спрашивалъ гдѣ онъ и какъ попалъ въ больницу; на другой день пароксизмъ повторился при полномъ сознаніи больного. При употребленіи хинина, лихорадка прекратилась на 6 дней; только остался незначительный завалъ селезенки и развилась подкожная водянка; все это уступило 10 дневному молочному леченію, послѣ чего больной выписанъ изъ больницы совершенно здоровымъ.

Въ Полтавской больницѣ было два сходныхъ случая,



въ которыхъ при маніи обнаружилась перемежающаяся лихорадка и по излеченіи ея умственное состояніе больныхъ значительно улучшилось. Тамъ же былъ наблюдаемъ случай развитія тифа у больного маніею; по выздоровленіи отъ онаго явленій помѣшательства болѣе не показывалось, но развился идіотизмъ въ сильной степени.

Въ одномъ наблюденіи, принадлежащемъ Житомирской больницѣ, у помѣшаннаго съ яростно-бѣшенымъ бредомъ были короткіе типическіе промежутки по вечерамъ; воспользовавшись ими, врачъ назначилъ больному хининъ (по 10 гранъ) съ вытяжкою красавицы (по  $\frac{1}{2}$  грана), чрезъ два часа. Сначала это средство усиливало приступы бѣшенства, но потомъ совершенно прекратило его.

Одинъ изъ случаевъ нимфоманіи въ Симбирской больницѣ былъ удачно излеченъ внутреннимъ употребленіемъ сѣрниокислаго цинка въ возрастающихъ приемахъ, отъ  $\frac{1}{2}$  до 18 гранъ.

---

Эпидемическое распространеніе прирожденнаго идіотизма въ Иркутской губерніи сдѣлалось съ прошлаго года предметомъ мѣстныхъ изслѣдованій. Они обнаружили, что случаи его встрѣчаются по Ангартъ и въ Нижнеудинскомъ округѣ, тамъ же гдѣ и зобъ, но менѣе часто. Въ числѣ ихъ инспекторомъ Иркутской врачебной управы при объѣздѣ губерніи найдено въ деревнѣ Кузнецовой, принадлежащей къ Иднискій степной думѣ, цѣлое семейство идіотовъ, состоящее изъ 5 мальчиковъ отъ 5 до 17 лѣтняго возраста. Мать четырехъ изъ нихъ, и бабка послѣдняго, лѣтъ 50 отъ роду, имѣетъ значительный зобъ, образовавшійся не болѣе 10 лѣтъ тому назадъ. Отъ пер-

ваго супружества у нея было 3 дѣтей совершенно здоровыхъ, именно два сына и дочь. Отъ этой дочери остались два сына идіота, одинъ въ числѣ вышеупомянутыхъ 5 мальчиковъ; другой, отданный на воспитаніе къ зажиточному крестьянину, отличается совершенно ограниченными способностями, почти не въ состояніи говорить и имѣетъ походку шаткую, утиную. Отъ втораго супружества произошли на свѣтъ остальные 4 идіота; два старшіе изъ нихъ глухонѣмые, младшіе нѣсколько слышатъ. Всѣ четверо едва могутъ стоять на ногахъ, съ колѣнами и нижнею частію спиннаго столба вогнутыми внутрь (*lordosis*), брюхомъ выдающимся впередъ и шаткою, нетвердою походкою. Лѣтомъ они разбѣгаются на пастбища и жрутъ, какъ животныя, какую-то траву.

---

Предупредительному и дѣйствительному пользованію водобоязни отъ укушенія бѣшенными животными подвергнуто въ гражданскихъ больницахъ 76 больныхъ; изъ нихъ всѣ 23 случая, гдѣ водобоязнь обнаружилась, окончились смертію. Изъ способовъ леченія было испытано въ Черниговской губерніи на 7 больныхъ *средство Клягину Вяземской*, но результаты остались не убѣдительными по неопредѣлительности, точно ли бѣшенымъ животнымъ были искушены больные. Въ Орловской больницѣ въ 8 случаяхъ употреблялось внутрь растеніе *Campanula conglomerata*, извѣстное въ томъ краю, какъ народное средство. При томъ раны, какъ обыкновенно, растравлялись. Больные оставались въ продолженіи 5 недѣль здоровыми; разовьется ли въ нихъ въ послѣдствіи водобоязнь рѣшить нельзя. Случаи болѣе поздняго обнаруженія ея были: чрезъ 2 мѣсяца въ Кіевской и чрезъ 6 — въ Нижегородской губерніи. Въ Цывильской боль-



лицъ Казанской губерніи былъ пользованъ больноі отъ укушенія домашнею цѣпною собакою, не обнаруживавшею признаковъ бѣшенства, и вынуцень здоровымъ; чрезъ 2 мѣсяца развилась у него водоболъзнь съ смертельнымъ исходомъ.

---

Въ числѣ отдѣльныхъ наблюденій болѣзней остальныхъ категорій особенно замѣчательны слѣдующія:

*Вывихъ 4го шейнаго позвонка; случайное вправленіе отъ паденія съ кровати; исходъ въ выздоровленіе.*

Больной, 38 лѣтъ отъ роду, привезенъ въ Могилевскую губернскую больницу 17 Октября 1856 года въ коматозномъ состояніи; большаго труда стоило его разбудить, причѣмъ онъ неохотно и невнятно отвѣчалъ на дѣлашіе ему вопросы; дыханіе его было поверхностное и ускоренное; голова уклонена назадъ и направо, въ такой мѣрѣ, что лице находится почти въ одной линіи съ плечами; въ нормальное положеніе ее никакъ нельзя привести; щитообразный хрящъ, особенно кадыкъ, (promin. adami) чрезвычайно выдался впередъ; затылочная кожа въ морщинахъ; больной не можетъ ни стоять, ни сидѣть, а все лежитъ, стараясь удерживать позвоночной столбъ въ полукругломъ положеніи. При изслѣдованіи найденъ вывихъ между 3 и 4 шейными позвонками, при чемъ 4 позвонокъ углубленъ приблизительно на  $\frac{3}{4}$  дюйма внутрь, а третій выдался впередъ. Причиной вывиха оказался сплывшій ударъ полѣномъ въ самый затылокъ, послѣ котораго больной упалъ въ безсмысленствѣ и въ такомъ состояніи былъ сброшенъ въ неглубокую рѣчку.

Все успія вправить вывихъ оказались въ первые дни совершенно тщетными. Для уменьшенія прилива крови къ головѣ и устраненія мѣстнаго воспаленія ставились нѣсколько разъ пиявцы

по 15 вдоль шейных позвонков, внутрь же была назначена сладкая ртуть съ ялаппой, отъ чего больному стало нѣсколько легче. Съ 20 по 28 Октября каждый день пробовали вправление вывиха, но безъ успѣха. Ночью съ 29 на 30 Октября больной, упавши печаянно съ кровати, почувствовалъ какой-то трескъ и затѣмъ началъ свободно поворачивать голову во все стороны. Очевидно стало, что вправление совершилось само собою отъ паденія. Больной оставался послѣ того нѣсколько дней въ больницѣ и вышелъ изъ нея совсѣмъ здоровымъ.

Въ Тамбовской больницѣ былъ также пользованъ случай вывиха 4-го груднаго позвонка внутрь, съ переломомъ остистыхъ отростковъ его и 5-го, отъ паденія больного съ высокаго дерева на спину. Здѣсь были все признаки сдавленія спиннаго мозга: при сильной боли въ спинѣ и груди дыханіе было неполное и поверхностное, въ нижнихъ конечностяхъ параличъ, упорный запоръ на низъ съ раздутіемъ живота и тяжелою рвотою, задержаніе урины и охлажденіе спины, живота и конечностей. Лихорадочнаго состоянія не было; пульсъ былъ малъ и слабъ. На 11 день послѣ паденія больной умеръ. При вскрытіи тѣла его найдено: смѣщеніе 4 позвонка впередъ въ грудную полость и соотвѣтственно этому мѣсту размягченіе мягкой спиннаго мозга, съ потерей различія существа его. Въ позвоночномъ каналѣ большое количество свернувшейся крови и кровянистый экстравазатъ въ существѣ мозга нѣсколько выше мѣста размягченія. — Въ Нижегородской больницѣ одинъ изъ случаевъ поврежденія позвоночнаго столба отъ паденія, сопровождавшійся параличемъ нижнихъ конечностей и мочевого пузыря, также окончился смертію. При посмертномъ изслѣдованіи найдено, что хрящъ, соединяющій послѣдній спинной позвонокъ съ первымъ цоценнымъ, былъ разорванъ, въ спинномъ каналѣ было изліяніе крови, а нижняя часть спиннаго мозга перешла въ размягченіе.



*Нарывъ боковой части шеи, сообщавшійся съ полостію рта и груди; — исходъ въ смерть чрезъ открытіе нарыва въ грудную полость.*


Больной, молодого возраста, прибылъ 30 Іюня въ Мптавскую больницу съ нарывомъ, выдававшимся въ горло и доходившимъ нижнимъ своимъ концомъ до ключицы; при глотаніи, кашлѣ и другихъ видахъ мѣстнаго движенія больной ощущалъ значительное затрудненіе. 4 Іюля, послѣ продолжительнаго употребленія смягчительныхъ припарокъ, нарывъ къ большому облегченію больного прорвался и при томъ въ полость рта. На другой день у больного совершенно неожиданно появились сильнѣйшіе боли въ правой сторонѣ груди и въ то же время дыханіе сдѣлалось крайне затруднительнымъ безъ значительныхъ явленій горячки, что и заставило предполагать, что нарывъ прорвался и въ грудную полость. Эти явленія продолжались неизмѣнно до 10 Іюля; въ этотъ день рано утромъ, послѣ спокойно проведенной ночи, больной, вставая съ постели, скоропостижно умеръ. Правильность діагноза подтвердилась вскрытіемъ: въ мѣшкѣ плевры найдено было изліяніе гноя и сверхъ того правое легкое, соединенное съ нарывомъ, содержало въ ткани своей сообщавшіяся съ нимъ каверны.

*Переносный нарывъ на спинѣ, сообщавшійся съ легочными нарывами; исходъ въ смерть.*

Крестьянка, 27 лѣтъ отъ роду, посредственнаго тѣлосложенія, страдала дома шесть недѣль тифомъ, сопровождавшимся кашлемъ: въ послѣдствіи образовался у нея на спинѣ переносный нарывъ (*abscessus per congestionem*). Больная прибыла въ Гродненскую больницу 8 Іюля въ крайне истощенномъ состояніи, съ одышкою, признаками изнурительной лихорадки и поносомъ, продолжавшимся уже 12 дней; притомъ былъ у нея легкій кашель безъ изверженія мокроты; на спинѣ съ правой стороны огромнѣйшій нарывъ занималъ въ видѣ полушарія все пространство отъ

средины лопатки до края послѣднихъ реберъ и отъ позвоночнаго столба до подмышки. Выслушваніе обнаруживало у больной глубокое хроническое страданіе легкихъ, преимущественно правого: исходъ болѣзни казался насомнѣнно смертельнымъ. На третьей недѣлѣ пользованія нарывъ вскрылся въ нижней части и съ того времени больная начала поправляться; всѣ вышеописанные болѣзненные припадки мало по малу прошли, силы возстановились и тѣло пополнило, только на мѣстѣ нарыва осталась фистулѣзная язва съ весьма длиннымъ каналомъ, проникавшимъ между мышцами до верхней части лопатки; изъ него вытекала сначала въ большомъ количествѣ желтая матерія, но отдѣленіе ея со дня на день уменьшалось и наконецъ съ первыхъ чиселъ Августа совершенно прекратилось. Но 17 число этого мѣсяца здоровье больной было еще въ довольно хорошемъ состояніи. Съ этого же времени у нея сдѣлался кровавый поносъ и вмѣстѣ съ тѣмъ возобновились кашель и истеченіе матеріи изъ язвы. 4 Сентября больная умерла.

При вскрытіи трупа ея найдено: правое легкое въ опеченѣломъ состояніи, всѣ доли его соединены другъ съ другомъ и съ подреберною плевой крѣпкими сращеніями, особенно въ верхней и задней части, противъ 3 и 4 ребра; въ этомъ самомъ мѣстѣ вышеупомянутый фистулѣзный ходъ между мышцами переходилъ во внутренній ходъ, проникавшій глубоко въ существо легкаго, почти въ поперечномъ направленіи. Въ этотъ послѣдній стекался гной изъ множества зрѣлыхъ нарывовъ, разсѣянныхъ въ существѣ праваго легкаго; верхній край четвертаго ребра былъ пораженъ костоѣдою именно тамъ, гдѣ было сообщеніе наружнаго гнойнаго хода съ внутреннимъ. Въ лѣвомъ легкомъ оказались бугорки, въ нагноеніе еще не перешедшіе; стѣнки сердца были размягчены; печень въ объемѣ увеличена; на внутренней оболочкѣ толстыхъ кишекъ фолликулярныя изъязвленія.





*Туберкулёзъ гортани; нарывъ задней стѣнки ея съ разрушеніемъ кольцообразнаго хряща; исходъ въ смерть.*

Туберкулёзное пораженіе гортани развилось у больного Венденской больницы Лифляндской губерніи въ продолженіе тифозной горячки, которою страдалъ онъ до поступленія въ больницу. Здѣсь болѣзнь его знаменовалась веѣми явленіями гортанной чихотки: мучительныя сверлящія боли, особенно сильныя на задней стѣнкѣ гортани, роспространялись оттуда въ уши и сопровождали каждое покушеніе проглотить жидкую или плотную пищу. Притомъ сильный и постоянный кашель, *но вовсе безъ изверженія мокроты*. При постепенномъ изнуреніи больной умеръ въ больницѣ.

При вскрытіи оказалось, что связочный снарядъ и слизистая оболочка гортани были не повреждены, только въ сильномъ отѣчномъ состояніи; щитообразный хрящъ былъ также цѣлъ, но на задней стѣнкѣ гортани кольцовидный хрящъ (*cart. cricoidea*) былъ совершенно разрушенъ и лежалъ въ нарывѣ, наполненномъ жидкимъ зеленовато-желтымъ гноемъ. Стѣнки нарыва изъ фиброзной поделзистой ткани, въ слѣдствіе выпотѣнія сально-студенистаго свойства, были утолщены въ 2 — 3 раза противъ обыкновеннаго, что и остановило вскрытіе нарыва, уже достигшаго величины грецкого орѣха и образовывавшаго выпуклость назадъ. Затрудненіе глотанія больного основывалось на образованіи этого нарыва и стѣсненіи имъ глотки. Легкія не представляли туберкулёзныхъ отложеній; въ толстой кишкѣ, около Баухиновой заслонки, были слѣды язвъ уже заживавшихъ, вѣроятно въ слѣдствіе предшествовавшаго тифа.

*Общій туберкулёзъ тѣла; — туберкулёзныя язвы гортани и дыхательнаго горла; — исходъ въ смерть.*

Больная, 25 лѣтъ отъ роду, послѣ 4 мѣсячныхъ страданій дома поступила въ Житомирскую больницу съ слѣдующими явленіями: чахлость тѣла, впалыя щеки, втянутые глаза, выраженіе лица страдальческое; потеря голоса, кашель частый, сильный, удушливый, нерѣдко со рвотою отъ чрезмѣрнаго напряженія и

съ изверженіемъ мокроты мутной, густой, вязкой, зеленоватой и со струйками красно-желтоватыми; одышка; вдыханіе свистящее съ большимъ напряженіемъ шейныхъ мышцъ и выпрямленіемъ головы назадъ; часто страхъ задушенія и чувство инороднаго тѣла въ гортанной щели вслѣдствіе отѣка ея и изъязвленій горла. При выслушиваніи обнаруживаются клокотаніе въ верхней правой половинѣ груди и влажные хрипы въ лѣвой подъязычной сторонѣ; при перкуссіи слышится тимпаническій звукъ грудной кѣтки. Ребра праваго бока вдавлены внутрь и неподвижны; біеніе сердца тревожно, пульсъ скоръ, частъ и малъ; притомъ изнурительный потъ и поносъ. Мѣстные признаки указывали на эдему глотки, суженіе гортани и гортанную чахотку, при туберкулѣзѣ легкихъ, бронхіальныхъ и брюшныхъ лимфатическихъ железъ. Пользованіе больной было лишь палліативное и эйтаназическое; смерть была неизбежна и послѣдовала чрезъ 40 дней пребыванія ея въ больницѣ. Вскрытіе трупа подтвердило діагнозъ: слизистая и подслизистая оболочки гортани и дыхательнаго горла были во многихъ мѣстахъ разстроены нагноеніемъ и изъязвленіемъ; надгортанный хрящъ въ отѣчномъ состояніи, слизистая оболочка его опухла, особенно по краямъ, блѣдна, студениста и при разрѣзахъ источаетъ каплями прозрачную влагу. Въ такомъ же состояніи и слизистая оболочка верхнихъ и нижнихъ голосовыхъ связокъ. Верхняя и средняя доли праваго легкаго разрушены кавернами отъ гнойнаго распадѣнія бугорковой массы, нижняя доля въ состояніи туберкулѣзнаго опеченія. Легочныя доли срослись между собой и приросли къ подреберной плевѣ. Лѣвое легкое проникнуто размягченными туберкулами.

*Туберкулѣзъ легкаго и грудной кости съ разрушеніемъ ея; опущеніе нозы въ клетчатку въ направленіи къ окологрудной сумкѣ; — послѣдовательное воспаленіе послѣдней съ гнойнымъ выпотомъ; — исходъ въ смерть.*

Въ Павлоградскую больницу Екатеринославской губерніи 29 Сентября поступилъ больной съ труднымъ дыханіемъ, кашлемъ,



болью въ груди и отхаркиваніемъ кровавой мокроты; происхожденіе болѣзни онъ приписывалъ удару по груди тяжелымъ тѣломъ, но при наружномъ осмотрѣ знаковъ ушиба нигдѣ не оказывалось. При выслушиваніи груди дыхательный шумъ представлялся ослабленнымъ, въ нижней правой долѣ слышна была крепитация; — болѣзнь признана за воспаленіе лёгкихъ. На третій день на правой сторонѣ съ боку грудины обнаружилось синее пятно; затѣмъ въ слѣдующіе дни на этомъ мѣстѣ образовался нарывъ, по вскрытіи котораго оказался ходъ къ грудной кости, поврежденной костоѣдою. Между тѣмъ припадки воспаленія лёгкихъ усиливались, — вмѣстѣ съ послѣдовательною худобою тѣла. Наконецъ развились явленія піеміи и 21 Октября больной умеръ. При вскрытіи оказалось, что грудная кость въ поперечномъ направленіи была разрушена костоѣдою, губчатая ткань ея вокругъ изъязвленія была пропитана гноемъ. Отсюда онъ проникалъ какъ на наружную поверхность кости и въ право, — въ направленіи къ подкожному нарыву, такъ и на внутреннюю ея поверхность, гдѣ подсерозная клѣтчатка была имъ проникнута — въ направленіи къ околосердечной сумкѣ. Эта послѣдняя была утолщена ложными перепонками, образовавшимися въ недавнемъ времени на внутренней ея поверхности и также содержавшими въ себѣ гной. На поверхности сердца видѣлись воспалительные отѣды въ видѣ клочковъ, съ гнойной инфильтраціей. Въ околосердечной сумкѣ былъ выпотъ грязномутнаго кровянаго цвѣта, съ примѣсью гноя. Въ нижней долѣ праваго легкаго находилась обширная туберкулѣзная каверна, кругомъ ея на разныхъ высотахъ попадались туберкулѣзные сырые отложенія, каверны меньшаго объема, а мѣстами ограниченныя опеченѣніи легочной ткани.

*Туберкулѣзъ легкихъ и кишекъ съ смертельнымъ исходомъ; — нарывъ праваго легкаго, безъ сообщенія съ вѣтвями дыхательнаго горла; — туберкулѣзные язвы толстыхъ кишекъ.*

Больной, 27 лѣтъ, поступилъ въ Венденскую больницу Лифляндской губерніи съ признаками изнурительной лихорадки и не-

прерывнымъ, постоянно-короткимъ, кашлемъ, вовсе безъ изверженія мокроты. Объективное изслѣдованіе обнаруживало у него признаки инфильтраціи легочной ткани на большомъ пространствѣ въ правой половинѣ груди. Въ послѣднее время жизни больного открылся у него изнурительный поносъ, отъ котораго онъ чрезъ 3 недѣли умеръ.

При вскрытіи оказалось, что все правое легкое было обращено въ одинъ нарывъ, чрезъ который мѣстами протягивались еще неразрушенные остатки легочнаго существа. Съ вѣтвями дыхательнаго горла нарывъ вовсе не имѣлъ сообщенія. Слизистая оболочка толстыхъ кишекъ была въ эдематозномъ состояніи и покрывалась во множествѣ туберкулѣзными отложеніями съ изъязвленіемъ ихъ въ различныхъ періодахъ. Всего болѣе находилось послѣднихъ въ толстой кишкѣ, гдѣ слизистая оболочка была до такой степени утолщена, что калибръ кишки былъ почти совершенно сжатъ.

---

*Водянка околосердечной сумки; исходъ въ выздоровленіе.*

Больной, 25 лѣтъ, крѣпкаго тѣлосложенія, принятъ былъ въ С.-Петербургскую больницу чернорабочихъ 22 Ноября, съ слабостью, болью головы и лѣваго подреберья. При томъ у него запоръ на низъ, животъ растянутъ, языкъ не чистый, бѣлый; пульсъ ускоренъ, въ тѣлѣ довольно сильный жаръ. Означенные припадки продолжались у больного и дома въ теченіе 12 сутокъ. Въ больницу назначена ему внутрь сладкая ртуть по одному грану на пріемъ, попеременно чрезъ два часа съ растворомъ селитро-кислаго натра; снаружи рожки къ лѣвому подреберью. Двухдневное употребленіе вышеозначенныхъ внутреннихъ средствъ не принесло больному ни малѣйшаго облегченія и запоръ на низъ продолжался. Пронисана эмульсія изъ клещевиннаго масла, каждые два часа по ложкѣ, и кромѣ того снаружи вторично назначены рожки къ лѣвому подре-

\*



берью. — 24. Больной имѣлъ четыре испражнения, но притомъ лихорадка усилилась и появилась жажда, языкъ суховатъ. Назначена масляная микстура съ селитровислымъ натромъ, которую больной принималъ три дня сряду безъ всякаго облегченія. — 27. Появился сильный сухой кашель, не дававшій покоя ни днемъ, ни ночью; вмѣстѣ съ тѣмъ боль въ лѣвомъ подреберьѣ не только не уменьшилась, но напротивъ того еще усилилась. При изслѣдованіи груди въ легкихъ не найдено ничего особеннаго; при выслушиваніи же сердца удары его казались отдаленными, ускоренными и усиленными. Ясно было, что развивалось воспаленіе околосердечной сумки и водянка ея. Къ лѣвому боку груди приложена большому большая шпанская мушка; а внутрь прописанъ настой наперсточнои травы изъ 12 гранъ со скрупуломъ разведенной селитряной кислоты для сѣточного пріема. — 28. Больному начало дѣлаться лучше: сонъ сдѣлался спокойнѣе и не прерывался кашлемъ, жаръ постепенно уменьшался, блѣдно-синеватый цвѣтъ лица замѣнялся естественнымъ; удары сердца сдѣлались постепенно правильными, спокойными и болѣе ясными. — Послѣ десятидневнаго употребленія вышеозначенной микстуры больной совершенно выздорѣлъ.

*Воспаленіе околосердечной сумки, внутренней оболочки желудочковъ сердца и аорты въ ея восходящей и нисходящей части; — атероматозныя отложенія въ аортѣ, гипертрофія сердца; — исходъ въ смерть.*

16 Ноября поступилъ въ Харьковскую больницу больной съ слѣдующими признаками: дыханіе затруднено, одышка, біенія сердца при выслушиваніи не слышны; перкуссія не даетъ тупаго звука около сердца, шумъ дыханія усиленный, но не бронхіальный; пульсъ скорый, полный, сильный, языкъ влажный, испражнения нормальны; боль въ конечностяхъ при движеніи и давленіи. — Болѣзнь была признана за воспаленіе околосердечной сумки съ выпотѣніемъ; больному назначена сладкая ртуть съ наперсточною

травую и мушка къ сторонѣ сердца; въ то же время сдѣлано ему одно и скоро потомъ повторенное кровопусканіе. — На пятый день больной умеръ. — Вскрытіе показало: оба легкія приросшія къ подреберной плевѣ, на мѣстахъ несросшихся подреберная плева красная, въ лѣвой полости груди до фунта, въ околосердечной сумкѣ около  $\frac{1}{2}$  фунта красноватаго, жидкаго выпотѣнія. Внутренняя поверхность ея красна, сердце почти вдвое больше нормальнаго съ утолщенными стѣнками — и существомъ вялымъ; внутренняя оболочка обоихъ желудочковъ, ближе къ предсердіямъ, опухла и цвѣта темнокраснаго; края заслоночки аорты утолщены, тверды; въ началѣ аорты мѣстами твердоватыя атероматозныя отложенія цвѣта одинакаго съ внутреннею оболочкою артерій; цвѣтъ же этой оболочки въ восходящей и нисходящей части аорты ярко-красный, мѣстами переходящій въ темный. — Объемъ печени увеличенъ, существо ея вяло и дрябло, селезенка почти вътрое больше нормальной величины и переполнена темною густою кровью.

*Туберкулы легкихъ; разширеніе сердца съ атрофіей желудочковъ; — смерть отъ разрыва праваго желудочка и кровоизліянія въ околосердечную сумку.*

Больной, 64 лѣтъ, съ признаками легочной чахотки поступилъ въ Иттомірскую больницу, гдѣ чрезъ 3 дня и скончался при эитанзическомъ пользованіи. Не задолго до смерти обнаружилось у него трясеніе передней поверхности груди, на подобіе непомѣрно-частаго дрожанія какого-то неопредѣлимо волнующагося и какъ бы подпрыгивающаго тѣла въ грудной полости. Это трясеніе возбуждалось сердцемъ неправильно сокращавшимся.

При вскрытіи трупа умершаго найдено слѣдующее: околосердечная сумка, величиною въ дѣтскую голову, лежитъ симметрически въ подгрудинной сторонѣ, занимая центральною своею частью передній грудной промежутокъ и разширяясь равномерно въ обѣ стороны своими боковыми частями за линію соединенія хря-



цевыхъ концовъ реберъ съ костяными. — Сверху она граничитъ съ межребернымъ промежуткомъ 3-го и 4-го ребра, а снизу съ уровнемъ верхушки мечевиднаго отростка. При такомъ положеніи упираясь въ діафрагму, околосердечная сумка опустила сводъ ея внизъ до того, что speculum Helmontii соотвѣтствовало уровню 7-го ребра. — Разширенная и вздутая околосердечная сумка имѣла цвѣтъ вишневый отъ просвѣчиванія содержавшейся въ ней свернувшейся крови. Это кровопзліяніе произошло чрезъ трещину, длиною въ одинъ дюймъ, образовавшуюся на передней стѣнкѣ праваго желудочка, весьма объемистаго и наполненнаго такимъ же сверткомъ крови. Въ лѣвомъ желудочкѣ и въ предсердіяхъ замѣчалось такое же переполненіе ссѣвшеюся кровію. Вообще всѣ полости сердца, судя глазомѣрно, были вдвое болѣе нормальнаго размѣра. Мускулатура его вялая, цвѣта пепельно-мяснаго. Правое легкое сплющено и наполнено туберкулезными кавернами и промежуточнымъ нагноеніемъ; въ кавернахъ водянистая влага желтоватаго цвѣта. Давнія срощенія праваго легкаго съ подреберной плевою и околосердечной сумкой. Лѣвое легкое меланотическое, съ мѣстными дольчатыми опеченѣніями.

*Аневризмъ брюшной аорты; — постоянныя боли въ сторонѣ желудка; — исходъ въ смерть отъ разрыва опухоли.*

Больной, крѣпкаго тѣлосложенія и большаго роста, съ здоровымъ свѣжимъ цвѣтомъ лица, нерѣдко пользовавшийся въ Митавской больницѣ отъ болей въ желудкѣ, прибылъ въ нее вновь 1-го Ноября 1856 года съ признаками гастроревматической горячки и обычными болями подъ ложечкой. Горячечныя явленія болѣзни миновались въ продолженіи нѣсколькихъ дней, но боль въ желудкѣ не проходила. При совершенномъ отсутствіи объективных признаковъ органическаго разстройства этой внутренности и крѣпкомъ, совершенно здоровомъ, видѣ больного можно было думать, что онъ притворяется. Сообразно съ болѣзненными явленіями были ставимы банки, употребляемы эмульсіи и прочія пособія; но бо-

лѣзнъ въ одинаковой степени, едва съ незначительными колебаніями признаковъ, продолжалась до 26 Ноября; въ этотъ день больной рано утромъ найденъ былъ въ постели мертвымъ. — При вскрытіи тѣла оказалось, что полость живота была наполнена жидкою кровью, въ желудкѣ найденъ большой свертокъ запекшейся крови, по устраненіи его замѣчена была опухоль съ кровавымъ по срединѣ отверстіемъ. Ближайшее излѣдованіе обнаружило въ ней аневризмъ брюшной аорты, съ правой стороны сросшійся съ стѣнками желудка и лопнувшій по срединѣ. Самый желудокъ, а равно все прочіе органы были совершенно здоровы.

Въ уѣздной Скварской больницѣ Кіевской губерніи былъ пользованъ случай разширенія подкожной артеріи съ смертельнымъ исходомъ въ гангрену и разрывъ аневризматического мѣшка.

---

*Колотая сквозная рана въ грудь; — подкожная эмфизема; — исходъ въ выздоровленіе.*

14 Апрѣля поступилъ въ Тамбовскую больницу плѣнный Арабъ, съ двумя колотыми ранами въ плечо и третьею въ правую подмышковую сторону, полученными имъ въ ссорѣ въ день поступленія. Раны плеча не представляли никакихъ особенностей; грудная же рана, въ  $\frac{1}{2}$  дюйма длины, проникала между 3-мъ и 4-мъ ребрами въ грудную полость. Воздухъ проходилъ чрезъ нее со свистомъ при каждомъ вдыханіи и выдыханіи больного; кровотеченія изъ нея не было вовсе. При постукиваніи правой грудной половины слышался звукъ ясный и почти тимпаническій; при выслушиваніи — дыхательный звукъ оказывался замѣтно слабѣйшимъ, чѣмъ въ лѣвомъ легкомъ, а выдыханіе болѣе продолжительнымъ и почти бронхиальнымъ. Состояніе больного не обѣщало хорошаго исхода. Дыханіе было весьма часто и совершалось съ напряженіемъ, вдыхаемый воздухъ былъ холоднѣе нормальнаго. Притомъ



сильная тоска беспокоила больного, пульса его почти не было слышно. Все тѣло было холодное, преимущественно конечности, совершенно посинѣвшія. Около раны образовалась подкожная эмфизема, распространявшаяся на шею, всю правую половину груди и правое плечо. Немедленно по поступленіи больного въ больницу раны были соединены кровавымъ швомъ и за тѣмъ покрыты коллодіемъ; на грудь и плечо положены холодныя примочки. Изъ руки выпущенъ фунтъ крови; къ конечностямъ назначены горчичники и сухія припарки изъ горячаго овса. Утромъ повторено кровопусканіе въ томъ же количествѣ и прописана внутрь селитра въ льняномъ отварѣ съ вытяжкою бѣлены, снаружи — втираніе въ конечности сѣрой ртутной мази черезъ два часа по двѣ драхмы. 16 Апрѣля реакція приняла характеръ синюхальный; пульсъ сдѣлался твердымъ и ускореннымъ, показалась жажда, температура кожи возвысилась; вмѣстѣ съ тѣмъ дыханіе стало свободнѣе. Микстура была оставлена и вмѣсто ея дано 6-ть пріемовъ сладкой ртути по 2 грана. — 17-го. Состояніе больного очень удовлетворительно, испражненія изломъ съ кровью; показался кашель. Сладкая ртуть назначена по  $\frac{1}{2}$  грана чрезъ 2 часа. 18-го поносъ безъ крови. Въ заднихъ частяхъ праваго легкаго слышна крепитация, звукъ при постукиваніи тупѣе, чѣмъ въ лѣвой сторонѣ, дыхательный шумъ слабѣе. Порошки оставлены; вмѣсто ихъ назначена масляная эмульсія съ настойкой опія (12 капель на 6 унцовъ). 19-го снятъ шовъ, раны зажили первымъ натяженіемъ. 20 и по 24 были продолжаемы упомянутыя средства и кромѣ того по  $\frac{1}{8}$  грана укеусо-кислаго морфія на ночь по случаю кашля, который беспокоилъ больного особенно по ночамъ. 29 больноіи былъ выписанъ совершенно здоровымъ.

*Плеуритическій эксудатъ при лихорадочномъ худосочіи; изліяніе его наружу чрезъ фурункулъ; — смерть отъ истощенія.*

Въ Мозырскую уѣздную больницу Минской губерніи поступилъ больноіи, у котораго послѣ продолжительной перемежающейся

лихорадки, при явленіяхъ типознаго крѣза крови, показалаея незначительная боль груди, безъ характерпетическихъ признаковъ воспаления плеіры. Лечение ограничивалось по необходимости употребленіемъ палліативныхъ и успокоивающихъ средствъ. Въ продолженіи 10-ти дневнаго пребыванія больного въ больницѣ объемъ его груди значительно увеличился и обнаружались признаки эксудата въ полости ея; притомъ общее состояніе больного требовало употребленія укрѣпляющаго леченія, которое и было ему назначено. Спустя недѣли двѣ отъ обнаруженія грудной водянки на правой сторонѣ груди, около 6-го ребра, показалаея фурункулъ, прорвавшійся на 9-й день; изъ отверстія его началъ выходить въ значительномъ количествѣ гнойно-сывороточный вошючій эксудатъ съ виднымъ облегченіемъ дыханія. Пять дней продолжалось это отдѣленіе плеіритическаго выпота чрезъ наружное отверстіе нарыва, съ виднымъ истощеніемъ силъ больного, окончившимся наконецъ смертію его.

Вскрытія тѣла къ сожалѣнію сдѣлано не было.

Въ Путивльской больницѣ Курской губерніи у больного грудною водянкою между 5-мъ и 6-мъ ребромъ впереди правой лопатки образовался нарывъ, величиною въ половину куриного яйца. По проколѣ его оказалось, что онъ сообщался съ грудною полостію; въ слѣдствіе чего въ теченіи 6-ти дней вышло чрезъ его отверстіе изъ груди болѣе 5 фунтовъ жидкаго гнойвиднаго эксудата. На 8 день отъ прокола нарыва больной умеръ.

---

*Приращеніе желудка къ поджелудочной железн и печени; — сообщеніе его полости съ кавернозными ходами въ сущестъ этой послѣдней внутренности и съ мѣшечкатыми разширеніемъ поджелудочной железы; — Исходъ въ смерть отъ воспаления брюшины.*

Больной съ признаками воспаления брюшины прибылъ въ Воронежскую больницу, гдѣ по истеченіи 30 часовъ умеръ. По



вскрытія тѣла его найдено, что передняя стѣнка желудка, близъ выхода, была приращена къ покрывающей ее Шпигеліевой доли печени, вслѣдствіе предшествовавшаго воспаленія и нагноенія въ этой послѣдней; при чемъ изъ желудка образовался ходъ, діаметромъ въ толщину средняго пальца, чрезъ приросшее мѣсто въ существо Шпигеліевой доли печени. Длина хода была около двухъ дюймовъ; внутренняя поверхность его была выстлана какъ бы слизистою оболочкою; приближаясь къ желчнымъ протокамъ, онъ раздѣлялся на двѣ вѣтви, которыя, — несоединившись впрочемъ съ протоками, — оканчивались слѣпыми мѣшками. На задней стѣнкѣ желудка, вблизи большой его кривизны, найденъ другой ходъ, едва пропускавшій конецъ мизинца и оканчивавшійся въ мѣшчатое разширеніе поджелудочной железы, не далеко отъ ея головки. Здѣсь стѣнки желудка оказались приросшими къ серозному покрову поджелудочной железы, но не вездѣ одинаково плотно, такъ что въ одномъ мѣстѣ, гдѣ приращеніе было весьма слабо, произошелъ разрывъ: вслѣдствіе чего пищевая смѣсь проникла въ брюшную полость и быстро развились признаки послѣдовательнаго воспаленія брюшины съ смертельнымъ исходомъ.

Что касается до хода самой болѣзни, произведшей это разстройство, то, какъ изъ анамнеза оказалось, еще за долго до поступленія въ больницу больной страдалъ какою-то внутреннею болѣзнію, но въ послѣдствіи отъ нея выздоровѣлъ. За нѣсколько часовъ до прибытія въ больницу онъ обѣдалъ съ большимъ аппетитомъ, послѣ чего у него сдѣлалась рвота и сильная боль въ животѣ.

*Заворотъ кишекъ; внутреннее употребленіе живой ртути; — исходъ въ выздоровленіе.*

Больной, 38 лѣтъ отъ роду, малаго роста, здороваго крѣпкаго тѣлосложенія, за два дня до поступленія въ больницу, непосредственно послѣ поднятія тяжелаго предмета, почувствовалъ боль въ лѣвой сторонѣ брюха: сначала она показалась ему переходящею,

но въ теченіи слѣдующаго дня начала являться чаще и сильнѣе и, сдѣлавшись постоянною, не допускала ни малѣйшаго прикосновенія къ животу, что и заставило больного искать врачебной помощи въ Вейсенштейнской больницѣ Эстляндской губерніи. При поступленіи его было замѣтно на животѣ, на лѣво отъ пупа, вздутое мѣсто, величиною въ половину большаго кулака; оно имѣло нѣсколько возвышенную температуру и не допускало прикосновенія по причинѣ сильной боли. Кромѣ упомянутой боли въ животѣ, простиравшейся и выше опухоли, больной жаловался на ознобъ во всемъ тѣлѣ, большое разслабленіе и разбитіе всѣхъ членовъ; позывы на низъ были часты, но въ продолженіи двухъ сутокъ испражненія не было. Голова больного была горяча, языкъ суховатъ, жажда сильна, пульсъ малъ, довольно твердъ и ускоренъ до 100 біеній въ минуту, сонъ безпокоенъ и съ томительными видѣніями, аппетита не было вовсе и каждая пища была больному противна. Назначено клещевинное масло, затѣмъ сладкая ртуть и промывательныя съ солью; къ животу же приставлено 8 кровососныхъ банокъ. 3 Сентября жаръ больного увеличился, пульсъ до 130 біеній въ минуту, животъ вздутъ сильнѣе, притомъ чувствительность его чрезвычайно возвышена: языкъ сухъ и по краямъ красноватъ, глаза и лице также красны, — испражненія не было. Больному сдѣлано кровопусканіе изъ руки въ количествѣ  $1\frac{1}{2}$  фунтовъ и поставлены промывательныя съ солью и белладонною; сверхъ того назначены втиранія сѣрой ртутной мази, горячія припарки изъ каши и внутрь сладкая ртуть въ большихъ приѣмахъ. — 4 Сентября; сна не было, больной очень безпокоенъ, пульсъ полонъ, до 90 біеній въ минуту, животъ вздутъ въ той же степени, но чувствительность его слабѣе, притомъ отрыжка и рвота. Назначены внутрь одна капля кротонава масла съ  $\frac{1}{8}$  грана уксуснокислаго морфія; сверхъ того соленныя промывательныя съ вытяжкою белладонны и теплая ванна. — 5 Сентября испражненія не было, признаки болѣзни усиливаются, рвотою извержены вониціи массы, пульсъ 74; внутрь назначены ледяныя пилюли и кротонаво масло съ уксуснокислымъ морфіемъ, снаружи промывательныя изъ свинцовой воды черезъ каждыя 4 часа, при-



парки изъ каши и теплая ванна. — 6 Сентября; состояніе больного еще хуже: пульсъ замедленъ, притомъ полонъ и твердъ. Лице сильно покраснѣло, черты его исказились, безпокойство дошло до послѣдней степени, испражненія изомъ все еще не послѣдовало. Больному дано внутрь  $\frac{1}{2}$  фунта живой ртути. Черезъ часъ послѣ того показался позывъ на низъ и послѣдовало испражненіе огромнаго количества нечистотъ съ сильнѣйшимъ запахомъ; вечеромъ того же дня былъ еще два испражненія. Внутрь больному назначены приѣмъ кротонава масла съ морфіемъ и ледяныя пилюли; изъ наружныхъ средствъ были продолжаемы припарки на животъ. 7 Сентября; больной спалъ хорошо, пульсъ его не много сильнѣе, рвота прекратилась, краснота въ лицѣ, тоска и безпокойство уменьшились, языкъ сдѣлался влажнѣе, но животъ еще нѣсколько вздутъ; хотя въ продолженіи дня и было еще одно испражненіе изомъ, но тѣмъ не менѣе больному опять данъ приѣмъ кротонава масла съ морфіемъ и назначены теплыя сухія припарки. — 8 Сентября; состояніе больного вообще хорошо, только жалуется онъ на сильную слабость; ангіститъ появился; употребленіе внутреннихъ средствъ оставлено; изъ наружныхъ назначены втиранія деревяннаго масла въ животъ. Послѣ того мало по малу совершалось выздоровленіе больного, отравленія пищеваренія сдѣлались нормальными и возвратились сонъ и аппетитъ больного; 17 Сентября онъ выпиcанъ въ совершенно удовлетворительномъ состояніи.

Въ уѣздной Тихвинской больницѣ Новгородской губерніи въ одномъ случаѣ заворота кишекъ была также употребляема живая ртуть, но безъ успѣха. Больной умеръ на 35-й день болѣзни. При вскрытіи тѣла его оказалось, что нарушеніе правильности положенія было въ подвздошной кишкѣ и принадлежало къ разряду внутреннихъ вынаженій (*invaginatio*), при чемъ верхняя часть опустилась въ нижнюю. Въ Астраханской больницѣ было подобное наблюденіе, окончившееся также смертію; здѣсь, какъ показало вскрытіе, нижняя часть ободочной кишки во-

шла въ слѣдную и была ею обхвачена; обѣ онѣ найдены въ гангренозномъ состояніи.

Въ Рыльской больницѣ Курской губерніи былъ случай внутренняго ущемленія кишекъ (strangulatio interna) отъ заворота, обнаружившагося у совершенно здороваго субъекта, непосредственно послѣ употребленія пищи. Смертельный исходъ послѣдовалъ чрезъ 2 сутокъ. При вскрытіи тѣла оказалось слѣдующее:

Двѣнадцатиперстная кишка отъ выхода изъ желудка до прикрѣпленія къ печени натянута и обхвачена раздутою тощею кишкою, которая, проходя по ней и выходу желудка, образовывала петлю, обращенную выпуклостію впередъ и вверхъ и сходящуюся концами своими у послѣдняго. — Ниже ущемленія кишечный каналъ былъ пустъ. Желудокъ раздутъ, съ отолевшими стѣнками и расположенъ спереди поперекъ живота съ лѣва на право. Объемъ его до того увеличенъ, что почти половина брюшной полости имъ занята. Внутри его большое количество пищевой смѣси съ кусками еще непереварившейся говядины. Слизистая оболочка желудка нѣсколько размягчена; сосуды сильно гиперемизированы. Взаимно-ущемленные органы въ гангренозномъ помертвѣніи.

Въ Екатеринбургской больницѣ встрѣтился случай ущемленія тонкихъ кишекъ, около перехода въ толстыя, въ самой брызжейкѣ; ущемленная петля имѣла 3 вершка длины.

*Ограниченное воспаленіе брюшины отъ ушиба, съ исходомъ съ помертвѣніе, прободеніе подвздошной кишки и смерть.*

Больной, 64-го года отъ роду, получилъ въ ссорѣ сильный ударъ кулакомъ въ животъ, отъ котораго упалъ въ сильномъ испугѣ и съ предчувствіемъ скорой смерти. Чрезъ полчаса послѣ событія



поступилъ онъ въ Венденскую больницу Лифляндской губерніи: животъ былъ увеличенъ въ объемъ, напряженъ и особенно чувствителенъ; притомъ у больного необыкновенная слабость, языкъ и конечности холодныя, пульсъ особенно малъ; по этимъ признакамъ врачъ предположилъ, что вѣроятно, въ слѣдствіе разрыва какого нибудь внутренняго органа, произошло обильное кровоизліяніе въ полость живота. Вмѣстѣ съ тѣмъ сильныя боли, особенная чувствительность живота и рвоты обличали воспаленіе брюшины. Лечение было назначено противовоспалительное, именно кровопусканіе и снаружи холодныя примочки. При этомъ всѣ болѣзненные явленія нѣсколько ослабѣли и пульсъ поднялся, но наступили затрудненія въ отдѣленіи мочи. Это продолжалось недолго; скоро вновь возвратились боли въ усиленной степени, раздутіе живота сдѣлалось значительнѣе и при быстромъ упадкѣ силъ, холодъ и снѣгъ конечностей, но въ полномъ сознаніи, больной умеръ чрезъ 30 часовъ по полученіи удара.

При вскрытіи живота найдены въ брюшной полости два круглыхъ глиста; одинъ изъ нихъ вышелъ совсѣмъ, другой только на половину длины своей изъ кишечной полости; въ нижней задней части полости живота изліяніе большаго количества жидкихъ экскрементовъ. Обѣ пластинки брюшки воспалены и покрыты гноемъ пластическаго свойства. Центромъ этого воспаленія было на право и внизъ отъ пупа ограниченное, едва равное размѣру 10-ти копѣечной монеты, пространство, на которомъ подвздошная кишка во всю толщину свою была разрушена въ слѣдствіе перешедшаго въ антоновъ огонь воспаленія наружнаго серознаго покрова ея, безъ признаковъ самостоятельнаго и первичнаго страданія слизистой оболочки. Кругомъ на этомъ мѣстѣ не было и слѣдовъ зараженія пластическимъ экссудатомъ. Всѣ прочіе органы живота были въ совершенно нормальномъ состояніи; только серозная оболочка почекъ представляла признаки воспалительной инъекціи сосудовъ, мочевоіъ же пузырь былъ сильно сжатъ и не содержалъ въ себѣ ни капли мочи.

*Мозговой ракъ печени и сальника; — водянка живота; —  
исходъ въ смерть.*

Больная, 40 лѣтъ отъ роду, въ теченіи послѣдняго полутора года дважды имѣла брюшную водянку, отъ которой ее излечили молочною діэтой и внутреннимъ употребленіемъ препаратовъ хины. За нѣсколько времени до поступленія въ Житомирскую больницу вновь обнаружилось у нея накопленіе огромнаго количества эксудата въ полостяхъ груди и живота, съ необыкновеннымъ беспіемъ, худобою и ослабленіемъ питательныхъ отправленій. Кожа больной была постоянно суха и отличалась землянистымъ, почти темнымъ цвѣтомъ; пульсъ малъ и слабъ, лихорадочныхъ явленій не замѣтно. Кромѣ того больная постоянно жалуется на ноющее чувство подъ ложечкой и на чувствительную боль въ правомъ боку и надпупочной сторонѣ живота. — Въ больницѣ прожила она только 11 дней.

Вскрытіе тѣла ея обнаружило слѣдующія измѣненія: Въ полости живота до 120 фунтовъ серознаго, желтоватаго эксудата, съ бѣлыми, фибринозными клочьями, мѣстами плотно пристающими къ утолщенной и уплотненной брюшинѣ. Серозный покровъ печени морщиноватъ, не прозраченъ и покрытъ утолщенными, похожими на сухожильныя, пятнами, круглаго очертанія, величиною около 10 копѣечной монеты. Существо печени темнѣе нормальнаго; въ правой долѣ ея разсѣяны мозговки въ сыромъ періодѣ, величиною отъ горошины до большаго орѣха. Сальникъ сложенъ, какъ вѣеръ, въ капатикъ, толщиною въ мизинецъ, длиною въ 4 дюйма; цвѣтъ его блѣдно-мясной, существо уплотнено въ слѣдствіе мозговиднаго перехода. — Сердце пусто и крайне атрофировано; легкія безкровны. Въ полостяхъ плеіры серозное выпотѣніе свѣтлаго желтоватаго цвѣта.

Въ другомъ случаѣ въ той же больницѣ отложеніе мозговиднаго рака ограничивалось одною печенью.

Набложеній гидатидовъ этой внутренности приведено 5. Въ одномъ изъ нихъ, принадлежащемъ Харьковской



больницѣ, больной, изнуренный и ослабленный, поступилъ съ признаками воспаления праваго легкаго и немѣрнымъ увеличеніемъ объема живота. При вскрытіи тѣла его правое легкое было дѣйствительно найдено воспаленнымъ; притомъ объемъ его былъ не только не увеличенъ, но даже значительно менѣе лѣваго легкаго отъ сдавленія печенью, увеличенною болѣе, чѣмъ вдвое нормальной величины въ вертикальномъ размѣрѣ. Въ существѣ ея у наружнаго края, подлѣ праваго подреберья, находилась полость, величиною въ большой кулакъ, наполненная множествомъ гидатидовъ, величиною отъ горошины до лѣснаго орѣха. — Субъектъ наблюденія гидатидовъ въ Воронежской больницѣ страдалъ нѣсколько разъ перемежающеюся лихорадкою, въ слѣдствіе которой у него развилась водянка груди и живота. Гидатидозный мѣшокъ лежалъ на задней поверхности печени, глубоко вдаваясь въ существо ея, подлѣ самаго желчнаго пузыря, плотно соединяясь съ его стѣнками. Однихъ большихъ гидатидовъ было въ немъ не менѣе 60; мелкихъ же еще болѣе. Существо печени около него было въ слѣдствіе давленія блѣдно, безкрово и уплотнено; въ остальной части печени измѣненій не найдено; желчный пузырь содержалъ не большое количество густоватой темной желчи. — Изъ остальныхъ наблюденій этого рода одно принадлежитъ Кишиневской, другое Рязанской и послѣднее Кременчугской больницѣ. Здѣсь въ печени содержалось 19 отдѣльных мѣшковъ, наполненныхъ гидатидами.

*Сывороточно-мышеччатая опухоль сальника огромнаго размѣра, содержащая въ себѣ волосы и кости и перешедшая въ нагноеніе по прободеніи ея;—исходъ въ смерть отъ изнурительнаго поноса.*

Большая, крѣпкаго тѣлосложенія, не имѣвшая никогда дѣтей, лѣтъ 6 тому назадъ замѣтила постепенное увеличеніе живота сво-

его. Недостатокъ другихъ признаковъ беременности, а равно и продолженіе этого измѣненія за предѣлы возможнаго ея срока заставили больную обратиться къ помощи врачей. Изслѣдованіе обнаружило въ полости живота ея ограниченный обильный эксудатъ, непосредственно лежавшій подъ брюшными мышцами и растягивавшій полость, въ которой онъ помѣщался, на подобіе яйца съ широкимъ концомъ подъ ложечкой и узкимъ — надъ лобковыми костями. Подвздошныя стороны очевидно не участвовали въ образованіи этой опухоли и потому съ самаго начала было ясно, что мѣсто болѣзни не въ яичникахъ. А какъ опухоль занимала преимущественно средину живота, то и была признана за *сывороточно-мышечную опухоль сальника* (*cystis omenti*) тѣмъ болѣе, что ни чрезъ влагалище, ни чрезъ задній проходъ ея нельзя было достигнуть. Различные способы леченія и въ числѣ ихъ молочное не принесли никакой пользы: въ продолженіи двухъ лѣтъ опухоль, увеличиваясь постепенно, начала стѣснять дыханіе и причиняла сильныя боли подъ ложечкой, дѣлая притомъ невозможнымъ для больной всякое другое положеніе тѣла, кромѣ горизонтальнаго на спинѣ. Въ такомъ состояніи сдѣланъ былъ первый проколъ опухоли троакаромъ по бѣлой линіи живота, непосредственно ниже пупа, при чемъ вышло желтоватой, пѣнистой жидкости около 45 фунтовъ. Послѣ этого больная чувствовала облегченіе не болѣе, какъ на 5—6 дней; опухоль начала вновь обнаруживаться и въ 3 недѣли достигла прежней величины. Проколъ въ томъ же мѣстѣ былъ опять сдѣланъ; этотъ разъ вышло изъ него быстрою струею около 50 фунтовъ смраднаго гноя лимоннаго цвѣта съ фибринозными клочьями. Запахъ его былъ какъ отъ мертваго, совершенно стившаго, тѣла. Чрезъ двѣ недѣли больная совершенно выздоровѣла, постепенно окрѣпла и пополнѣла. — Чрезъ 17 мѣсяцевъ послѣ операціи она была доставлена въ Кіевскую больницу въ совершенномъ истощеніи и упадкѣ силъ отъ неудержимаго четвертый мѣсяць продолжавшагося поноса. Мышечная система ея тѣла была атрофирована, ноги въ опухшемъ состояніи; животъ былъ впалъ, въ немъ подъ бѣлою линіею ощущивалась плоская



опухоль, напоминавшая послѣдъ своимъ эллиптическимъ очертаніемъ; въ самой опухоли не было увеличенной чувствительности, но подъ ложечкой и въ подреберныхъ сторонахъ при изслѣдованіи были сильныя боли. Пульсъ больной былъ частъ и скоръ; — по вечерамъ она чувствовала ознобъ, а ночью являлись у нея проливные поты и поносъ усиливался; отъ пищи и питья она имѣла совершенное отвращеніе. Такое изнурительное состояніе, при полномъ присутствіи умственныхъ и душевныхъ способностей больной, продолжалось въ больницѣ 19 сутокъ, постепенно усиливаясь до крайняго истощенія, окончившагося смертію.

При вскрытіи брюшной полости найдена была мѣшеччатая опухоль, соответствовавшая центромъ своимъ пупку; верхній край ея граничилъ съ круглою связкою печени, нижній упирался въ бѣлую линію, не соединяясь впрочемъ съ нею нигдѣ, кромѣ мѣстъ прокола. Отверстій въ мѣшкѣ опухоли не было вовсе; — онъ имѣлъ форму сплюснутаго яйца, изумительно правильнаго очертанія; длина его равнялась  $4\frac{1}{2}$ , ширина 3 и толщина въ срединѣ  $1\frac{1}{2}$  вершкамъ. Легко было видѣть, что стѣнки мѣшка образованы были изъ патологически измѣненнаго существа салника, обратившагося въ твердую, гладкую, волокнистую и упругую ткань. Верхняя часть мѣшка переходила въ салникъ, остававшійся еще на 2 дюйма нормальнымъ; внизу же онъ сливался съ заднею поверхностію матки, лѣвою фаллопиевою трубою и ея яичникомъ, притянутыми вверхъ; существо ихъ при наружномъ изслѣдованіи съ трудомъ отличалось отъ опухоли. Стѣнки мѣшка ея въ разрѣзѣ имѣли плотность сходную съ существомъ матки, толщина ихъ спереди равнялась 7 линіямъ. Внутри мѣшка опухоли лежала симметрическая полость, наполненная вошючею массою, консистенціи густаго меду. Въ ней можно было отличить черновато-зеленые куски, напоминавшіе собою первородный калъ; рядомъ съ ними наверху и на лѣво куски черно-мяснаго цвѣта, довольно значительной плотности, похожіе на остатки послѣда, а выше ихъ и въ право комокъ черныхъ волосъ, погруженныхъ въ черномъ и густомъ гноѣ, и кусочки костей неопредѣленной формы. Сзади

опухли все брюшныя внутренности представлялись сросшимися между собою, въ слѣдствіе бывшаго здѣсь когда-то крупознаго воспаления брюшины ихъ.

---

*Брюшная водянка; нарывъ пупа; — опорожненіе эксудата  
черезъ отверстіе нарыва; выздоровленіе.*

Въ Брестскую больницу поступила на 6-й недѣлѣ послѣ родовъ женщина, лѣтъ 28, съ признаками большаго эксудата въ брюшной полости и съ водяною опухолью ногъ. Слабое тѣлосложеніе и упадокъ силъ больной заставляли сомнѣваться въ счастливомъ исходѣ болѣзни. Мочегонныя и разрѣшающія средства едва въ состояніи были уничтожить опухоль ногъ, но не имѣли ни малѣйшаго вліянія на уменьшеніе брюшнаго эксудата. Повидимому онъ имѣлъ воспалительное происхожденіе; но крайней мѣрѣ изъ разсказовъ больной обнаруживалось, что вскорѣ послѣ родовъ у нея была очень сильная боль во всемъ животѣ, при чемъ онъ сдѣлался твердымъ и вздутымъ; боль потомъ уничтожилась, а объемъ живота не только не уменьшался, но даже постепенно увеличивался, что и заставило ее искать врачебнаго пособія. Въ больницу были испытаны разнородныя, какъ внутреннія такъ и наружныя средства, но безъ пользы. На 3-й же недѣлѣ послѣ поступленія больной пупъ у нея сталъ припухать, подниматься и краснѣть; при употребленіи размягчающихъ средствъ на 3-й день этотъ нарывъ прорвался, причемъ вытекло за одинъ разъ около ведра сѣро-желтоватой, мутной, безъ особеннаго запаха, жидкости, съ видимымъ облегченіемъ для больной. Истеченіе, постепенно уменьшаясь въ количествѣ, продолжалось еще нѣсколько дней, а потомъ отверстіе закрылось и въ скоромъ времени больная, совершенно оправившись, оставила больницу.



*Періодическое возвращеніе водянки при Брайтовомъ состояніи почекъ, циррозъ печени и жировомъ перерожденіи мышечной ткани сердца; исходъ въ смерть.*

Больной Житомирской больницы, лѣтъ 28 отъ роду, пять лѣтъ сряду ежегодно заболѣвалъ водянкою съ смертельнымъ, какъ казалось каждый разъ, исходомъ и выздоравливалъ сверхъ всякаго ожиданія. Поводомъ къ возвратамъ болѣзни были злоупотребленіе спиртныхъ напитковъ и простуда, особенно ногъ. Со всякимъ возвратомъ признаки водянки продолжались долѣе и упорнѣе не уступали дѣйствію лекарствъ; при томъ каждый разъ моча была мутна, блѣдна, безъ запаха и съ азотною кислотою давала обильный бѣловатый осадокъ. Водяночная опухоль обыкновенно раздувала нижнія конечности и брюшную полость, но послѣдній разъ къ этому присоединилось накопленіе воды въ груди и задержаніе мочевого отдѣленія, ускорившія смертельный исходъ послѣдняго приступа болѣзни на 165 день отъ начала его.

При вскрытіи трупа почки найдены увеличенными въ объемъ и уплотнѣвшими, съ бѣлесоватыми выпуклостями на поверхности. Въ разрѣзѣ оказалось бѣлково-жировое перерожденіе ткани ихъ, красновато-молочнаго цвѣта, съ потерєю признаковъ различія существъ, притомъ съ значительною твердостію и блескомъ. Ни кровеносныхъ, ни мочевыхъ канальцевъ нельзя было болѣе отличить. Печень циррозная. Сердце разширено, мышечная ткань его блѣдно-желтовата отъ жирового же перерожденія; лѣвый желудочекъ пустъ, въ правомъ малые фибринозные свертки. Отѣкъ легкихъ и мозговой мякоти; водяныя накопленія въ серозныхъ полостяхъ и подкожной кѣлѣчаткѣ. Мускулатура тѣла блѣдная, атрофированная.

*Брайтова измѣненіе почекъ въ слѣдствіе перемежающейся лихорадки; — общая водянка; — исходъ въ выздоровленіе при молочномъ леченіи.*

Въ Вытегорской больницѣ Олонецкой губерніи былъ наблюдаемъ случай Брайтовой болѣзни въ слѣдствіе упорной и продолжи-

тельной перемежающейся лихорадки. Больной, 35 лѣтнаго возраста, страдалъ лѣтъ 10 тому назадъ въ теченіи 6 мѣсяцевъ ежедневною перемежающеюся лихорадкою и, находясь въ деревнѣ, не употреблялъ никакихъ средствъ для излеченія. При поступленіи въ больницу состояніе его было слѣдующее: лице землистаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ, старообразное, безжизненное и брюзглос, глаза томные, отдѣленія неправильны и уменьшены; постоянная боль головы; сонъ короткій и безпокойный; жаръ и сухость во рту, языкъ бѣлый съ возвышенными сосочками, аппетитъ слабый, послѣ употребленія пищи тяжесть въ желудкѣ; пульсъ слабый и скорый, постоянное уныніе и задумчивость. При изслѣдованіи живота постукиваніемъ замѣчался глухой звукъ на 1½ вершка ниже правыхъ ложныхъ реберъ; въ лѣвую сторону онъ простирался въ загрудную ложбинку и въ верхнюю часть живота. При ощупываніи замѣчалась твердость и увеличенная упругость въ сторонѣ печени, нижній край ея рѣзко осязался подъ пальцами; животъ былъ увеличенъ въ объемъ отъ скопленія эксудата, равномерно его наполнявшаго; ноги опухли, дыханіе затруднено, рѣчь прерывиста, голосъ сплывшій, силы больного слабы. Моча при изслѣдованіи азотною кпелотою и подогрѣваніемъ показывала присутствіе бѣлка въ огромномъ содержаніи; бѣлковый осадокъ занималъ половину объема мочи въ сосудѣ. Больной при вступленіи въ больницу былъ пользованъ испражняющими и укрѣпляющими средствами и хотя замѣчалось отъ нихъ нѣкоторое облегченіе, но болѣзнь не разрѣшалась, а потому всѣ они были оставлены и замѣнены исключительною молочной діетою. Послѣдствія этого леченія оказались вполне удовлетворительными: при постепенномъ увеличиваніи пріемовъ молока, больной въ двѣ недѣли замѣтно сталъ поправляться въ силахъ; цвѣтъ лица его сдѣлался свѣжѣе; общая обрюзглость и опухоль ногъ быстро исчезли, накопленіе воды въ животѣ стало постепенно уменьшаться, больной сдѣлался веселѣе и дѣятельнѣе. Съ каждымъ днемъ цѣлительное дѣйствіе молока болѣе и болѣе оказывало свое вліяніе, какъ на физическое состояніе здоровья, такъ и на настроеніе духа



больного; вмѣстѣ съ тѣмъ постепенно уменьшалось и наконецъ совершенно исчезло содержаніе бѣлка въ уринѣ.

Леченіе водянокъ *молокомъ* было испытано съ успѣхомъ и въ другихъ больницахъ. Въ томъ числѣ въ С.-Петербургской больницѣ чернорабочихъ оно назначалось въ 32 случаяхъ водянки полостей, при современномъ употребленіи другихъ средствъ и въ одномъ случаѣ безъ помощи ихъ. Изъ этого числа въ 25 оно сопровождалось благопріятнымъ исходомъ въ выздоровленіе, въ томъ числѣ одинъ больной, одержимый брюшною водяною, излеченъ въ продолженіи двухъ мѣсяцевъ однимъ молокомъ. Ни одинъ изъ выздоровѣвшихъ не представлялъ впрочемъ органическихъ разстройствъ сердца и печени. Въ Пензенской больницѣ исключительное употребленіе молока оказалось цѣлебнымъ въ 4 случаяхъ водянки послѣ перемежающейся лихорадки и въ Сумской (Харьковской губерніи) въ 4 же изъ 8 пользованныхъ имъ.

Внутреннее употребленіе *большихъ приѣмовъ рвотнаго камня* (до 8 гранъ на 6 унцовъ воды), предложенное противъ водянки Франковскимъ, было испытано въ больницахъ Одесской въ одномъ, Тобольской въ одномъ, Старобѣльской (Харьковской) въ 3, Звѣнигородской (Полтавской) въ 4, Валдайской (Новгородской) въ 5 и Сумской (Харьковской) въ 6, — всего въ 20 случаяхъ; изъ нихъ безъ успѣха въ 3 случаяхъ въ Звѣнигородской и 4 въ Сумской больницѣ, въ остальныхъ 13 съ успѣхомъ. Въ числѣ послѣднихъ находились преимущественно случаи водянки отъ перемежающейся лихорадки и воспалительнаго состоянія серозной оболочки полостей. Этотъ способъ леченія оказывался также полезнымъ въ больницахъ Тарской тюремной и Симферопольской; въ Полтавской же ни въ одномъ случаѣ не видѣли отъ него особеннаго успѣха.

Въ Пензенской больницѣ два случая водянки были

излечены внутреннимъ употребленіемъ теплаго настоя *Solidaginis Virgaureae* и одинъ спиртною настойкою *дубовыхъ жолудей*.

Въ Глуховской больницѣ Черниговской губерніи два случая водянки были излечены *молочнымъ отваромъ черной горчицы*.

Одинъ изъ больныхъ, 30 лѣтъ, посредственнаго тѣлосложенія, прибылъ въ больницу съ одышкою, значительно увеличеннымъ напряженнымъ животомъ, сильнымъ отѣкомъ половыхъ органовъ и ногъ и постояннымъ сухимъ кашлемъ. Напряжение покрововъ живота дѣлало невозможнымъ объективное изслѣдованіе печени и селезенки; въ сердцѣ не оказывалось никакихъ измѣненій. Кромѣ того у больного по нѣскольку разъ въ мѣсяцъ въ неопредѣленные сроки являлись эпилептическіе припадки. Послѣ продолжительнаго употребленія молока и врачебныхъ средствъ, дѣйствующихъ на кожу, кишечный каналъ и почки, болѣзнь ни мало не ослабѣвала; страданія больного вынудили врача сдѣлать прободеніе живота, при чемъ въ три раза выпущено около 40 фунтовъ эксудата водянистаго съ слабымъ содержаніемъ бѣлковины. Скоро послѣ того онъ вновь образовался. Тогда больному былъ назначенъ отваръ двухъ драхмъ тертой черной горчицы въ 3 фунтахъ свѣжаго коровьяго молока для суточного употребленія. При двух-недѣльномъ леченіи этимъ средствомъ больной совершенно поправился. Другой больной посредственнаго, лимфатическаго сложенья, 34 лѣтъ отъ роду, поступилъ въ больницу 28 Октября съ перемежающеюся трехдневною лихорадкою, увеличеніемъ объема печени и незначительнымъ отѣкомъ ногъ; отъ 15 гранъ сѣрно-кислаго хинина лихорадка прошла, но опухоль ногъ начала увеличиваться и за тѣмъ животъ и клѣтчатка половыхъ органовъ наполнились эксудатомъ; употребленіе слабительныхъ, потогонныхъ и мочегонныхъ средствъ оставалось безъ успѣха. Послѣ 8 дневнаго употребленія вышеописаннаго средства больной совершенно выздоровѣлъ и выпиcанъ 27 Ноября.

Въ несравненно большей части случаевъ пользованіе



водяноктъ было располагаемо сообразно видимымъ или предполагаемымъ причинамъ ихъ происхожденія, — сопровождавшимъ ихъ разстройствамъ внутренностей и общему состоянію соковъ организма. При водянкахъ, образовавшихся въ слѣдствіе перемежающихся лихорадокъ, оказывалось особенно важнымъ сообразовать назначеніе врачебныхъ пособій съ дальнѣйшимъ ходомъ патологическихъ состояній во внутренностяхъ живота отъ отложенія лихорадочнаго эксудата.

При обнаруженіи въ нихъ признаковъ воспалительнаго раздраженія, явившихся періодически въ большей или меньшей степени почти у каждаго больного этой категоріи, требовалось постоянное употребленіе *противу-воспалительныхъ* средствъ, иначе раздраженіе легко переходило на брюшину и, независимо отъ успленія опасности для жизни больного, содѣйствовало увеличенію водяночнаго скопленія въ полости живота. Вновь отдѣляющійся эксудатъ въ этихъ случаяхъ, по наблюденіямъ принадлежащимъ Тамбовской больницѣ, обыкновенно представлялся болѣе покрашеннымъ кровавымъ цвѣтомъ, клейкимъ и содержавшимъ большее количество бѣлыхъ клочковъ сгущеннаго фибрина. — Появленіе въ продолженіи водянки малѣйшихъ признаковъ перемежающейся лихорадки требовало немедленнаго употребленія *хинина*, вмѣстѣ съ *наперсточною травою* и *двустрипистою сурьмою*. Гдѣ этихъ признаковъ не было, тамъ хининъ въ водянкахъ вовсе не помогалъ. Наперсточная трава назначалась притомъ въ малыхъ приемахъ (по  $\frac{1}{4}$  грана); въ началѣ и приемы сурьмы были также малы, но въ послѣдствіи ихъ должно было увеличивать. — При отсутствіи лихорадочныхъ признаковъ леченіе преимущественно состояло изъ употребленія *разводящихъ средствъ* (*Eatr. Graminis, Cichorei, Rhei, taraxaci*) и наружныхъ *раздраженій*

*селезеночной стороны. Въ нѣсколькихъ случаяхъ водянки отъ лихорадокъ отлично дѣйствовало желѣзо.*

Въ леченіи Брайтовой болѣзни назначались, сообразно показаніямъ, *листья и обція кровопусканія и сладкая ртуть*; — потогонныя, особенно *миндереровъ спиртъ, инекакуана, камфора, возбуждающія обтиранія тѣла и ароматическія ванны*; — *іодъ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ больной еще не потерялъ силъ*; — *іодистая ртуть* (protojoduretum hydrargyri), гдѣ не было признаковъ скорбута, гидрэмии и сильной слабости; — *іодистое желѣзо* (ferrum jodatum) при сильныхъ гидрэмическихъ явленіяхъ и большой слабости больного, а также послѣ употребленія предъидущаго средства; — *соляная и азотная кислота* при ограниченномъ отдѣленіи урины, тяжести головы и тошнотахъ; — *укрѣпляющія средства*, гдѣ эксудатъ еще не былъ особенно обильнъ; но силы больного значительно упали; наконецъ изъ наружныхъ пособій *щелочныя ванны и листья раздраженія почечной стороны.*

*Мочевой камень, занимавшій всю полость пузыря; исходъ въ смерть отъ истощенія.*

Больной, 29 лѣтъ отъ роду, посредственнаго тѣлосложенія, въ сильной худобѣ тѣла поступилъ въ Астраханскую больницу съ труднымъ испражненіемъ мочи при постоянныхъ къ оному позывахъ, обычными запорами на низъ, слабостію силъ, потерей аппетита и безсонницею. При изслѣдованіи мочевыхъ путей его катетеръ средней величины въ самой шейкѣ пузыря упирался въ твердое тѣло, совершенно преграждавшее проходъ въ полость его и при постукиваніи издавалъ металлическій звукъ, что явно обнаружило присутствіе въ мочевомъ пузырьѣ камня, плотно прилегающаго къ шейкѣ. По невозможности катетеромъ опредѣлить величину его произведено изслѣдованіе чрезъ прямую кишку, при чемъ ощущался камень, занимавшій всю окружность пузыря, какую




только можно было прослѣдить посредствомъ пальца. При томъ онъ былъ такъ великъ и тяжелъ, что пальцемъ не было возможности поднять и сколько нибудь перемѣнить его положеніе. Отдѣлявшаяся почти каплями моча больного была блѣдна, имѣла сильный запахъ и содержала бѣлые свертки, которые чрезъ нѣсколько времени въ ней же растворялись.

Изъ разспросовъ оказалось, что больной еще съ дѣтства страдалъ затрудненіемъ при испражненіи мочи, но какъ эти припадки были легки, встрѣчались рѣдко и скоро проходили, то онъ къ врачебному пособию не обращался. Съ увеличеніемъ возраста его они возвращались чаще, но также скоро проходили. Послѣ совершеннолѣтія учащаяся еще болѣе, они сдѣлались мучительными, что заставляло его прибѣгать къ употребленію водки въ большомъ количествѣ; при опьяненіи припадокъ обыкновенно проходилъ сномъ при непроизвольномъ испусченіи мочи. За годъ до поступленія въ больницу припадки затруднительнаго испражненія мочи сдѣлались весьма часты и до того мучительны, что заставляли больного лежать сутокъ по двое въ постели и водка уже не приносила облегченія; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ слабѣлъ и худѣлъ. Въ два послѣдніе мѣсяца мочеиспущеніе было постоянно мучительнымъ, лишало его аппетита, сна и сложило въ постель, въ какомъ состояніи онъ и поступилъ въ больницу. Сильная степень изнуренія больного и величина камня служили противопоказаніемъ къ производству операціи; леченіе ограничивалось облегченіемъ по возможности болѣзненныхъ припадковъ. Чрезъ 3 недѣли отъ поступленія въ больницу больной умеръ въ припадкахъ изнурительной лихорадки.

При вскрытіи тѣла въ мочевомъ пузырьѣ найдены два камня, одинъ яйцеобразный, величиною въ гусиное яйцо, другой полушарообразный, очертанія разнѣзнаго шара съ вогнутой поверхностію поперечнаго разрѣза; они лежали свободно одинъ на другомъ, яйцеобразный (Таб. 1 фиг. 1. в.) нижнею поверхностію былъ обращенъ къ дну пузыря, а верхнею прилегалъ къ вогнутой поверхности полушарообразнаго камня (фиг. 1. а), котораго выпуклая







верхушка лежала въ самой шейкѣ. Отъ взаимнаго тренія соприкасавшихся поверхностей на камняхъ образовались овальныя углубленія различнаго размѣра. Емкость пузыря была значительно уменьшена. Оболочки его гипертрофированы, существо уплотнено, внутренняя поверхность мозолиста (*mamelonnée*). Въ почкахъ не было измѣненій; толстыя кишки въ сильномъ воспалительномъ состояніи съ мѣстнымъ помертвѣніемъ. — Яйцеобразный камень вѣсилъ 8 унцовъ и 3 драхмъ; полушарообразный 8 унцовъ и 3 драхмы; оба вмѣстѣ 17 унцій или  $1\frac{1}{16}$  гражданского фунта.

Эти рѣдкіе по огромной величинѣ камни были доставлены въ Медицинскій Департаментъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и имъ подвергнуты химическому изслѣдованію.

По распиленіи въ вертикальномъ направленіи полушарообразнаго камня (фиг. 1. а) оказалось, что онъ состоялъ изъ множества тонкихъ, толщиною въ писчую бумагу, концентрическихъ слоевъ желтовато-бѣлой кристаллической массы, изъ коихъ образовались отдѣльные слои до полутора линій толщины. Въ срединѣ камня находилась небольшая сердцевина, желтобураго цвѣта, безъ кристаллическаго сложенія. Расположеніе ея и отдѣльных слоевъ представлено въ увеличенномъ видѣ на фиг. 2. Таб. 1.

Изъ предварительнаго качественного химическаго изслѣдованія оказалось, что слои въ составѣ своемъ не имѣли между собою особеннаго замѣчательнаго различія. А потому для количественнаго разложенія взяты частицы отъ разныхъ слоевъ камня, стерты вмѣстѣ и полученные по изслѣдованію результаты вычислены на 100 частей камня.

Разложеніемъ найдено:

Фосфорнокислой извести ( $3\text{CaO} \cdot \text{PO}_5$ ) . . . . .	26,11
» Аммоніакальной магнезій . . . . .	63,78
Углекислой извести . . . . .	1,50



Растворимаго въ эфирѣ и въ спиртѣ жирнаго вещества бурога цвѣту. . . . .	0,57
Растворимыхъ въ водѣ частей краснобурога цвѣту. . . . .	2,67
Воды и потери . . . . .	5,37
	100,00

Сердцевина камня подвергнута только качественному изслѣдованію, по которому она оказалась состоящею преимущественно изъ вышеозначенныхъ фосфорнокислыхъ солей, органическаго вещества темнобурога цвѣта и, что замѣчательно, щавелевокислой извести; но въ слѣдующемъ за сердцевиною первомъ слоеъ камня этой послѣдней не оказывалось.

Отъ лѣцеобразнаго камня подвергнуты только частицы поверхности качественному изслѣдованію; оно привело къ заключенію, что химическій составъ его почти одинаковъ съ первымъ.

Въ числѣ прочихъ случаевъ камня замѣчательно наблюдение, принадлежащее Тамбовской больницѣ, въ которомъ у 16-ти-лѣтняго мальчика, страдавшаго каменной болѣзнію 11 лѣтъ, пузырь былъ совершенно наполненъ камнями неправильной многогранной формы и различной величины; одинъ изъ нихъ въ грецкой орѣхъ лежалъ свободно, остальные, болѣе мелкіе, приставали къ стѣнкамъ пузыря и сообщали ему видъ грота, обложеннаго камнями; легкаго насилія было достаточно для вылученія ихъ. Всѣ вмѣстѣ они вѣсили  $2\frac{1}{2}$  унца. Случай этотъ подвергнутъ былъ операціи съ благополучнымъ исходомъ. — Въ Нижегородской больницѣ у умершаго отъ каменной болѣзни при вскрытіи нашли въ мочевомъ пузырьѣ, кромѣ камня, грибовидный наростъ; при томъ мочеточники были чрезвычайно расширены, а почки, вслѣдствіе атрофіи существа, обращены въ значительной части своего объема въ порожніи плевистыя сумки.

Въ леченіи застарѣлой подагры въ Харьковской больницѣ было съ успѣхомъ испытано внутреннее употребленіе фосфорнокислаго аммонія; для этой цѣли одна драхма углекислаго аммонія разводилась въ 6 унцахъ воды и насыщалась фосфорною кислотою; смѣсь съ прибавленіемъ сиропоу давалась чрезъ 2 часа по столовой ложкѣ.

*Гипертрофія печени, усложненная опухолью яичника;— исходъ въ выздоровленіе при употребленіи Сергіевскихъ минеральныхъ ключей.*

Больная, 44 лѣтъ, съ весьма давнихъ поръ страдала болѣзнію печени и съ послѣдніе полгода начала ощупывать у себя въ правой подвздошной сторонѣ опухоль. Въ продолженіе 19 лѣтняго замужства она имѣла только одно дитя и то 5 лѣтъ тому назадъ. Съ тѣхъ поръ мѣсячное очищеніе хотя и являлось правильно чрезъ каждыя 26 дней, но значительно уменьшилось. При осмотрѣ больной оказалось, что печень ея была нѣсколько увеличена въ объемъ и очень тверда на ощупь. Сверхъ того животъ больной былъ нѣсколько увеличенъ съ низу съ правой стороны, гдѣ при осязаніи глубоко въ правой подвздошной сторонѣ ощущалась кругловатая опухоль, величиною въ куриное яйцо; больная при томъ чувствовала въ этомъ мѣстѣ тупую боль. Съ самаго начала еѣ было назначено внутреннее употребленіе Сергіевской воды по 3 фунта въ день и ванны утромъ изъ простой сѣрной воды въ 30°, а вечеромъ съ прибавленіемъ 4 ведеръ сѣрнаго пла въ 31° тепла, причемъ, сидя въ ваннѣ, больная растирала себѣ животъ теплымъ пломъ. Послѣ трехъ недѣльнаго употребленія водъ безъ видимой причины появились у нея лихорадочные припадки съ желчнымъ поносомъ; тогда какъ внутреннее, такъ и наружное употребленіе водъ должно было остановить. Чрезъ недѣлю по прекращеніи этихъ припадковъ, при новомъ осмотрѣ больной оказалось, что печень ея пришла въ нормальные размѣры и потеряла болѣзненную плотность, а опухоль правой подвздошной стороны едва можно



было ощущать въ самой глубинѣ живота. Больная снова начала употреблять ильныя ванны съ натираніемъ живота пломъ, и при этомъ пила искусственную Эмскую воду по 4 стакана въ день; по прошествіи еще четырехъ недѣль яичникъ уменьшился до своего нормальнаго состоянія, такъ что его нельзя было болѣе ощущать.

*Неправильные роды; послѣдовательный выходъ разложившагося младенца чрезъ разъединеніе стѣнокъ живота; — фистула кишекъ; — исходъ въ выздоровленіе.*

Крестьянка средняго тѣлосложенія, 30-ти лѣтъ отъ роду, забеременѣла въ седьмой разъ. Всѣ предыдущіе роды ея были благополучны. Начало послѣдней беременности она относитъ къ половинѣ Сентября 1855 года; по крайней мѣрѣ въ это время въ послѣдній разъ было у нея мѣсячное очищеніе; первое движеніе плода она почувствовала 2-го Февраля 1856 года и за тѣмъ во все продолженіе беременности не обнаруживалось никакихъ болѣзненныхъ явленій. Въ половинѣ Іюня 1856 года появились у роженицы потуги, на другой день стекли плодныя воды и въ слѣдъ за ними хлынула кровь въ огромномъ количествѣ. Призванная деревенская повитуха, по принятому обыкновенію, водила родильницу по комнатѣ до тѣхъ поръ, пока она еще была въ состояніи стоять на ногахъ, а затѣмъ положила ее на постель. Вскорѣ послѣ того кровотеченіе остановилось и вмѣстѣ съ тѣмъ прекратились родовыя боли; младенецъ, какъ казалось больной, поднялся вверхъ. Спустя нѣсколько дней начался жесточайшій боли въ животѣ, пронесходившія отъ сильныхъ порывистыхъ движеній младенца и при появленіи незначительныхъ потугъ, выпелъ послѣдъ изъ рукава матки съ пуповиною, уже поврежденные гниlostію; за тѣмъ боли скоро кончились, роженица успокоилась и кромѣ слабости, тяжести въ животѣ и нѣкотораго въ немъ холода ничего не чувствовала. На восьмой день выше пупка къ правой сторонѣ оказалось у нея небольшое возвышеніе, на срединѣ котораго образовался багровый пузырь. Возвышеніе, постепенно увеличиваясь,

при ужаснѣйшихъ страданіяхъ больной, достигло величины большаго арбуза, получило багровый цвѣтъ и въ концѣ пятой недѣли отъ появленія, безъ всякихъ постороннихъ содѣйствій, вскрылось, образовавъ такимъ образомъ отверстіе въ брюшную полость около четверти аршина въ діаметрѣ. Въ этомъ отверстіи явственно обнаружился полусогнувшій, совершенно развитый младенецъ, обращенный головкою къ предсердію матери, съ ножками прижатыми къ брюшку; больная, при пособіи своей матери безпрепятственно вынула младенца, на отверстіе же наложила масляную ветошку. — Послѣ того, какъ изъ него, такъ и чрезъ маточный рукавъ выходила гноевидная жидкость, постепенно уменьшаясь въ количествѣ своемъ. Въ этомъ состояніи сдѣланъ былъ первый врачебный осмотръ больной: состояніе ея здоровья было довольно хорошо, пульсъ правленъ, аппетитъ хорошъ, языкъ довольно чистъ. При наружномъ изслѣдованіи оказалось, что груди и соски больной, правильно устроенные, были нѣсколько припухшими отъ содержавшагося въ нихъ молока, *corpuscula Montgomery* на соскахъ были явственны; строеніе таза довольно хорошо; животъ неровный, сморщенный и около мѣста разъединенія стѣнокъ живота втянутый, внутри въ послѣднемъ видна часть выпавшей кишки съ мозолистымъ отверстіемъ, черезъ которое у больной, обыкновенно по два раза въ день, выходитъ полужидкій, зеленоватый безъ всякаго запаха экскрементъ; эта выпавшая часть кишки сверху приросла къ стѣнкамъ наружнаго отверстія живота; внизу же, между нѣю и свободною частию кишки, непрестанно вытекаетъ жидкая гноевидная матерія; теченіе ея черезъ рукавъ матки совершенно прекратилось. При ручномъ изслѣдованіи и даже довольно сильномъ прижатіи живота, больная не чувствуетъ ни малѣйшей боли. Выходъ нечистотъ изъ прямой кишки былъ у больной только однажды, вслѣдствіе испуга; отправленія мочевыхъ путей правильны, мѣсячнаго очищенія еще не было. Внутренняго акушерскаго изслѣдованія, а равно и операціи, по несогласію на то больной, сдѣлать было нельзя.

Была ли это виѣматочная беременность, или во время



родовъ послѣдовалъ разрывъ существа матки съ удаленіемъ младенца въ брюшную полость, опредѣлить невозможно по совершенному недостатку данныхъ объективнаго наблюденія и изслѣдованія роженицы до родовъ и въ продолженіи оныхъ.

Изъ видовъ отравленія несравненно чаще другихъ попадались случаи *угара*. Изъ большого числа ихъ приводимъ слѣдующее наблюденіе:

18 Октября, въ 10 часовъ утра, поступили въ Орловскую больницу три крестьянина въ безчувственномъ отъ угара состояніи. Наканунѣ легли они спать, вмѣстѣ съ 5-ю своими товарищами, въ спльно натопленной и угарной кухни. По тѣснотѣ помѣщенія одинъ долженъ былъ лечь на печи, пятеро у стѣнъ кухни, а двоимъ пришлось помѣститься около самаго выхода. Ночью одинъ изъ послѣднихъ отъ безноконнаго сна пробудился и отворилъ наружную дверь, но какъ только холодный воздухъ обхватилъ его, то упалъ безъ чувствъ и движеній и уже съ разсвѣтомъ очнувшись, увидѣлъ подлѣ себя другаго товарища въ такомъ же состояніи. — Изъ остальныхъ шести, остававшихся въ кухнѣ всю ночь, трое умерли и трое найдены въ глубоко-сопородномъ состояніи, въ каковомъ и доставлены въ больницу. Здѣсь при осмотрѣ ихъ оказалось слѣдующее: у одного, субъекта съ крѣпкимъ тѣлосложеніемъ, совершенный параличъ верхнихъ и нижнихъ конечностей, сомкнутіе челюстей, глубоко-коматозное состояніе, лицо блѣдно, губы синеваты, кожа умѣренной температуры, пульсъ полонъ и немного учащенъ, сквозь рѣдкіе зубы пробивается пѣнистая слюна. Должно замѣтить, что этотъ больной спалъ на печи и утромъ найденъ упавшимъ съ нея на полъ на посланное сѣно. По совершенному сомкнутію челюстей внутреннихъ лекарствъ нельзя было назначить и должно было довольствоваться наружными пособіями. Не смотря на то, что еще на мѣстѣ было сдѣлано ему обильное кровопусканіе, оно было произведено вновь и затѣмъ на-

значены обливанія всего тѣла горячею въ 30° Р. водою, до 6 часовъ вечера. Вечеромъ, какъ состояніе больного не измѣнилось, сдѣлали еще мѣстное кровопусканіе чрезъ приставленіе за уши пиявицъ; сверхъ того поставили три промывательныхъ изъ укуса съ солью, на голову положили пузырь со льдомъ, а на шею мушку. Но все эти пособія были безплодны; утромъ обнаружилось, что и мочевого пузырь у больного былъ парализованъ, а потому урина была выпущена катетеромъ; затѣмъ снова дѣлали ему промывательныя съ клещевиннымъ масломъ, на обритую голову положили мушку и дѣятельно производили растиранія кожи раздражающими средствами. — Къ вечеру у больного послѣдовало обильное испражненіе низомъ и выступила равномерная на всемъ тѣлѣ теплота, но сопорозное состояніе продолжалось въ той же степени; на третій день началъ упадать пульсъ, наступило хриплое дыханіе, а на четвертый день утромъ больной умеръ. Двое другихъ, рослыхъ и здоровыхъ молодыхъ крестьянъ, которымъ также на мѣстѣ было сдѣлано обильное кровопусканіе, прибыли въ больницу въ такомъ же, какъ и вышеописанное, состояніи; имъ поданы были тѣ же самыя пособія, но обливанія горячею водою имѣли на нихъ вполне благопріятное дѣйствіе; уже въ 7 часовъ вечера они начали приходить въ себя, потягиваться и зѣвать, не раскрывая глазъ, при чемъ спазмъ челюстей у нихъ прошелъ. Немедленно дали имъ холодной воды, одѣли ихъ въ сухое и теплое бѣлье и положили въ теплую постель, отъ чего у нихъ выступила испарина, среди которой они совершенно опомнились и въ 9 часовъ попросили ѣсть. Ночь они провели спокойно и утромъ проснулись совершенно здоровыми.

Кромѣ того случаи успѣшнаго пользованія угара обливаніями теплою водою встрѣчались въ теченіи истекшаго года въ больницахъ Московской для чернорабочихъ (1), Томской (2) и Житомирской (5).

Случаи отравленія отъ употребленія въ пищу сырой бѣлужины и шипа послѣдовали такъ же часто, какъ и въ предыдущіе годы. Къ постояннымъ признакамъ его



принадлежали: рвота и боль въ желудкѣ, искаженіе лица, инъекція глазъ, расширеніе зрачковъ, стѣсненіе дыханія, сильная тоска, сплоскость голоса, сухость во рту, икота, задержаніе урины, охлажденіе тѣла, слабый пульсъ и быстрый упадокъ силъ. Смерть послѣдовала въ  $\frac{7}{8}$  случаевъ, иногда чрезъ нѣсколько часовъ, но большей части въ тотъ же день и у не многихъ позднѣе 3-го дня по отравленіи. У выздоравливавшихъ на долгое время голосъ оставался сплывымъ и слизистая оболочка нѣба удерживала особенную красноту и сухость.

---

*Отсутствіе признаковъ сифилитическаго зараженія на тѣлѣ; — Сифилитическія язвы въ дыхательномъ горлѣ; — выздоровленіе отъ ртутиальнаго леченія.*

Крестьянинъ 26 лѣтъ отъ роду, крѣпкаго тѣлосложенія, слѣдующій деревни въ городъ, легъ при дорогѣ, мучимый жестокимъ удушьемъ, и въ такомъ состояніи былъ доставленъ въ Гродненскую Окружную Лечебницу 11 Іюня. Всѣ припадки его болѣзни были сходны съ тѣми, каковыми обыкновенно отличается крупъ, развитый до высочайшей степени, и продолжался непрерывно днемъ и ночью. Больной громкимъ своимъ дыханіемъ и часто возобновлявшимся кашлемъ, похожимъ на лай собаки, беспокоилъ прочихъ больныхъ до того, что нужно было помѣстить его въ особомъ покоѣ. вмѣстѣ съ тѣмъ онъ жаловался на боль въ груди и чувство раздраженія въ гортани, постоянно возбуждавшее кашель: лице его было блѣдно, пульсъ немного ускоренъ. При тщательнѣйшемъ осмотрѣ полости рта и зѣва ничего болѣзненнаго не оказалось, равно на тѣлѣ не было ни сыпи, ни язвъ, ни рубцовъ; легкія оказались совершенно здоровыми. По рассказамъ больного болѣзнь эта появилась безъ извѣстной ему причины, продолжается уже два мѣсяца и ожесточилась особенно въ послѣднее

время. Въ лечебницѣ въ продолженіе шести недѣль больной употреблялъ различныя средства, но болѣзнь имъ не уступала. Между тѣмъ 20 Іюля замѣчено у него воспаленіе зѣва съ признаками афтознаго процесса, а потому пораженныя мѣста были прижжены азото-кислымъ серебромъ; какъ же отъ того боль горла видимо ожесточалась, то больному былъ прописанъ крѣпкій растворъ сулемы для полосканія горла. При употребленіи этого средства афтозный процессъ началъ уменьшаться: это заставило думать, что здѣсь можетъ скрываться венерическое зараженіе, и потому, хотя больной утверждалъ, что никогда не подвергался таковой болѣзни, ему была назначена сулема для внутренняго употребленія, при каковомъ въ нѣсколько дней прошло удушье, а потомъ и кашель исчезъ совершенно. Методическое противусифилитическое леченіе было продолжаемо съ полнымъ успѣхомъ по 10 Октября. По окончаніи его больной вспомнилъ, что въ малолѣтствѣ имѣлъ на тѣлѣ сыпь, отъ которой былъ пользованъ цирульникомъ, совместно съ другими лицами, принадлежавшими къ его семейству и въ одно время съ нимъ подвергшимися какой-то заразной болѣзни.

*Сифилитическія язвы съ гангренознымъ характеромъ;  
исходъ въ выздоровленіе.*

1-го Мая поступилъ въ Минскую больницу больной, 23-хъ лѣтъ, въ сильномъ изнуреніи. Изъ распросовъ оказалось, что двѣ недѣли тому назадъ онъ заболѣлъ въ дорогѣ сифилитическими язвами на головкѣ полового органа, отъ которыхъ употреблялъ какую-то примочку, при чемъ развилась у него незалупа. Сверхъ того при нетрезвой жизни у него показались признаки горячки, побудившіе его къ кровопусканію и употребленію нѣкоторыхъ внутреннихъ средствъ. При поступленіи въ больницу онъ жаловался на совершенное изнеможеніе силъ, постоянную тяжесть головы съ головокруженіемъ и шумомъ въ ушахъ, потерю аппетита, сильную жажду, недостатокъ сна, и разнородныя представленія и грезы



какъ днемъ, такъ и ночью. Въ половомъ органѣ была сильная постоянная боль; объемъ его былъ значительно увеличенъ опухолью. При сильномъ жарѣ головы больной немогъ переносить свѣта, лице его было красно, языкъ бѣлый, сухой, покрытый густою бѣловатою слизью, губы также сухія, теплота всего тѣла усилена, кожа суха, жиловіеніе ускорено до 116 ударовъ на минуту; больной отъ безпокойства безпрестанно метался на кровати.

Внутрь прописанъ водяной настой наперсточной травы съ селитрою; на затылокъ поставлена мушка; къ головѣ приложены холодныя примочки, а къ половому органу свинцовая вода съ Сай-днеловой настойкой опія.

Вечеромъ больной имѣлъ сильный жаръ, но ночью спалъ нѣсколько лучше, хотя еще бредилъ. 2-го Мая утромъ, послѣ испражненія пиломъ, голова сдѣлалась менѣе тяжела и жажда уменьшилась, но безпокойство продолжалось въ одинаковой степени; — въ 12 часовъ утра безъ всякаго повода изъ того мѣста, гдѣ 27 Апрѣля была брошена кровь, появилось обильное кровотеченіе, которое было тотчасъ прекращено; въ 9 часовъ вечера обнаружилось также сильное кровотеченіе изъ полового органа, едва уступившее двухъ часовому употребленію гемостатической воды Нелюбина. При этомъ вышло крови до двухъ фунтовъ; больной значительно ослабѣлъ и пульсъ его сдѣлался малымъ, едва ощутительнымъ; внутрь назначенъ настой спорыши съ Галлеровымъ эликсиромъ. 3-го Мая поутру; больной спалъ спокойно три часа, — чувствовалъ усталость силъ и былъ блѣденъ, но голова его была свободна, — шумъ въ ушахъ исчезъ, теплота тѣла нормальна, жиловіеніе ровное, до 86 ударовъ на минуту. Послѣ мѣстнаго кровотеченія опухоль полового органа исчезла и миновалась незалупа; но при томъ обнаружилось, что головка полового органа, а равно спфилитическія язвы не пей были поражены антоновымъ огнемъ. — Вечеромъ 3-го Мая жара у больного уже не было, голова была свободна. Жажда умѣренная, ночью сонъ спокойный. 4-го Мая больной чувствуетъ себя менѣе усталымъ, — начинаетъ самъ приподниматься и сидѣть на кровати, жару нѣтъ, но сильная боль въ по-

ловомъ органѣ, преимущественно при испущеніи мочи; — внутреннія средства тѣже. 5-го Мая; антоновъ огонь замѣтно распространяется; больному назначенъ внутрь растворъ двухлористой ртути, снаружки на раны присыпаніе порошка опиума. — 6-го, 7-го и 8-го Мая замѣтной переменѣны небыло и средства употреблялись тѣже. 9-го Мая антоновъ огонь ограничился одною переднею частию головки. Сифилитическія ранки очистились и начали выполняться. — Отъ 12 до 16 Мая часть занятая антоновымъ огнемъ постепенно отдѣлилась, — сифилитическое изъязвленіе совершенно исчезло. Больной поправляется въ сплахъ и уже прохаживается по комнатѣ. — 22-го Мая; мѣсто, гдѣ былъ антоновъ огонь, начинаетъ выполняться тканью нормальнаго цвѣта; больному назначено употребленіе сарсапарельнаго декокта въ продолженіи нѣсколькихъ дней; послѣ чего онъ выпущенъ изъ больницы совершенно здоровымъ.

Сильную степень разрушительнаго дѣйствія представляетъ собою слѣдующій случай сифилитическаго зараженія, пользовавшийся въ Харьковской больницѣ:

Больной въ продолженіи 14 мѣсяцевъ отъ зараженія оставался безъ пользованія; не ограничиваясь въ разпространеніи своемъ, первичныя язвы дошли въ это время до того, что при поступленіи въ больницу у больного половой органъ былъ ими совершенно уничтоженъ, а на мѣстѣ его въ корнѣ ствола видѣлась обширная фагаденическая язва, простиравшаяся вверхъ на покровы живота и внизъ на мошонку; въ центрѣ ея открывалось отверстіе мочеиспускательнаго канала. Такія же язвы занимали нижній сегментъ брюшныхъ покрововъ, конечности и лобъ; кромѣ того было явственно сифилитическое пораженіе костей лобной и правой височной, выражавшееся опухолью и гнойными болями въ нихъ. При поступленіи въ больницу больному была внутрь назначена красная осадочная ртуть по методѣ Берга; язвы ея же присыпались, а въ опухоли костей втирали сѣрую меркуріальную мазь. Чрезъ мѣсяць язвы начали нѣсколько заживать, по чему оставлено наружное употребленіе ртути и вмѣсто ея назначена примочка изъ



раствора азотнокислого серебра. Къ концу шести недѣль язвы много поджили, но пораженіе костей усплплось; на височной кости образовалась костоѣда и въ наружныхъ покровахъ ея явился нарывъ. Для свободнаго выхода гноя онъ былъ вскрытъ и закладывался турундами; внутрь же больному назначенъ сарсапарельный декоктъ. До 20 Августа онъ оставался при этихъ средствахъ; въ это время увеличеніе объема язвъ, успленіе прежняго страданія костей и вновь обнаружившееся пораженіе носовыхъ костей заставило снова приступить къ внутреннему употребленію ртутныхъ препаратовъ, которое и было вновь начато; но на страданіе костей оно не обнаруживало никакого вліянія, притомъ глубокія сверляція боли въ носу, прободеніе мягкаго нёба и распространеніе язвъ въ глубину заставляли думать о болѣе энергическихъ мѣрахъ. Поэтому въ началѣ Сентября больному было назначено внутреннее употребленіе *Доновановой смѣси* іодистаго мышьяка и ртути утромъ и вечеромъ по 20 капель съ алтейнымъ отваромъ. — Такое леченіе продолжалося до 12 Октября. — Въ продолженіи этого времени язвы начали заживать, костоѣда и нарывъ на височной кости совершенно зажили, опухоли костей уменьшились. — 12 Октября предписано внутреннее употребленіе іодистаго поташа съ іодомъ, а снаружи для окончательнаго заживанія язвъ Рустова мазь (*Linctus Rusti*); при этихъ мѣрахъ признаки худосочія исчезли, оставивъ послѣ себя одно незначительное отверстіе въ нёбѣ.

Въ Одесской Городовой больницѣ въ теченіи истекшаго года особенно часто встрѣчались случаи сильныхъ формъ сифилитическаго зараженія, иногда съ смертельнымъ исходомъ. Въ числѣ ихъ въ одномъ шанкрѣ полового органа занималъ всю поверхность его и мошонки и принялъ гангренозный характеръ съ исходомъ въ смерть. Въ другомъ случаѣ въ сифилитическомъ паховикѣ послѣдовало сильное воспаленіе, съ гангренознымъ характеромъ и отдѣленіемъ зловоннаго пхорознаго гноя; — по заживленіи его на внутренней и задней поверхности верхней части бедра образовался большой нарывъ, перешед-

шіи въ атоническую язву и помертвѣніе, также съ смертельнымъ исходомъ. Вообще усложненіе первичныхъ язвъ паховиками принадлежало тамъ въ прошломъ году къ столь обыкновеннымъ явленіямъ, что только въ  $\frac{1}{20}$  случаевъ его не замѣчалось. — У одной изъ больныхъ той же больницы первичная венерическая язва занимала все протяженіе отъ нижней спайки лимфъ до прохода; случай этотъ окончился выздоровленіемъ. — Развитіе сифилитическихъ бородавчатыхъ наростовъ (*condylomata*) въ одномъ случаѣ достигало до такой степени, что вся поверхность ствола и мошонки была сплошь покрыта ими.

Въ Звѣнигородской больницѣ (Кіевской губерніи) былъ наблюдаемъ случай зараженія вторичною формою сифилитической болѣзни. Больная поступила въ больницу съ слизистыми пустулами (*plaques muqueuses*) на половыхъ органахъ и страданіемъ костей; двухъ лѣтній ребенокъ, котораго она еще кормила, былъ въ то время совершенно здоровъ, но въ больницѣ же показались у него также слизистыя пустулы на губахъ и венерическая красуха (*roseola syphilitica*) на всемъ тѣлѣ.

Въ Харьковскую больницу поступили для пользованія двѣ зараженныя женщины съ грудными младенцами, страдавшими также сифилитическими язвами и сыпью со времени рожденія ихъ и кормившимися грудью больныхъ матерей. — Этимъ послѣднимъ было назначено ртутное леченіе, дѣти же оставались безъ всякихъ внутреннихъ пособій съ соблюденіемъ лишь должной чистоты. Не смотря на то признаки венерическаго зараженія у дѣтей постепенно проходили и совершенно исчезли нѣсколькими мѣсяцами ранѣе, чѣмъ у матерей.

Въ леченіи послѣдовательныхъ формъ сифилитическаго зараженія въ прошедшемъ году было въ первый разъ испытано наружное употребленіе Сергіевскихъ минеральныхъ водъ. Оно оказалось особенно полезнымъ



противъ наростовъ на половомъ органѣ. Самые упорные виды ихъ, не уступавшіе ни ѣдкимъ средствамъ, ни хирургической помощи отъ прикладыванія сѣрнаго плаа въ ваннѣ температуры 27° Р., по 2 раза въ день въ продолженіи мѣсяца, сморщивались, уменьшался въ объемѣ и отпадали одинъ за другимъ.

*Нарывъ сѣдалищныхъ мускуловъ.*

Въ Венденскую больницу Лифляндской губерніи поступилъ больной, признавшій неизлечимымъ отъ coxarthrosae, съ тѣмъ, чтобы употребить противъ такого состоянія раскаленное желѣзо и приличное внутреннее леченіе. Мѣстные признаки дѣйствительно были весьма обманчивы и сходны съ вышеозначенною болѣзнію во второмъ ея періодѣ, въ числѣ ихъ особенно — кажущееся удлинненіе ноги, болѣе низкое положеніе сѣдалищной складки, боль и неподвижность состава. Въ то же время сложеніе больного представлялось хорошимъ, видъ его свѣжимъ, да и болѣзнь продолжалась всего только двѣ недѣли. Скоро оказалось, что боль около сочлененія ограничивалась однимъ только мѣстомъ, на которомъ показались наконецъ краснота и глухое зыбленіе, что заставило перемѣнить діагнозъ болѣзни. Послѣ продолжительнаго употребленія припарокъ, отъ которыхъ опухоль достигла огромнаго развитія, сдѣланъ былъ проколъ, чрезъ который выходилъ гной въ огромномъ количествѣ изъ глубины, при чемъ оказалось, что самое сочлененіе вовсе не было поражено болѣзнію. Чрезъ 8 недѣль отъ поступленія больной оставилъ больницу совершенно здоровымъ.

Замѣчательно, что начало этого нарыва совпадаетъ съ прекращеніемъ у больного перемежающейся лихорадки.

*Рана предплечія отъ укушенія лошадыю; — гангренозный характеръ поверхности ея; — заживленіе при помощи электро-магнетизма.*

Въ Вятской губернской больницѣ пользованъ былъ случай укушенія праваго предплечія лошадыю. Больной поступилъ съ не-

значительными разрывами общихъ крововъ на срединѣ праваго предплечія и сильною опухолью ея. Раны при обыкновенномъ леченіи приняли хорошее теченіе; но вскорѣ показались подъ общими покровами въ окружности укушенія сложныя фистулы, потребовавшія хирургической помощи. Изъ разрѣзовъ ихъ образовалась язва съ чистою поверхностію; ходъ ея вначалѣ былъ благопріятенъ, но вскорѣ на верхнемъ краѣ ея показался тонкій гангренозный налетъ, переходившій съ одного мѣста на другое въ теченіи четырехъ мѣсяцевъ ея. Больной впалъ въ изнуреніе, не смотря на дѣятельное употребленіе укрѣпляющихъ и противугнилостныхъ средствъ. Руку свело въ локтѣ; пальцы лишились движенія; мягкія части предплечія отолѣбли и окрѣбли. Изнуреніе больного казалось противопоказаніемъ къ отнятію члена; врачъ прибѣгнулъ къ ежедневному употребленію электро-магнетизма. Съ самаго начала вліяніе его начало оказывать благотворное дѣйствіе, мало по малу отолѣбшая мякоть дѣлалась уступчивѣе; язва, при перевязкѣ простымъ деревяннымъ масломъ, изъ темнокраснаго цвѣта, похожаго на цвѣтъ испорченной солонины, стала переходить въ цвѣтъ свѣтло-красный, живой; гангрена не возвращалась, опухоль и твердость мускуловъ стали исчезать постепенно; рука въ локтѣ начала разгибаться; пальцы получили движеніе и общее состояніе здоровья видимо стало улучшаться. При такихъ результатахъ употребленіе электро-магнитнаго снаряда было оставлено; язва зажила совершенно, общее состояніе больного, равно какъ и движеніе руки, сдѣлалось совершенно нормальнымъ.

Въ Венденской больницѣ (Лифляндской губерніи) былъ пользованъ случай раны мужскаго полового органа отъ укушенія лошадыю. По срединѣ дольнаго діаметра ствола кожа, за исключеніемъ незначительнаго промежутка, была какъ бы обрѣзана и заворачивалась впередъ около головки, какъ удвоеніе крайнеіи плоти. При позднемъ обращеніи больного къ врачебной помощи, когда пораженныя части кожи уже перешли въ помертвѣніе, оказалось необ-



ходимымъ отдѣлить ихъ ножомъ, послѣ чего рана зажила совершенно.

Случай сквозныхъ ранъ живота съ быстрымъ смертельнымъ исходомъ встрѣтился въ Киренской больницѣ (Пркутской губерніи): больной общео водянкою, желая выпустить воду, нанесъ себѣ въ животъ двѣ сквозныя раны острымъ ножомъ и вскорѣ умеръ. Въ полости живота его найдена свернувшаяся кровь; — тонкія кишкы были въ сильномъ воспалительномъ состояніи.

Въ Ставропольскую больницу былъ доставленъ больной, 22 лѣтъ отъ роду, крѣпкаго тѣлосложенія, израненный ножомъ въ 23 мѣстахъ въ голову, лице, шею и грудь. Всю ночь послѣ того онъ пролежалъ безъ помощи и въ больницу былъ доставленъ въ безсознательномъ состояніи, изъ котораго очнулся только на 3 день. Не смотря на сильную степень травматическаго поврежденія, при надлежащемъ врачебномъ пособіи онъ выздоровѣлъ чрезъ 2 мѣсяца.

Въ Алатырской больницѣ (Симбирской губерніи) былъ наблюдаемъ случай раны на большомъ пальцѣ руки отъ укушенія человѣкомъ въ дракѣ. На 3-й день послѣ того обнаружилась гангрена, окончившаяся отдѣленіемъ обоихъ составовъ поврежденнаго пальца. Сходное съ этимъ наблюденіе было сдѣлано въ Калязинской больницѣ (Тверской губерніи), гдѣ отъ укушенія пьянымъ въ дракѣ, образовалась также гангрена руки съ благополучнымъ исходомъ.

Изъ случаевъ перелома замѣчателенъ принадлежащій Лемзальской больницѣ (Лифляндской губерніи). У субъекта, попавшаго въ колесо мельницы, оказался переломъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ правой лопатки, въ наружномъ концѣ ключицы и въ 6 верхнихъ ребрахъ, съ надломомъ 7 ребра и сильнымъ придавленіемъ мягкихъ частей правого плечеваго состава. Кромѣ того были смяты и разо-

рваны мягкія части тыльной поверхности правой руки съ раздробленіемъ 3 внутреннихъ пястныхъ костей. Случай, не смотря на энергическія врачебныя пособія, окончился смертію. — Диагностика вышесчисленныхъ поврежденій подтвердилась посмертнымъ изслѣдованіемъ; сверхъ того оно обнаружило кровоизліяніе фунта въ 3 изъ разорванныхъ сосудовъ около праваго плечеваго сустава; кровь, частию въ жидкомъ, частию въ сгущенномъ состояніи пропитывала ткани, лежащія между грудною кліткою и наружными покровами, и чрезъ разрывы плеиры между ребрами 3 и 4-мъ, 4 и 5-мъ пзплась въ правую половину груди, гдѣ придавливала правое легкое, нисколько впрочемъ не поврежденное.

Въ Новоархангельской больницѣ Россійскихъ Колоній въ Америкѣ былъ пользованъ случай перелома бедражной кости въ двухъ мѣстахъ, или лучше сказать отлома средней части ея отъ концовъ, происшедшій отъ ушиба объ пень при быстромъ паденіи съ горы. Случай окончился медленнымъ сращеніемъ кости.

Въ Харьковскую больницу беременная женщина поступила на другой день перелома большой и малой берцовой кости. Во все продолженіе 38 дней, остававшихся до родовъ, костяное кольцо не образовывалось, но тѣмъ скорѣе совершилось образованіе его послѣ родовъ, именно въ теченіи 20 дней.

Случай поврежденія наружныхъ частей отъ молніи былъ наблюдаемъ въ Одесской больницѣ. Молнія ударила въ правое плечо женщины, сожгла подъ мышкою волосы, оттуда прошла прямо по груди и животу внизъ и остановилась на верхней передней части бедра; — съ лѣвой стороны она повредила ухо и отъ него также опустилась въ прямолиннейномъ направленіи внизъ къ верхней передней части лѣваго бедра. Волосы промежности были почти совершенно сожжены; въ мѣстахъ псхода



удара на бедрахъ были *симметрически расположенные надрывы* кожи, а на груди и животѣ красныя полосы; изъ лѣваго уха истекала кровяная жидкость. Больная выздоровѣла, но осталась глухою.

Въ числѣ ушибовъ замѣчательнъ случай удара въ глазъ лошадыю, встрѣтившійся въ Венденской больницѣ (Лифляндской губерніи). Въ слѣдствіе особенной случайности онъ имѣлъ послѣдствіемъ совершенное выдавленіе глаза наружу, причемъ разрывъ наружныхъ частей былъ сходенъ съ разрывомъ, употребляемымъ при вырѣзываніи глаза. Глазное яблоко, въ видѣ длиннаго цилиндрическаго тѣла, висѣло снаружи и на другой же день послѣ ушиба совершенно покрылось нагноеніемъ, такъ что уже нельзя было отличить тканей его другъ отъ друга. Скоро затѣмъ въ немъ развился антоновъ огонь. Заживленіе раны наступило довольно скоро по удаленіи помертвѣвшаго глаза. — У больного Щигровской больницы (Курской губерніи), умершаго послѣ контузіи камнемъ въ пахъ, полученной въ Севастополь, найденъ послѣ смерти конгестивный нарывъ на внутренней сторонѣ правой подвздошной кости, съ фистулезными ходами къ крестцовой, — отолстѣніе и ожиреніе сальника и брызжейки кишокъ; — гипертрофія брызжеечныхъ железъ, — хроническое воспаленіе брюшины, съ изліяніемъ кровяной сыворотки въ брюшную полость, — отвердѣніе, опухоль и водянка праваго яичка (hydrosarcocoele).

Между язвами заслуживаетъ вниманія случай смертельнаго кровотеченія изъ незначительной язвы ноги: въ Житомирскую больницу была доставлена больная въ глубокомъ обморокѣ и скончалась чрезъ  $\frac{1}{2}$  часа; на нижней трети берца были у нея 4 овальныя поверхностныя язвы, съ незначительными разширеніями венъ. Самый большой діаметръ язвъ не превышалъ дюйма, глубина ихъ не переходила предѣловъ кожи и до фасцій не дости-

гала; при всемъ томъ кровотеченіе изъ одной таковой язвы было для больной смертельнымъ отъ недостатка пособій. Посмертное изслѣдованіе открыло въ ней поперечное раздѣленіе вѣтви *Venae saphenae*, источавшей кровь. Стволъ ея, выше язвы, на 3 дюйма длины былъ наполненъ кровавымъ ссѣдомъ, ниже язвы калибръ вены былъ пустъ. Умершая была по видимому при жизни довольно тучна, подъ кожею ея лежалъ довольно толстый слой жиру, какъ равно и въ околосердечной сумкѣ; послѣднее обстоятельство при данныхъ условіяхъ могло ускорить смерть отъ обморока (*syncore*). Сосуды мозговыхъ оболочекъ и легкія были безкровны, полости сердца пусты и какъ бы вымочены въ водѣ и выжаты.

Изъ случаевъ наружнаго рака въ 4-хъ, пользованныхъ въ Вышневолоцкой больницѣ (Тверской губерніи), было съ успѣхомъ испытано наружное употребленіе *крепкой соляной кислоты*, по совѣту врача Игнатьева. Въ одномъ изъ нихъ канкротное перерожденіе глаза и верхней вѣки, продолжавшееся болѣе 3 лѣтъ, въ видѣ опухоли, величиною въ курпное яйцо, съ сильнымъ образованіемъ на поверхности бугристыхъ мясныхъ наростовъ и обильнымъ отдѣленіемъ зловоннаго ѣдкаго гною, было вырѣзано, — затѣмъ въ орбиту вложена корпія, намоченная крѣпкою соляною кислотою. При постепенномъ дѣйствіи ея показала здоровая грануляція и поверхность разрѣза покрылась тканью здоровою. — Въ другомъ случаѣ ракъ верхней губы, продолжавшійся болѣе 2 лѣтъ, въ видѣ открытой язвы съ отвердѣніемъ околележащихъ частей, періодическими сильными болями и кровотеченіемъ, былъ излеченъ однимъ дѣйствіемъ кислоты въ теченіи мѣсяца. — Въ третьемъ случаѣ ракъ нижней губы и подбородка былъ вырѣзанъ и послѣ того 2½ мѣсяца прикладывалась соляная кислота до образованія совершенно здоровой ткани. Въ послѣднемъ случаѣ раковидная опухоль ниж-



ней губы, величиною въ лѣсной орѣхъ, твердая и почти ограниченная, излечена была однимъ наружнымъ употребленіемъ соляной кислоты въ теченіи одного мѣсяца. — Въ Пензенской больницѣ 12 случаевъ рака, въ томъ числѣ 2 на лицѣ, 9 на губахъ и 1 въ глазу были пользованы внутреннимъ и наружнымъ употребленіемъ *хлористаго брома*. Изъ нихъ излечился 5 случаевъ незначительныхъ канкрозныхъ опухолей нижней губы, — въ остальныхъ 9 употребленіе вышеозначеннаго способа осталось вовсе безъ успѣха. Въ Вилькомирской больницѣ Ковенской губерніи способъ Ландолфи былъ испытанъ также безъ успѣха въ одномъ случаѣ рака.

Въ Томской больницѣ при обмороженіяхъ употреблялось съ пользою втираніе *сырой ртутной мази* въ отмороженные члены непосредственно послѣ оттиранія ихъ снѣгомъ.

Въ теченіи истекшаго года произведено въ гражданскихъ больницахъ хирургическихъ операцій 914, именно:

	въ томъ числѣ:		
	съ успѣ- хомъ	безъ успѣха.	
1) Ампутацій бедра . . . . .	18	13	5
2) » берца . . . . .	76	57	19
3) » плеча . . . . .	35	27	8
4) » предплечія . . . . .	41	36	5
5) Вылуценіе плеча . . . . .	1	—	1
6) » руки . . . . .	11	11	—
7) » стопы . . . . .	16	16	—
8) Резекціи большой берцовой кости . .	1	—	1
9) » нижней челюсти . . . . .	1	1	—
10) Ампутаціи и вылуценія пальцевъ ручныхъ и ножныхъ . . . . .	239	236	3
11) Литотоміи . . . . .	54	41	13
12) Перевязки артерій . . . . .	3	3	—

		въ томъ числѣ:		
		съ успѣ-	безъ	
		хомъ.	успѣха.	
13)	Вырѣзыванія рака . . . . .	98	95	3
14)	Вылущенія опухолей . . . . .	100	99	1
15)	Перевязки полиповъ . . . . .	12	11	1
16)	Ампутаціи грудей . . . . .	1	1	—
17)	Операціи грыжи . . . . .	7	3	4
18)	Перерѣзыванія сухихъ жилъ . . . . .	3	3	—
19)	Трахеотоміи . . . . .	3	—	3
20)	Кастраціи . . . . .	3	3	—
21)	Ампутаціи полового органа . . . . .	2	2	—
22)	Операціи фистулы . . . . .	19	18	1
23)	Вынутія пули . . . . .	1	1	—
24)	Операціи суженія рукава матки . . . . .	3	2	1
25)	» задняго прохода . . . . .	3	3	—
26)	Операціи выпаденія прямой кишки . . . . .	2	2	—
27)	» прирожденной незалупы . . . . .	3	3	—
28)	Литонтрити . . . . .	5	5	—
29)	Извлеченія камней изъ ствола . . . . .	3	3	—
30)	Прободенія живота . . . . .	24	23	1
31)	» груди . . . . .	6	1	5
32)	» околосердечной сумки . . . . .	1	—	1
33)	Операціи водяной грыжи яичка . . . . .	13	13	—
34)	» водянки слизистой сумочки чаши . . . . .	1	1	—
35)	Пластическихъ операціи . . . . .	7	7	—
36)	Операціи катаракты . . . . .	37	33	4
37)	» искусственнаго зрачка . . . . .	2	1	1
38)	» стафиломы . . . . .	1	1	—
39)	Мелкихъ глазныхъ операціи (trichiasis, entropii, fistulae lacrymalis) и пр. . . . .	35	35	—
40)	Цезарскаго сѣченія (на умершей) . . . . .	1	1	—
41)	Разсѣченія мертвого младенца въ маткѣ . . . . .	2	2	—



	въ томъ числѣ:		
	съ успѣ-	безъ	
	хомъ.	успѣха.	
42) Поворота младенца . . . . .	9	8	1
43) Наложения шипцовъ . . . . .	8	8	—
44) Отдѣленія послѣда . . . . .	3	3	—
	Всего — 832 82		

Помощь при родахъ подана была 483 роженницамъ; изъ нихъ у одной только роды имѣли смертельный исходъ. Въ числѣ ихъ:

230 было въ Коломенской (Шерановской) Московской губерніи,

52 въ Тобольской,

41 — Виленской и

19 — Капнской больницъ; остальные 141 случай родовъ были разсѣяны по разнымъ больницамъ.

Нѣкоторыя изъ операций заслуживаютъ особеннаго вниманія:

Резекція нижней челюсти сдѣлана въ Проскуровской уѣздной больницѣ (Подольской губерніи) при сложномъ переломѣ правой половины челюсти въ трехъ мѣстахъ выстрѣломъ изъ ружья, заряженнаго мелкою дробью; отъ поздняго обращенія больного къ врачебной помощи въ пораженныхъ частяхъ еще до операции обнаружился признаки помертвѣнія. Резекція была произведена съ совершеннымъ успѣхомъ; больной выздоровѣлъ.

Одна изъ ампутацій бедра совершена въ Митавской больницѣ при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ. Поводомъ къ ней была *воздушная опухоль бедраиной кости* (*spina ventosa*) у субъекта въ высшей степени ослабленнаго, съ обильнымъ экссудатомъ въ брюшной полости и повсемѣстною подкожною водянкою. Послѣ операции, произведенной съ полнымъ успѣхомъ, здоровье больного совершенно возстановилось. Въ этомъ случаѣ замѣчательно, что водяночныя явленія начали уменьшаться

и постепенно исчезать непосредственно послѣ отнятія члена, преимущественно чрезъ медленное и непрерывное просачиваніе воды изъ раны.

Изъ случаевъ вылушенія кисти руки одинъ принадлежитъ Тамбовской больницѣ: операція назначалась канкрознымъ перерожденіемъ 3-го пальца лѣвой руки съ увеличеніемъ объема его до такой степени, что размѣры его сдѣлались болѣе всей кисти. Больной выздоровѣлъ на 23 день послѣ операціи.

Одна изъ трахеотомій была сдѣлана въ уѣздной Павлоградской больницѣ (Екатеринославской губерніи) на больномъ, доставленномъ въ агоніи, съ припадками задушенія. Разрѣзъ гортани принесъ временное облегченіе, но тѣмъ не менѣе вновь возвратились припадки и больной умеръ. При вскрытіи оказалось, что оно происходило отъ сдавленія дыхательнаго горла огромнымъ нарывомъ, лежащимъ сзади пищевода и сообщавшимся съ кавернами лѣваго легкаго.

Двѣ операціи прободенія грудной кѣтки сдѣланы были въ Нижегородской больницѣ при обильномъ накопленіи эксудата въ грудной полости. На одномъ больномъ операція была произведена чрезъ два мѣсяца отъ начала водянки; изъ искусственнаго отверстія вышло около 7 фунтовъ серозной жидкости, но скоро затѣмъ вновь послѣдовало выпотѣніе въ бѣльшемъ количествѣ и больной на 9 день умеръ. При вскрытіи тѣла его найдено совершенное сжатіе легкаго, до размѣровъ кулака средней величины, съ карнификаціею тканей и отложеніемъ просовидныхъ бугорковъ; въ легкомъ свободной отъ эксудата грудной стороны были также бугорки во множествѣ. На другомъ больномъ операція прободенія груди сдѣлана была на 16 день отъ появленія эксудата съ совершеннымъ успѣхомъ.

Цезарское сѣченіе произведено было въ Кіевской



больницѣ на беременной, непосредственно по кончинѣ ея отъ воспаленія мягкихъ оболочекъ мозга. Для младенца оно увѣчалось полнымъ успѣхомъ; онъ ожилъ и послѣ того жилъ 3 мѣсяца.

Операциі литотоміи было: 27 въ Пензенской, 8 въ Московской чернорабочихъ, 6 въ Симбирской, 6 въ Саратовской, 3 въ Тамбовской, 2 въ Калужской, 1 въ Нижегородской, 1 въ Одесской больницѣ. Благополучный исходъ онѣ имѣли въ 41, смертію окончились въ 13 случаяхъ. Изъ послѣднихъ Пензенской больницѣ принадлежатъ только 4 случая; въ одномъ изъ нихъ смертельный исходъ послѣдовалъ отъ присоединенія кори съ воспаленіемъ легкихъ въ періодѣ выздоравливанія; въ другомъ, у 8 лѣтняго мальчика, отъ воспаленія мочевого пузыря, въ третьемъ, у 17 лѣтняго, отъ кроваваго поноса, развившагося послѣ операциі, и въ послѣднемъ отъ болѣзни почекъ, чрезъ 3½ мѣсяца послѣ операциі, сдѣланной совершенно удачно. Рана у этого больного зажила хорошо, но остался фистулезный ходъ и показались явленія Брайтова перерожденія и камня почекъ, къ которымъ въ послѣднее время жизни присоединились признаки истощенія и поносъ. При вскрытіи оказалось, что печень была увеличена въ объемѣ, блѣдна и безкровна; въ толстыхъ кишкахъ признаки хроническаго катаррального состоянія; правая почка въ Брайтовомъ перерожденіи; слизистая перепонка ея лоханки и близь лежація части существа размягчены въ кашице-образную массу темноватаго цвѣта, наполненную крупнымъ пескомъ; мочеточникъ этой стороны разширенъ и утолщенъ; около отверстія мочевого пузыря, гдѣ послѣ операциі оставался свищъ, лежалъ продолговатый камень рыхлой консистенціи, величиною въ голубиное яйцо, образовавшійся послѣ операциі. — Въ Нижегородской больницѣ оперированный умеръ чрезъ 16 дней послѣ операциі во время

холерной эпидеміи въ слѣдствіе сильнаго поноса, съ холерными признаками, подъ конецъ сопряженнаго съ бредомъ. При вскрытіи тѣла въ этомъ случаѣ, кромѣ характеристическихъ явленій въ кишечномъ каналѣ, найдено воспаление и размягченіе коркового вещества правой почки съ зернистымъ отложеніемъ на поверхности оной и воспаление почечной лоханки и слизистой оболочки мочевого пузыря. Въ Тамбовской больницѣ всѣ 3 случая литотоміи имѣли благоприятный исходъ; въ одномъ изъ нихъ у мальчика *четырехъ лѣтъ*, уже 3 года страдавшаго задержаніемъ мочи, извлечены 8 камней, — онъ выздоровѣлъ на 46 день послѣ операціи; другой, мальчикъ 10 лѣтъ, страдавшій камнемъ 7 лѣтъ сряду, выздоровѣлъ на 40 день; — чрезъ 4 недѣли послѣ операціи показалась у него корь, но съ благополучнымъ исходомъ; въ послѣднемъ случаѣ, съ замѣчательнымъ вышеописаннымъ (стр. 300) расположеніемъ камней въ пузырь, выздоровленіе тянулось медленнѣе, отъ фистулы только чрезъ 6 мѣсяцевъ уступившей леченію. — Изъ остальныхъ неблагоприятныхъ исходовъ литотоміи были 3 въ больницѣ Московской, 1 въ Симбирской, 1 въ Одесской и 3 въ Саратовской.

Всѣ 3 случая пластическихъ операцій принадлежатъ Житомирской больницѣ. Въ одномъ изъ нихъ, по методѣ Вельпо, въ промежуткѣ между щитообразнымъ хрящемъ и язычною костью, зарощена переносомъ кожи фистула гортани, оставшаяся послѣ перерѣзанія горла. Въ другомъ — лоскутомъ кожи изъ шеи наполненъ промежутокъ въ 6 дюймовъ, образовавшійся по вырѣзаніи рака нижней губы съ пораженіемъ угловъ рта. Больной совершенно выздоровѣлъ чрезъ 40 дней, съ едва замѣтными слѣдами шва. Третій случай былъ одинаковъ съ предыдущимъ, только рана была менѣе.

Въ числѣ случаевъ удаленія опухолей замѣчательны



сдѣланныя въ уѣздныхъ больницахъ Везенбергской (Эстляндской) и Бобровской (Воронежской губерній) операціи вырѣзанія наростовъ огромной величины на нимфахъ женскихъ половыхъ органовъ. Въ одномъ изъ этихъ двухъ случаевъ была Elephantiasis, въ другомъ — фунгозный наростъ. У одного изъ больныхъ Тамбовской больницы нарастала въ продолжаніи 20 лѣтъ жировая опухоль между пупомъ и подложечною стороною. Она мѣшала больному ходить и при стоячемъ положеніи закрывала весь животъ и половые органы его. Подвижное основаніе опухоли имѣло въ діаметрѣ около 6, сама же она около 13 дюймовъ. На поверхности ея лежали разширенныя подкожныя вены, — на верхушкѣ были изъязвленія кожи. Больной былъ вообще худощавъ, но видъ имѣлъ здоровый и возрастъ молодой. Опухоль была вырѣзана, причемъ пришлось перевязать нѣсколько артерій; огромная рана послѣ операціи зажила чрезъ нагноеніе. Больной выздоровѣлъ и даже пополнилъ. Вырѣзанная опухоль вѣсила 22 фунта.

Къ этой же категоріи принадлежатъ слѣдующіе случаи:

*Стеатоматозная опухоль бедра, вѣсомъ въ 14 фунтовъ;  
— вылуценіе ея съ счастливымъ исходомъ.*

Больная, 27 лѣтъ, поступила въ Симбирскую больницу 12 Марта 1856 г., съ огромною опухолью на внутренней и передней поверхности праваго бедра, простиравшейся отъ уровня правой наружной губы внизъ до самаго колѣннаго сустава. На ощупь опухоль была подвижная, не болящая, упругая и заключала въ себѣ отдѣльныя затвердѣнія, величиною отъ грецкаго орѣха до кулака; на самой нижней части ея находилась круглая язва, величиною съ полтинникъ, съ ровными розовыми краями и доброкачественной грануляціей; она образовалась за мѣсяць до поступ-







ленія больной въ больницу и произошла по видимому отъ тренія опухоли о лѣвую ногу во время ходьбы; кожа на опухоли была нормальнаго цвѣта и въ отношеніи плотности не представляла никакихъ уклоненій. Верхнихъ границъ опухоли нельзя было назначить: она незамѣтно переходила въ покровы; начинаясь спереди отъ мѣста соотвѣтствующаго положенію прямой бедренной мышцы, она простиралась внутрь и назадъ до мѣста соотвѣтствующаго положенію полунерепончатой мышцы (*m. semimembranosus*). Для уясненія объема опухоли и отношеній ея къ сосѣднимъ частямъ прилагается рисунокъ Табл. III.

Изъ разсказа больной обнаруживалось, что эта опухоль, показавшись 10 лѣтъ тому назадъ, росла постепенно; боли или ломоты въ ней никогда не было, но ходьбѣ она уже давно препятствуетъ. При красивой наружности и крѣпкомъ сложеніи больная никогда не имѣла ни сыпей, ни язвъ на тѣлѣ, и вообще никакимъ болѣзнямъ не подвергалась. Такъ какъ она сама убѣдительно просила сдѣлать ей операцію и наружный бодрый видъ и лѣта ея давали хорошее предсказаніе, то и предположено было сдѣлать вылуценіе опухоли.

22 Марта, по приведеніи пациентки въ анестезическое состояніе помощію хлороформа, приступлено было къ операціи: первый разрѣзъ шелъ дугообразно, выпуклостью наружу, отъ правой наружной губы до внутренняго мыщелка бедра, второй отъ того же мѣста, выпуклостію назадъ, до того мѣста, гдѣ оканчивался первый; такимъ образомъ составилъ овальный лоскутъ кожи, съ которымъ вмѣстѣ и вылучена была опухоль. Вылуценіе ея началось сверху, гдѣ она глубоко входила въ ткани: именно здѣсь вылуценіе сопряжено было съ значительною трудностію, твердые дольки опухоли выдвигались въ промежутки мышцъ и въ пахъ, а равно окружали бедренные сосуды; отдѣленіе мышцъ (*sartorii, recti et adductoris femoris, pectinei, semitendinosi, semimembranosi*) было такъ же довольно трудно; въ нижней же части вылуценіе опухоли было гораздо легче: здѣсь отдѣльныя доли ея лежали поверхностно и отдѣлялись отъ глубокихъ тканей клѣтчаткою. По вылученіи опу-



хоты на мышечныя вѣтви артерій наложены были лигатуры, капиллярное же кровотеченіе остановлено холодной водою; края раны соединены въ 5 мѣстахъ узловатымъ швомъ и сдѣлана перевязка раны спускомъ. Вся операція продолжалась 18 минутъ; вылуценная масса вѣсила 14 фунтовъ и 6 унцій аптекарскаго вѣса и состояла изъ жира натуральной консистенціи, цвѣта гораздо желтѣе натурального; въ самой жирной массѣ находились отдѣльныя ограниченныя затвердѣнія, различной величины, числомъ до 12; твердость ихъ была пропорціональна величинѣ, то-есть чѣмъ больше было затвердѣніе, тѣмъ оно было тверже и цвѣтомъ бѣлѣе; они соединялись между собой фиброзными бѣлыми нитями; по разрѣзѣ, затвердѣнія эти не были кровоточивы и представляли изъ себя сплошную массу бѣлаго жира, мѣстами заключающую въ себѣ гелятинозную жидкость сѣроватаго цвѣта и фиброзныя нити, соединявшія отдѣльныя затвердѣнія другъ съ другомъ. Изъ сожалѣнію микроскопическаго изслѣдованія не было сдѣлано и только по наружнымъ физическимъ признакамъ опухоль признана за стеатомъ. На третій день по вылученіи показалось доброкачественное нагноеніе и рана постепенно заросла на 51 день послѣ операціи такъ, что больная вышла совершенно здоровою и съ движеніемъ ноги вполне нормальнымъ.

### *Гипертрофія похотника и большихъ губъ.*

Больная, 40 лѣтъ отъ роду, по словамъ ея никогда не страдавшая венерическою болѣзнію, прибыла въ Воронежскую больницу съ наростомъ на наружныхъ половыхъ органахъ, величиною съ голову взрослого человѣка. Наростъ вшеѣлъ на широкомъ кольцообразномъ корнѣ, выходившемъ изъ обѣихъ большихъ нимфъ у верхней ихъ спайки; въ этотъ корень терялся и похотникъ; проходя далѣе, корень нароста занималъ стѣнки нимфъ и, не доходя не болѣе какъ на  $\frac{1}{2}$  вершка до ихъ задней спайки, оканчивался въ видѣ небольшихъ бородавокъ, плотно сросшихся между собою въ одну массу. Вообще корень нароста окружалъ въ

видѣ совершеннаго кольца и стѣснялъ входъ во влагалище до того, что двухъ пальцевъ сложенныхъ вмѣстѣ ввести въ него было невозможно. Малыя нимфы были нѣсколько уменьшены въ объемѣ, но по наружному виду своему легко могли быть различаемы. Слизистая оболочка влагалища продолжалась безъ измѣненія своей ткани по внутренней сторонѣ корня нароста, рѣзко отличаясь своимъ цвѣтомъ и строеніемъ отъ ткани послѣдняго. Мѣсячное очищеніе повторялось у больной совершенно правильно и вообще состояніе ея, не смотря на нѣкоторую вялость и блѣдность лица, было довольно хорошо.

При стоячемъ положеніи больной наростъ совершенно закрывалъ въ видѣ щита половые органы, причѣмъ рѣзко отличалась отъ него наружными признаками тканей большихъ губъ. Вокругъ оси онъ былъ подвиженъ; когда нужно было дѣлать внутреннее изслѣдованіе, при чемъ рыльце матки оцупывалось въ надлежащемъ мѣстѣ и въ нормальномъ состояніи, то необходимо было приподнимать наростъ къ брюшнымъ покровамъ: тогда только открывалось отверстіе, представляющее входъ во влагалище, отъ вышеописаннаго корня. Толщина корня была около полутора, а длина около одного дюйма; затѣмъ корень быстро переходилъ въ толщу нароста, самый бѣльшій діаметръ котораго равнялся почти 10 дюймамъ. Между заднею частью корня у задней спайки нимфъ и заднею поверхностью нароста оставалось отверстіе не болѣе одного дюйма въ діаметрѣ, покрытое слизистой оболочкой розоваго цвѣта; продолжавшеюся на наростъ. Поверхность его была неровна и имѣла нѣкоторое сходство съ большимъ коровьимъ вымяемъ. На ней лежали мѣстами впадины, мѣстами возвышенія въ видѣ нѣтушныхъ гребешковъ; язвѣленій же не замѣчалось. Что касается до субъективныхъ припадковъ, то кромѣ тяжести, больная ни на что нежаловалась. Строеніе нароста, какъ въ послѣдствіи оказалось, было поздраватое и сходное съ эректильною тканью (*tela erectilis*), входящую въ устройство похотника и нимфъ. Послѣ продолжительныхъ увѣщаній больная согласилась на операцію, которая и произведена была простымъ циркулярнымъ



сѣченіемъ по границамъ увеличенныхъ въ объемъ большихъ губъ. Наложивъ лигатуру на перерѣзанныя артеріи, — число которыхъ здѣсь было чрезвычайно велико, — остановивъ венозное кровотечение приличными средствами и сдѣлавъ правильную перевязку, врачъ назначилъ оперированной спокойное содержаніе и легкую діету и вмѣстѣ съ тѣмъ внутреннее употребленіе іодистой ртути (Protojoduretum Hydrargyri). Это тѣмъ болѣе казалось необходимымъ, что не было возможности сдѣлать совершеннаго вылуценія нароста; корни его оставались въ обѣихъ большихъ лимфахъ и спайкахъ, какъ оказывалось изъ безобразнаго гипертрофированнаго вида ихъ. Притомъ же и для предупрежденія возобновленія нароста необходимо было употребленіе іодистыхъ препаратовъ. Въ данномъ случаѣ оно превзошло всякія ожиданія: не болѣе, какъ въ теченіи 6 недѣль не только уменьшились лимфы до нормальной величины; но и прочіе кондиломатозные отростки на задней спайкѣ ихъ, составлявшіе непосредственное продолженіе кольцеобразнаго корня нароста, исчезли и входъ во влагалище представлялся едва слегка суженнымъ. Срѣзанный наростъ содержалъ въ себѣ много крови; во всю длину въ существѣ его проникали два тонкихъ сосуда, одинъ изъ нихъ былъ продолженіемъ артерій похотника, а другой его вены. Наибольшая окружность нароста равнялась 31 дюйму, а вѣсъ 8 фунтамъ и 48 золотникамъ.

*Полпъ полости зѣва огромной величины; — извлеченіе его чрезъ полость рта; — исходъ въ выздоровленіе.*

У больного, 17 лѣтъ, пользовавшаго въ Воронежской губернской больницѣ, при несовершенномъ и весьма слабомъ общемъ развитіи организма, образовался огромный мясисто-фиброзный полпъ въ полости зѣва, близъ заднихъ носовыхъ отверстій и въ непродолжительномъ времени достигъ такой величины, что угрожалъ больному задушеніемъ или голодною смертию. Начинаясь отъ заднихъ носовыхъ отверстій, онъ доходилъ до самой глотки и покрывалъ пищепріемникъ, такъ что больной съ трудомъ могъ дышать и едва глоталъ и то жидкую, или особенно мягкую пищу;

притомъ нѣбная занавѣска отъ давленія на нее полипомъ такъ подалась впередъ, что язычекъ приблизился къ кореннымъ зубамъ, отъ чего передняя полость зѣва значительно стѣснилась, рѣчь больного была невнятна и дыханіе носомъ сдѣлалось совершенно невозможнымъ.

Повторенныя попытки—перевязать полиппъ были совершенно безуспѣшны, серебряная прѣволока при томъ безпрестанно ломалась, извлеченіе его чрезъ носовую полость оказалось также не исполнимымъ; ткань полипа была такъ крѣпка и прикрѣпленіе его корня такъ плотно, что вѣтви щипцовъ при усиленномъ повертываніи совершенно смялись. Наконецъ грозящая больному опасность жизни побудила врача испробовать,—нельзя ли извлечь полиппъ чрезъ полость рта. Для достиженія этой цѣли было необходимо сдѣлать перпендикулярный разрѣзъ всей нѣбной занавѣски до самой кости; послѣ чего чрезъ полость зѣва были введены кривые крѣпкіе щипцы Мѣника и ими захваченъ корень полипа, прикрѣпленный къ нѣбнымъ костямъ, къ носовой перегородкѣ и простиравшійся по видимому до самыхъ лобныхъ пазухъ. Значительное кровотечение сопровождало операцию; вынутый полиппъ былъ величиною въ большую грушу и представлялъ плотную массу, вѣсившую до 6 унцевъ; при наполненіи же его кровію онъ не могъ вѣсить меньше 7 или даже 8 унцевъ. Окружность корня его равнялась  $2\frac{1}{2}$  дюймамъ. При укрѣпляющей діетѣ и употребленіи желѣзныхъ препаратовъ больной совершенно оправился; разговоръ его сдѣлался совершенно внятнымъ, изслѣдованіе задней полости зѣва не представляло признаковъ возобновленія нароста.

По удачному исходу заслуживаетъ вниманія слѣдующій случай кишечной фистулы:

*Наружная кишечная фистула въ правомъ паху; —значительное уменьшеніе калибра ея чрезъ искусственное сращеніе краевъ.*

10 Сентября поступила въ Мишскую больницу Приказа крестьянка, 40 лѣтъ отъ роду, тѣлосложенія довольно крѣпкаго,



съ большою раною въ правомъ паху, длиною въ три четверти вершка, а шириною въ среднѣ въ четверть дюйма; чрезъ эту рану выходили экскременты. Лѣтъ десять тому назадъ у больной въ правомъ паху отъ сильной натуги показалась небольшая подвижная грыжа, не сопровождавшаяся впрочемъ съ тѣхъ поръ никакими болѣзненными явленіями. Въ концѣ Іюля 1856 года при поднятіи большой тяжести больная почувствовала сильную боль въ правомъ паху съ увеличеніемъ объема грыжи и колющими болями въ цѣломъ животѣ. Эти боли и совершенный запоръ на низѣ, съ сильною рвотою, имѣвшею запахъ экскрементовъ, продолжались 4 дня сряду; на пятый день болѣзни, при сильнѣйшихъ натугахъ ко рвотѣ, въ паховой грыжѣ сдѣлался разрывъ и чрезъ отверстіе его вышло много нечистотъ, причемъ больная почувствовала значительное облегченіе и рвоты прекратились. За тѣмъ мало по маду исчезла и боль живота, экскременты же выходили постоянно въ малыхъ количествахъ чрезъ грыжевое отверстіе. Въ такомъ положеніи больная была доставлена въ больницу. Послѣ очищенія отверстія, ей назначена внутрь эмульсія изъ клещевинаго масла при употребленіи обыкновенныхъ промывательныхъ, соотвѣтственной діетѣ и горизонтальномъ положеніи. При употребленіи этихъ мѣръ экскременты начали выходить нормальнымъ путемъ по нѣскольку разъ въ сутки и только незначительное количество ихъ показывалось чрезъ разрывъ. 14 Сентября, по совершенномъ очищеніи раны, края ея были скарифицированы и соединены помощію коллодія на правой и липкаго пластыря на лѣвой сторонѣ, на  $\frac{1}{3}$  всей длины разрыва. Соединеніе это не беспокоило больной, экскременты же отдѣлялись нормальнымъ путемъ. Соединеніе съ правой стороны посредствомъ коллодія оказалось болѣе прочнымъ, а потому оно же было употреблено и на лѣвой сторонѣ. 21 Сентября съ правой стороны края раны уже хорошо срослись другъ съ другомъ и потому можно было приступить къ сближенію ихъ на дальнѣйшемъ протяженіи ея; причемъ отверстіе уменьшилось почти на  $\frac{2}{3}$ . При изверженіяхъ визомъ больная не ощущала никакого затрудненія, только не заросшая часть отверстія раны

должна была закрываться особаго рода тампономъ изъ корпии. При постепенномъ сближеніи краевъ раны въ остальной ея части въ продолженіи двухъ недѣль она совершенно заросла и только на срединѣ длины ея осталось небольшое отверстіе, въ размѣрѣ крупнаго гороховаго зерна, ведущее въ полость кишекъ. Оно постоянно прикрывалось особымъ тампономъ изъ корпии, обшитой холстомъ; тампонъ этотъ напитывался масломъ и укрѣплялся къ наху особою повязкою. Въ такомъ положеніи больной дозволено было прохаживаться; лекарства же были оставлены. Экскременты выходили нормальнымъ путемъ, чрезъ фистулу же болѣе не показывались. 10 Октября больная оставила больницу.

---

Кромѣ подвергавшихся хирургическимъ операціямъ въ самыхъ больницахъ, въ нѣкоторыя изъ нихъ поступало изъ военно-временныхъ госпиталей значительное число раненыхъ и оперированныхъ на поляхъ сраженій. Въ числѣ таковыхъ въ Симферопольскую больницу было передано 157; — при просторномъ и удобномъ размѣщеніи эти больные пользовались всѣми выгодами госпитального устройства; ни одинъ изъ нихъ не заболѣлъ тифомъ, умерло отъ послѣдствій ранъ 17 человекъ. У всѣхъ ихъ безъ исключенія были сложные переломы, требовавшіе наложенія неподвижныхъ повязокъ, особенно часто на нижнихъ конечностяхъ отъ поврежденій артиллерійскими снарядами. Въ двухъ случаяхъ была раздроблена средняя треть бедряной кости; оба больные выздоровѣли съ сокращеніемъ на  $\frac{1}{2}$  аршина нижнихъ конечностей, удержавшихъ притомъ прямое направленіе. — Иногда, не смотря на всѣ старанія сохранить конечность, оказывалось въ послѣдствіи необходимымъ ее ампутировать. У двухъ рядовыхъ, послѣ резекціи локтеваго состава, когда потеря существа уже совершенно вознаградилась новымъ образованіемъ, при вполне удовлетворительномъ ходѣ



выздоровленія, на вновь образовавшихся локтяхъ начали показываться твердыя фунгозные опухоли, потребовавшія ампутаціи предплечій. Вообще рѣдко удавалось сохранить руку резекціею локтя; даже при ранахъ пулею локтевой нервъ въ слѣдствіе сотрясенія по большей части парализировался рано или поздно и дѣлалъ невозможнымъ употребленіе члена и въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ операція удавалась. Еще важнѣе было это обстоятельство при поврежденіяхъ артиллерійскими снарядами отъ неизбежнаго сотрясенія всего плечеваго сустава. — Исходы операцій при головныхъ ранахъ были также не благопріятны; изъ множества трепанацій не удалась ни одна, хотя не во всѣхъ случаяхъ встрѣчались значительныя нарушенія цѣльности черепныхъ костей, но сотрясеніе мозга притомъ было всегда такъ сильно, что на 2-й или 4-й день дѣло рѣшалось безъ участія операціи. — Изъ множества ампутацій лучшій исходъ имѣли отнятія берца и предплечія. Ампутація бедра, особенно въ верхней трети, весьма часто оканчивалась неудачно, такъ что изъ подвергавшихся ей едва  $\frac{1}{4}$  осталась въ живыхъ. — Вылуценія изъ составовъ также нерѣдко имѣли не благопріятный исходъ. Вылученіе плеча въ немногихъ только случаяхъ обходилось безъ кровотеченія изъ подкрыльцовой артеріи; сверхъ того неизбежныя гнойныя подтѣки подъ большою грудною мышцею и отслойка хрящей членосоставной плечевой впадины заставляли предпочитать этой операціи ампутацію шейки плечевой кости, если сколько нибудь она была возможна. И послѣ вылуценія руки раны заживали весьма медленно, усложняясь обыкновенно гнойными затѣками около сухожилій и нерѣдко помертвѣніемъ въ доскутахъ обшихъ покрововъ. — Вылученіе бедряной кости изъ таза рѣшительно не имѣло успѣха; но во множествѣ случаевъ отлично удавалось вылученіе плюсны (*exarticulatio metatarsi*) по Шопарту и

таранно-берцового состава (*exarticulatio tarso-libialis*), по способу Пирогова.

---

Въ общемъ числѣ больныхъ, пользовавшихся въ гражданскихъ больницахъ, было

мущинъ . . . . .	269,617
женщинъ . . . . .	36,955
дѣтей. . . . .	5,851

Всего 312,423

Общее число дней, проведенныхъ ими въ больницахъ, равняется 8,141,200, что составляетъ среднимъ срокомъ пользованія каждаго отдѣльнаго случая  $26\frac{1}{20}$  дня.

Кромѣ того въ продолженіи 1856 года пользовано въ гражданскихъ больницахъ амбулаторнымъ леченіемъ 151,607 человекъ.

---





**ЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ВѢДОМОСТЬ**

**БОЛЕЗНЕЙ,**

**ПОЛЬЗОВАННЫХЪ ВЪ ГРАЖДАНСКИХЪ БОЛЬНИЦАХЪ,**

**ПО ГУБЕРНІЯМЪ.**



Губернии.	Горячки катарральныя, ревматическія и гастрическія.				Переменяющаяся лихорадка.				Тифъ.			
	польз.	вызд.	ум.	ост.	польз.	вызд.	ум.	ост.	польз.	вызд.	ум.	ост.
Архангельская...	56	53	—	3	13	11	2	—	76	61	12	3
Астраханская....	72	68	—	4	232	218	—	34	78	36	39	3
Бессарабская Обл.	245	216	16	13	91	80	4	7	92	57	23	12
Визенская.....	1887	1458	16	113	574	544	3	27	505	355	111	39
Витебская.....	243	223	5	13	616	606	10	—	408	280	120	8
Владимирская....	667	631	9	27	399	377	2	20	775	561	191	23
Вологодская.....	201	193	3	5	85	82	2	1	606	499	100	7
Волынская.....	474	449	21	4	975	921	28	26	323	218	94	11
Воронежская....	1728	1677	8	43	1482	1402	10	70	1197	927	186	84
Вятская.....	929	871	12	46	425	412	7	6	748	607	125	16
Гродненская.....	465	394	33	38	507	462	7	38	864	630	214	20
Екатеринославск..	1608	1538	7	63	1371	1467	11	93	1770	1368	372	30
Забайкальская Об.	73	70	1	2	33	33	—	—	30	20	6	4
Иркутская.....	154	149	—	3	13	12	—	1	89	63	22	4
Казанская.....	373	342	8	23	409	395	2	12	349	256	86	7
Калужская.....	1193	1140	36	17	861	835	5	21	1132	932	168	32
Кіевская.....	1011	925	52	34	1321	1237	20	64	1055	732	304	19
Ковенская.....	679	593	3	83	727	709	—	18	415	297	51	67
Костромская.....	464	439	2	23	177	143	—	4	552	406	129	17
Курляндская.....	214	199	7	8	1137	1094	25	18	167	112	34	1
Курская.....	1503	1410	8	83	1739	1703	10	46	1597	1231	313	53
Лифляндская.....	304	285	2	17	703	684	16	3	335	244	90	1
Минская.....	1106	1026	28	52	1208	1141	4	63	458	311	125	22
Могилевская.....	505	453	16	36	815	787	6	22	272	178	81	13
Московская.....	2125	2048	29	48	3334	3287	6	41	4460	3752	578	130
Нижегородская..	322	495	2	25	342	332	—	10	682	488	144	50
Новгородская....	293	288	2	3	266	263	3	—	311	229	74	8
Олонецкая.....	149	133	3	13	171	170	1	—	140	103	32	3
Оренбургская....	299	283	3	11	175	174	1	—	104	81	21	2
Орловская.....	640	601	1	38	422	396	3	23	1554	1297	211	46
Пензенская.....	121	104	9	8	259	253	—	6	136	103	28	5
Пермская.....	579	538	2	19	45	42	—	3	167	117	39	11
Подольская.....	1309	1200	69	40	802	761	26	15	970	697	262	11
Полтавская.....	3134	2970	30	114	3794	3645	20	129	5470	4330	1038	82
Псковская.....	1030	961	4	63	873	855	12	6	1294	994	278	22
Рязанская.....	489	448	8	33	498	473	5	20	342	251	74	17
Самарская.....	353	342	10	1	506	485	5	16	168	135	27	6
С. Петербургская.	1066	1032	10	24	370	350	8	12	3457	2472	869	116
Саратовская.....	610	572	6	32	645	624	3	18	322	201	111	10
Симбирская.....	300	471	3	26	898	863	4	31	301	232	60	9
Смоленская.....	556	514	13	29	457	413	17	27	700	467	218	15
Ставропольская..	17	16	—	1	23	22	—	1	34	27	8	2
Таврическая.....	81	73	1	7	539	511	1	27	922	607	291	24
Тамбовская.....	503	477	7	19	823	793	4	26	791	608	128	55
Тверская.....	682	623	32	27	490	464	23	3	960	668	261	31
Тифлисская.....	133	100	19	14	40	35	4	1	15	8	6	1
Тобольская.....	114	105	4	5	60	60	—	—	79	50	27	2
Томская.....	91	87	—	4	38	36	1	1	58	33	18	7
Тульская.....	884	838	3	43	1010	986	7	17	959	794	133	32
Харьковская.....	1471	1417	17	37	2964	919	4	41	1238	964	264	30
Херсонская.....	2608	2185	35	388	1020	964	4	52	2030	1482	330	18
Черниговская.....	2180	2037	16	127	394	2218	16	160	2930	2272	621	57
Эстляндская.....	294	264	4	26	41	40	1	—	43	32	6	5
Ярославская.....	465	406	21	38	184	176	4	4	390	287	80	23
Всего....	39154	36452	678	2024	37626	33985	357	1284	44960	34184	9450	1326

Холера.				Кривавый поносъ.				Острыя сыпи.				Рожа.			
ПОЛЪЗ.	ВЫЗД.	УМ.	ОСТ.	ПОЛЪЗ.	ВЫЗД.	УМ.	ОСТ.	ПОЛЪЗ.	ВЫЗД.	УМ.	ОСТ.	ПОЛЪЗ.	ВЫЗД.	УМ.	ОСТ.
—	—	—	—	14	6	8	—	7	7	—	—	3	2	—	1
41	17	24	—	52	21	29	2	6	6	—	—	5	2	—	3
2	—	2	—	33	38	13	2	5	4	1	—	26	20	1	5
313	184	129	—	187	140	39	8	85	72	8	5	55	43	4	8
105	48	37	—	112	75	36	1	26	25	1	—	32	25	2	5
12	1	11	—	121	66	53	2	27	21	1	5	26	22	—	4
—	—	—	—	17	9	8	—	15	14	1	—	9	8	1	—
9	9	—	—	114	66	45	3	33	32	3	—	53	45	2	6
6	2	4	—	146	124	20	2	166	134	5	27	78	74	3	1
1	1	—	—	122	110	11	1	60	56	4	—	40	37	2	1
6	4	2	—	212	134	76	2	24	23	1	—	39	35	2	2
3	3	—	—	429	275	141	13	92	80	7	5	72	63	1	8
—	—	—	—	11	10	1	—	16	15	—	1	—	—	—	—
1	—	1	—	12	10	2	—	12	9	—	3	4	3	1	—
2	—	2	—	51	36	14	1	13	13	—	—	21	16	4	1
7	5	2	—	196	103	93	—	65	61	3	1	58	53	—	5
1	1	—	—	255	159	93	3	43	38	3	2	128	110	6	12
62	29	25	8	185	145	6	34	17	14	—	3	29	25	1	3
10	4	6	—	67	38	27	2	8	6	1	1	15	10	2	3
52	24	26	2	50	33	17	—	60	52	5	3	31	29	—	2
15	11	4	—	240	184	51	5	88	82	2	4	97	88	3	6
21	10	11	—	6	3	3	—	16	13	3	—	41	38	2	1
7	5	2	—	192	138	47	7	40	37	1	2	108	96	2	10
6	6	—	—	119	72	40	7	57	51	2	4	49	42	4	3
479	232	247	—	579	448	118	13	401	362	89	—	298	277	9	12
240	94	145	1	32	24	7	1	35	32	2	1	29	21	4	4
71	19	32	—	85	50	33	2	22	17	1	4	27	19	1	7
7	4	3	—	14	7	6	1	27	26	1	—	12	9	1	2
—	—	—	—	17	16	1	—	9	9	—	—	24	24	—	—
5	4	1	—	111	78	30	3	37	52	3	2	65	58	1	6
1	—	1	—	18	13	2	3	43	41	1	1	16	13	2	1
—	—	—	—	9	8	1	—	19	19	—	—	13	13	—	—
4	4	—	—	140	98	35	7	14	13	—	1	71	56	5	10
—	—	—	—	993	673	308	12	132	112	9	11	137	139	9	9
41	17	24	—	106	38	67	1	65	53	8	4	31	24	2	5
5	1	4	—	70	32	18	—	23	18	4	1	41	37	1	3
69	32	37	—	40	34	3	3	4	4	—	—	38	37	1	—
930	399	518	13	140	97	40	3	66	48	10	8	158	109	26	23
64	25	39	—	109	70	32	7	10	9	1	—	83	74	3	6
5	2	3	—	31	22	9	—	19	18	1	—	68	63	2	3
8	2	6	—	175	111	62	2	29	20	1	8	30	25	1	4
—	—	—	—	8	8	—	—	3	3	—	—	6	6	—	—
10	3	7	—	430	306	124	—	110	94	6	10	41	40	1	—
1	—	1	—	68	38	29	1	83	74	8	1	57	49	4	4
37	14	43	—	148	87	58	3	48	34	12	2	48	40	6	2
—	—	—	—	19	10	9	—	21	10	3	8	7	5	1	1
—	—	—	—	3	3	2	—	7	6	1	—	10	8	1	1
—	—	—	—	15	10	3	2	2	2	—	—	3	3	—	—
3	1	2	—	189	134	50	5	63	59	3	1	46	45	—	1
—	—	—	—	169	113	50	6	60	55	4	1	75	66	2	7
29	23	6	—	589	328	254	7	31	22	5	4	103	94	2	9
7	—	7	—	383	240	131	12	81	57	9	15	176	158	4	14
1	—	1	—	8	7	—	1	72	54	7	11	8	5	1	2
21	7	14	—	62	41	20	1	11	9	—	2	21	15	3	3
2740	1247	1468	25	7725	5159	2375	191	2550	2197	191	162	2783	2418	136	229



Губернии.	Катарръ дыхатель- ныхъ органовъ.				Ревматизмъ.				Воспаленіе мозга.			
	польз.	вызд.	ум.	ост.	польз.	вызд.	ум.	ост.	польз.	вызд.	ум.	ост.
Архангельская...	47	43	1	3	62	34	1	7	3	2	—	3
Астраханская...	16	13	—	1	131	140	1	10	3	1	2	—
Бессарабская Обл.	20	17	3	—	136	122	4	10	9	6	3	—
Виленьская.....	234	214	3	17	425	384	3	36	119	78	41	3
Витебская.....	82	81	1	—	249	229	6	14	6	1	3	—
Владимірская.....	133	129	2	4	193	182	1	10	16	10	6	—
Вологодская.....	21	20	—	1	78	70	1	7	4	4	—	—
Волынская.....	118	96	11	11	449	434	7	8	20	13	6	1
Воронежская.....	—	—	—	—	726	663	2	61	63	47	18	—
Вятская.....	62	59	2	1	441	426	2	13	11	6	5	—
Гродненская.....	11	10	—	1	490	467	4	19	20	18	2	—
Екатеринославск.	84	81	—	3	743	678	1	64	31	18	12	1
Забайкальская Об.	—	—	—	—	36	34	—	2	4	2	2	—
Иркутская.....	14	12	—	2	113	106	1	6	1	1	—	—
Казанская.....	9	8	1	—	223	207	1	13	7	3	1	1
Калужская.....	62	56	—	6	441	428	2	11	16	10	4	2
Кіевская.....	73	71	—	4	490	456	13	28	6	4	2	—
Ковенская.....	117	98	1	18	526	442	1	83	10	2	7	1
Костромская.....	34	32	—	2	109	97	—	12	4	3	1	—
Курляндская.....	379	341	6	32	351	322	3	24	11	9	2	—
Курская.....	138	137	—	1	509	474	4	31	14	6	8	—
Лифляндская.....	33	47	—	6	213	203	2	10	9	3	5	1
Минская.....	88	80	2	6	394	367	—	27	21	18	2	1
Могилевская.....	174	160	12	2	273	253	2	16	20	14	6	—
Московская.....	16	16	—	—	1193	1078	44	73	3	4	1	—
Нижегородская...	179	148	6	23	228	201	—	27	8	4	3	1
Новгородская.....	112	104	3	3	69	62	—	7	12	6	5	1
Олонецкая.....	1	1	—	—	100	90	—	10	4	4	—	—
Оренбургская.....	46	42	—	4	127	121	—	6	4	4	—	—
Орловская.....	96	83	4	9	456	438	1	17	18	9	9	—
Пензенская.....	124	121	3	—	204	187	—	17	—	—	—	—
Пермская.....	101	93	4	4	99	96	1	2	4	3	1	—
Подольская.....	113	108	2	3	396	362	7	27	18	16	2	—
Полтавская.....	90	84	3	1	931	886	2	63	25	17	8	—
Псковская.....	—	—	—	—	372	323	3	46	41	31	10	—
Рязанская.....	82	76	—	6	272	250	2	20	11	9	—	2
Самарская.....	52	48	—	4	206	193	1	10	10	9	1	—
С. Петербургская.	148	128	8	12	533	474	9	30	49	26	23	—
Саратовская.....	20	18	1	1	481	438	3	20	4	4	—	—
Симбирская.....	143	143	1	1	329	303	3	19	6	4	2	—
Смоленская.....	63	56	4	3	248	214	3	29	2	1	1	—
Ставропольская..	10	10	—	—	15	14	—	1	4	3	—	1
Таврическая.....	44	40	4	—	86	76	3	3	23	18	7	—
Тамбовская.....	81	73	2	6	275	263	1	9	9	4	4	1
Тверская.....	29	22	3	2	363	333	7	21	24	12	7	2
Тифлисская.....	10	6	4	—	26	20	3	3	3	2	3	—
Тобольская.....	146	138	3	3	186	168	3	13	14	13	1	—
Томская.....	4	4	—	—	103	96	1	6	—	—	—	—
Тульская.....	127	117	1	9	332	313	3	14	16	11	5	—
Харьковская.....	266	222	40	4	443	419	3	23	37	23	13	1
Херсонская.....	112	100	6	6	930	882	3	63	36	19	13	4
Черниговская....	634	578	33	41	613	551	8	56	21	13	8	—
Эстляндская.....	9	9	—	—	49	44	—	3	1	—	1	—
Ярославская.....	8	8	—	—	381	348	3	30	6	4	2	—
Всего....	5063	4603	188	272	18044	16633	191	1220	848	531	270	27

Апоплексія и пара- личъ.	Эпилепсія.				Невралгін.				Болѣзни судорож- ныя.			
	польз.	вызд.	ум.	ост.	польз.	вызд.	ум.	ост.	польз.	вызд.	ум.	ост.
18	12	4	2	3	2	1	—	—	3	3	—	—
19	8	8	3	7	3	1	—	—	3	4	—	—
9	6	2	1	8	4	1	3	—	2	2	—	—
36	22	8	6	12	12	—	—	—	47	42	—	—
30	12	13	3	22	19	1	2	—	21	20	—	—
28	14	11	3	3	3	1	1	—	21	21	—	—
14	4	4	2	3	3	1	1	—	11	10	—	—
34	10	21	3	22	17	—	5	—	17	17	—	—
43	24	17	4	37	23	6	8	—	63	32	2	—
29	19	7	3	39	38	1	—	—	13	14	—	—
10	6	4	—	2	2	—	—	—	4	4	—	—
27	8	17	2	24	17	5	2	—	33	31	—	—
8	4	3	1	3	3	—	—	—	7	7	—	—
30	13	11	4	9	8	1	—	—	9	8	1	—
62	23	37	2	17	13	2	2	—	10	9	1	—
73	41	22	10	21	13	2	6	—	70	67	2	—
39	21	14	4	34	39	5	10	—	11	11	—	—
24	12	10	2	4	4	—	—	—	38	30	1	—
14	10	4	—	14	10	1	3	—	47	42	—	—
48	22	24	2	23	24	—	1	—	44	44	—	—
31	10	12	9	13	10	—	5	—	28	23	3	—
21	7	11	3	14	9	2	3	—	23	23	—	—
27	13	9	3	14	10	2	2	—	33	49	1	—
40	17	18	3	18	11	3	4	—	30	48	—	—
36	22	12	2	6	6	—	—	—	33	30	2	—
41	24	13	4	20	16	2	2	—	102	100	—	—
17	8	7	2	17	17	—	—	—	12	9	1	—
13	6	3	2	13	10	—	3	—	11	11	—	—
17	12	4	1	8	7	—	1	—	17	16	—	—
38	21	14	3	14	10	—	4	—	6	6	—	—
14	10	4	—	12	9	—	3	—	48	43	—	—
10	7	2	1	18	18	—	—	—	18	18	—	—
41	20	14	7	27	19	2	6	—	27	23	2	—
37	19	31	7	18	9	2	7	—	40	37	—	—
40	12	27	1	21	10	6	5	—	24	21	—	—
23	10	12	1	33	31	—	4	—	9	8	1	—
8	7	1	—	28	26	1	1	—	83	73	6	—
32	24	27	1	9	8	—	1	—	20	18	1	—
49	23	20	4	16	14	1	1	—	13	13	—	—
29	19	4	6	19	15	2	2	—	23	24	—	—
36	24	7	3	28	16	4	8	—	31	40	7	—
18	16	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	10	3	—	8	7	—	1	—	26	20	6	—
23	14	9	2	26	23	—	1	—	19	17	2	—
79	41	29	9	31	24	4	3	—	20	15	3	—
7	4	2	1	1	1	—	—	—	1	1	—	—
19	12	3	4	6	6	—	—	—	20	19	1	—
16	7	6	3	2	—	1	1	—	10	10	—	—
69	43	13	11	17	16	1	—	—	32	28	3	—
34	19	14	1	36	23	2	11	—	17	16	—	—
102	31	64	7	24	18	3	1	—	18	18	—	—
43	31	8	4	34	42	3	9	—	17	16	—	—
12	3	3	4	8	3	2	1	—	18	18	—	—
49	22	21	6	18	18	—	—	—	14	13	—	—
1723	863	679	179	934	743	74	133	—	1427	1306	48	73
									200	184	3	13



Губернии.	Запой.				Болезни психическія.				Болезни спинного мозга.			
	польз.	вызд.	ум.	ост.	польз.	вызд.	ум.	ост.	польз.	вызд.	ум.	ост.
Архангельская...	2	2	—	—	24	16	2	6	—	—	—	—
Астраханская...	11	11	—	—	36	13	1	22	2	1	1	—
Бессарабская Обл.	6	3	1	—	34	24	5	5	1	1	—	—
Виленьская.....	6	6	—	—	101	44	14	43	36	32	2	2
Витебская.....	7	7	—	—	31	12	1	18	3	2	—	1
Владимирская.....	11	11	—	—	47	21	9	17	5	4	1	—
Вологодская.....	3	3	—	—	49	29	7	13	4	4	—	—
Волынская.....	10	10	—	—	41	27	1	13	8	5	3	—
Воронежская.....	14	14	—	—	87	67	3	17	24	16	7	1
Вятская.....	4	4	—	—	63	48	3	14	9	8	1	—
Гродненская.....	1	—	1	—	23	13	3	3	3	2	1	—
Екатеринославск..	10	8	2	—	126	29	29	68	23	15	6	2
Забайкальская Об.	3	3	—	—	3	4	—	—	7	5	2	—
Иркутская.....	38	33	2	1	39	13	4	22	1	—	1	—
Казанская.....	1	—	1	—	21	19	—	2	3	1	4	—
Калужская.....	6	6	—	—	94	48	7	39	38	34	4	—
Кіевская.....	17	14	2	1	103	46	13	46	3	3	2	—
Ковенская.....	7	5	—	2	20	12	2	6	—	—	—	—
Костромская.....	1	1	—	—	11	9	1	1	—	—	—	—
Курляндская.....	10	10	—	—	20	17	1	2	8	4	2	2
Курская.....	20	19	—	1	98	30	15	53	19	18	—	1
Лифляндская.....	12	10	1	1	108	31	13	62	1	1	—	—
Минская.....	10	10	—	—	26	23	—	3	12	9	1	2
Могилевская.....	4	3	—	1	50	24	5	21	9	8	1	—
Московская.....	4	4	—	—	56	27	22	7	1	—	1	—
Нижегородская.....	26	23	—	1	73	39	7	27	8	7	—	1
Новгородская.....	14	14	—	—	53	20	8	27	3	2	1	—
Олонецкая.....	4	2	2	—	6	6	—	—	3	1	—	2
Оренбургская.....	—	—	—	—	13	13	—	—	—	—	—	—
Орловская.....	8	8	—	—	84	37	12	33	4	4	—	—
Пензенская.....	3	3	—	—	37	12	3	22	4	4	—	—
Пермская.....	11	11	—	—	66	37	4	25	—	—	—	—
Подольская.....	3	2	—	1	96	63	11	22	3	3	—	—
Полтавская.....	12	11	1	—	118	50	14	54	9	5	1	3
Псковская.....	9	9	—	—	47	27	5	13	9	9	—	—
Рязанская.....	9	9	—	—	66	30	7	29	20	11	5	4
Самарская.....	7	7	—	—	36	23	1	12	1	1	—	—
С. Петербургская.	12	10	1	1	7	7	—	—	34	22	9	3
Саратовская.....	15	12	3	—	22	18	1	3	2	1	1	—
Симбирская.....	10	9	1	—	20	17	1	2	4	1	2	1
Смоленская.....	6	4	—	2	39	24	5	10	32	16	10	6
Ставропольская..	4	4	—	—	28	18	—	10	—	—	—	—
Таврическая.....	6	6	—	—	86	53	12	21	25	23	2	—
Тамбовская.....	10	7	1	2	107	41	14	52	7	2	5	—
Тверская.....	23	21	1	1	113	68	17	30	5	4	—	1
Тифлисская.....	8	6	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—
Тобольская.....	2	2	—	—	38	24	2	12	5	3	2	—
Томская.....	21	20	1	—	18	12	3	3	6	5	1	—
Тульская.....	8	6	1	1	91	40	6	43	8	7	—	1
Харьковская.....	24	21	2	1	126	52	21	53	13	11	—	2
Херсонская.....	18	18	—	—	134	76	20	38	7	4	1	2
Черниговская.....	26	25	1	—	99	54	9	36	16	9	5	2
Эстляндская.....	21	13	3	3	27	19	2	6	2	1	1	—
Ярославская.....	23	20	2	1	80	38	7	33	3	2	—	1
Всего....	561	508	31	22	3035	1570	337	1129	437	331	86	40

Болезни ушной полости.				Офтальм.				Катаракта.				Амаврозъ.			
польз.	вызд.	ум.	ост.	польз.	вызд.	ум.	ост.	польз.	вызд.	ум.	ост.	польз.	вызд.	ум.	ост.
2	2	—	—	3	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	19	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	7	—	—	29	26	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
41	36	—	5	207	189	—	18	1	1	—	—	13	11	—	2
14	13	—	1	77	74	—	3	—	—	—	—	4	4	—	—
14	14	—	—	61	53	—	6	—	—	—	—	1	1	—	—
7	6	—	1	36	49	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—
9	7	—	2	111	103	2	6	1	1	—	—	2	2	—	—
49	41	—	8	276	234	—	42	2	2	—	—	2	1	—	1
29	27	1	1	124	116	—	8	2	2	—	—	—	—	—	—
3	3	—	—	54	49	1	4	—	—	—	—	1	—	—	1
7	5	—	2	260	239	1	20	9	6	—	3	3	3	—	—
—	—	—	—	12	11	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	—	—	22	18	—	4	6	5	—	1	3	2	—	1
7	7	—	—	72	68	—	4	—	—	—	—	1	1	—	—
42	40	—	2	196	183	—	11	3	3	—	—	5	5	—	—
5	4	—	1	98	92	—	6	1	—	—	1	—	—	—	—
2	2	—	—	220	179	—	41	1	1	—	—	5	1	1	3
4	4	—	—	79	71	—	8	1	1	—	—	—	—	—	—
11	10	—	1	233	222	1	10	1	—	—	1	2	1	—	1
11	10	—	1	192	179	—	13	5	2	—	3	—	—	—	—
13	13	—	—	133	126	—	9	2	2	—	—	—	—	—	—
26	22	—	4	143	134	—	9	2	2	—	—	6	6	—	—
4	2	—	2	91	83	—	6	1	1	—	—	—	—	—	—
10	10	—	—	66	64	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—
27	26	—	1	111	103	—	8	2	2	—	—	4	4	—	—
11	10	—	1	49	48	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
9	9	—	—	33	32	—	1	1	1	—	—	2	1	—	1
3	3	—	—	29	28	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—
14	14	—	—	123	114	—	9	7	6	—	1	—	—	—	—
20	20	—	—	73	69	—	4	1	1	—	—	5	4	—	1
34	34	—	—	52	50	—	2	4	4	—	—	—	—	—	—
4	4	—	—	101	94	—	7	3	3	—	—	1	1	—	—
19	17	—	2	408	387	2	19	2	—	—	2	2	1	—	1
5	5	—	—	773	738	1	34	2	2	—	—	1	—	—	1
53	34	—	1	81	73	—	8	1	1	—	—	—	—	—	—
23	23	—	—	98	98	—	—	3	3	—	—	2	2	—	—
14	12	1	1	69	62	—	7	2	2	—	—	3	3	—	—
13	12	—	1	94	91	—	3	4	3	1	—	2	—	—	2
32	31	1	—	132	123	—	9	1	1	—	—	2	2	—	—
6	6	—	—	88	80	2	6	1	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	14	—	—	38	37	1	—	4	3	—	1	13	13	—	—
32	31	—	1	100	90	1	9	3	3	—	—	5	5	—	—
67	58	5	4	307	278	14	15	1	1	—	—	3	3	—	—
—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—
50	29	—	1	30	27	—	3	3	2	—	1	—	—	—	—
2	2	—	—	18	14	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
17	15	—	2	73	71	—	4	2	2	—	—	6	2	2	2
32	29	1	2	130	117	—	13	13	14	—	1	4	3	—	1
19	18	—	1	220	200	—	20	10	7	—	3	2	2	—	—
37	36	—	1	336	328	1	27	1	1	—	—	6	6	—	—
5	5	—	—	18	14	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
30	29	1	—	347	329	1	17	—	—	—	—	3	3	—	—
894	834	40	50	6795	6290	29	476	114	95	1	18	119	98	3	18



Губерніи.	Болезни носовой полости.				Болезни рта, зѣва и глотки.				Жаба.			
	польз.	вызд.	ум.	ост.	польз.	вызд.	ум.	ост.	польз.	вызд.	ум.	ост.
Архангельская...	1	1	—	—	1	1	—	—	7	6	1	—
Астраханская...	1	—	—	1	—	—	—	—	7	6	—	1
Бессарабская Обл.	—	—	—	—	6	6	—	—	2	2	—	—
Виленьская...	3	3	—	—	110	98	7	3	13	12	—	1
Витебская...	1	1	—	—	22	21	—	1	20	20	—	—
Владимирская...	—	—	—	—	—	—	—	—	16	16	—	—
Вологодская...	—	—	—	—	3	3	—	—	30	27	2	1
Волынская...	—	—	—	—	9	6	—	3	13	14	—	1
Воронежская...	4	3	—	1	9	8	—	1	123	109	3	11
Вятская...	—	—	—	—	8	8	—	—	63	61	—	4
Гродненская...	—	—	—	—	4	2	—	2	25	21	—	4
Екатеринославск.	2	1	—	1	8	3	1	2	26	23	—	1
Забайкальская Об.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Иркутская...	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—
Казанская...	1	1	—	—	6	3	—	1	38	36	—	2
Калужская...	12	11	—	1	13	12	—	1	67	63	—	2
Киевская...	—	—	—	—	8	6	2	—	21	17	1	3
Ковенская...	—	—	—	—	12	11	—	1	3	3	—	—
Костромская...	1	1	—	—	3	3	—	—	4	4	—	—
Курляндская...	—	—	—	—	11	11	—	—	33	31	2	2
Курская...	—	—	—	—	13	13	—	—	47	43	—	2
Лифляндская...	—	—	—	—	9	9	—	—	16	16	—	—
Минская...	17	17	—	—	36	33	—	3	14	10	2	2
Могилевская...	1	1	—	—	14	14	—	—	38	33	4	1
Московская...	1	1	—	—	6	3	—	1	261	227	13	21
Нижегородская...	—	—	—	—	13	13	—	—	22	21	—	1
Новгородская...	—	—	—	—	1	1	—	—	21	19	1	1
Олонецкая...	8	6	—	2	3	4	1	—	23	23	—	—
Оренбургская...	—	—	—	—	—	—	—	—	31	29	2	—
Орловская...	—	—	—	—	4	2	1	1	38	33	1	4
Пензенская...	4	4	—	—	2	2	—	—	31	23	2	4
Пермская...	—	—	—	—	12	12	—	—	22	21	—	1
Подольская...	—	—	—	—	7	7	—	—	22	18	1	3
Полтавская...	12	11	—	1	10	10	—	—	93	91	1	3
Псковская...	—	—	—	—	1	1	—	—	47	44	1	2
Рязанская...	—	—	—	—	3	3	—	—	38	34	—	4
Самарская...	—	—	—	—	7	7	—	—	33	33	—	—
С. Петербургская.	—	—	—	—	3	3	—	—	82	74	2	6
Саратовская...	—	—	—	—	1	1	—	—	31	30	—	1
Симбирская...	—	—	—	—	28	26	—	2	48	44	4	—
Смоленская...	1	1	—	—	4	4	—	—	18	13	—	3
Ставропольская...	1	1	—	—	1	1	—	—	6	6	—	—
Таврическая...	13	13	—	—	3	4	1	—	19	14	3	—
Тамбовская...	—	—	—	—	11	10	—	1	48	47	—	1
Тверская...	3	3	—	—	13	14	—	1	43	44	1	—
Тифлисская...	—	—	—	—	1	1	—	—	7	7	—	—
Тобольская...	1	—	—	1	17	17	—	—	14	13	1	—
Томская...	—	—	—	—	2	2	—	—	19	16	—	3
Тульская...	10	8	—	2	18	13	1	2	33	49	1	3
Харьковская...	—	—	—	—	18	13	3	—	97	88	7	2
Херсонская...	13	10	—	3	73	61	3	11	128	117	—	11
Черниговская...	2	2	—	—	10	9	—	1	90	76	3	11
Эстляндская...	—	—	—	—	1	1	—	—	9	9	—	—
Ярославская...	1	1	—	—	—	—	—	—	37	49	1	7
Всего....	116	103	—	13	392	332	20	40	2140	1946	62	132

Воспаление предъ-ушной железы.				Афтозный процессъ.				Крупъ.				Коклюшъ.			
польз.	вызд.	ум.	ост.	польз.	вызд.	ум.	ост.	польз.	вызд.	ум.	ост.	польз.	вызд.	ум.	ост.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—
7	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	38	3	3	29	19	6	4	47	27	19	1	16	12	1	3
12	11	—	1	1	1	—	—	6	3	2	1	6	6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	—	—	—	—	—	—
7	3	1	1	13	13	1	1	12	10	1	1	12	12	—	—
28	26	1	1	4	4	—	—	6	4	2	—	12	12	—	—
4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12	—	—
14	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	16	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	4	—	—
16	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	—	—
13	11	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	3	3	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	4	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	10	10	—	—
29	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	7	—	1	2	2	—	—	2	—	1	1	2	2	—	—
9	9	—	—	—	—	—	—	10	9	1	1	14	12	—	2
13	13	—	—	—	—	—	—	23	21	3	1	9	7	1	1
4	3	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	14	—	—	—	—	—	—	13	14	1	—	—	—	—	—
1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	—	—	—	—	—	—
12	6	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	2	2	—	—
2	1	—	1	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
23	22	—	3	2	1	1	—	2	1	1	—	1	—	—	1
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	—	3	3	—	—
6	3	—	3	—	—	—	—	1	1	—	—	69	66	—	3
8	8	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	44	—	—	—	—	—	—	22	20	2	—	19	19	—	—
13	14	—	1	—	—	—	—	7	7	—	—	—	—	—	—
9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
20	16	2	2	—	—	—	—	9	9	—	—	—	—	—	—
26	19	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—
11	9	2	—	—	—	—	—	3	2	1	—	3	3	—	—
12	11	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—
2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
467	417	17	33	37	42	10	5	203	138	42	3	221	206	2	13




Губернии.	Воспаление плевры и легких.				Провоухарканіе.				Туберкулёзъ.			
	польз.	вызд.	ум.	ост.	польз.	вызд.	ум.	ост.	польз.	вызд.	ум.	ост.
Архангельская...	69	60	5	4	9	6	2	1	23	8	14	3
Астраханская....	50	40	10	—	4	3	—	1	43	12	29	4
Бессарабская Обл.	78	60	9	9	3	3	—	—	37	22	29	6
Виленьская.....	730	531	111	68	78	49	26	3	203	89	98	18
Витебская.....	310	262	30	18	10	5	5	—	120	74	42	4
Владимирская....	139	103	28	8	3	3	2	—	96	28	61	7
Вологодская.....	99	93	4	—	3	3	—	—	73	36	31	6
Вольнская.....	653	473	107	73	25	23	2	—	139	39	64	16
Воронежская....	463	396	36	33	14	12	2	—	141	33	67	21
Вятская.....	331	296	24	11	8	6	—	2	120	34	62	4
Гродненская.....	373	302	53	20	48	38	7	3	223	74	133	18
Екатеринославск.	537	391	126	20	49	37	12	—	279	94	170	15
Забайкальская Об.	23	19	2	2	—	—	—	—	14	7	4	3
Иркутская.....	53	46	3	1	7	2	4	1	19	6	13	—
Казанская.....	84	72	9	3	4	3	1	—	61	21	35	3
Калужская.....	324	271	42	11	19	17	1	1	289	64	206	19
Кіевская.....	420	318	81	21	4	—	3	1	198	81	103	12
Ковенская.....	530	430	23	73	8	4	1	3	139	79	60	20
Костромская.....	126	94	24	8	9	6	3	—	71	29	31	11
Курляндская.....	297	229	32	16	11	7	4	—	192	60	124	11
Курская.....	561	441	92	28	25	18	4	3	130	61	62	7
Лифляндская....	169	130	28	11	11	11	—	—	106	35	63	6
Минская.....	733	631	89	33	26	17	5	4	304	133	130	21
Могилевская.....	433	361	68	24	3	2	3	—	216	110	90	16
Московская.....	1069	920	108	41	7	6	1	—	810	460	283	67
Нижегородская..	233	197	22	14	14	7	2	3	133	34	107	12
Новгородская....	101	88	10	3	1	—	1	—	120	40	76	4
Олонекская.....	99	80	10	9	8	7	—	1	27	14	9	4
Оренбургская....	74	62	7	5	4	3	1	—	16	6	9	1
Орловская.....	216	163	34	17	19	16	3	—	137	34	94	9
Пензенская.....	130	133	11	6	7	4	1	2	49	6	39	4
Пермская.....	101	95	2	4	3	3	—	—	49	22	24	3
Подольская.....	788	673	73	40	33	23	7	1	183	86	88	11
Полтавская.....	1461	1200	197	64	40	23	13	2	383	270	277	36
Псковская.....	474	336	109	29	3	3	2	—	246	39	183	4
Рязанская.....	217	180	13	22	8	7	—	1	128	34	79	13
Самарская.....	241	202	31	8	1	1	—	—	28	13	14	1
С. Петербургская	326	242	73	9	13	8	6	1	371	113	244	12
Саратовская.....	321	280	33	6	3	3	—	—	113	63	41	11
Симбирская.....	289	236	23	10	10	9	1	—	139	66	62	11
Смоленская.....	303	253	25	25	14	10	3	1	118	47	63	6
Ставропольская..	29	24	3	2	1	1	—	—	9	3	3	1
Таврическая.....	68	58	10	—	10	8	2	—	13	7	7	1
Тамбовская.....	139	120	13	6	6	3	1	—	131	41	81	9
Тверская.....	333	246	72	13	28	22	3	1	193	81	106	6
Тифлисская.....	11	9	1	1	—	—	—	—	3	2	1	—
Тобольская.....	72	63	6	3	10	10	—	—	32	23	23	4
Томская.....	40	33	3	2	2	2	—	—	20	12	8	—
Тульская.....	235	171	46	18	11	8	2	1	279	122	136	21
Харьковская.....	641	542	73	24	10	7	2	1	177	62	106	9
Херсонская.....	501	413	73	13	38	24	12	2	334	173	132	9
Черниговская....	687	517	113	53	21	13	3	1	213	70	128	15
Эстляндская.....	70	53	8	7	3	4	1	—	43	13	23	9
Ярославская.....	280	235	33	10	6	4	2	—	133	57	60	18
Всего.....	17224	13943	2312	967	727	522	162	43	8164	3324	4274	566

Эмфизема и разные виды одышки.				Воспаление венъ.				Воспаление сердца и артерій.				Органическія болѣзни сердца и артерій.			
польз.	вызд.	ум.	ост.	польз.	вызд.	ум.	ост.	польз.	вызд.	ум.	ост.	польз.	вызд.	ум.	ост.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	9	1	1
3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
12	3	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—
38	24	11	3	2	1	—	1	—	—	—	—	16	7	7	2
72	30	12	10	—	—	—	—	1	1	—	—	5	2	3	—
6	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—
13	12	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	1	—
38	17	12	6	3	1	1	1	9	7	2	—	14	3	8	1
126	97	23	6	3	4	1	—	18	14	1	3	33	17	10	6
114	85	26	3	1	1	—	—	—	—	—	—	6	6	—	—
44	30	8	6	3	3	2	—	—	—	—	—	7	—	7	—
117	100	3	12	—	—	—	—	11	10	—	1	18	17	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	10	—	2
39	18	18	3	—	—	—	—	—	—	—	—	10	7	3	—
4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—
52	33	9	10	12	10	1	1	4	4	—	—	13	13	—	2
24	16	4	4	—	—	—	—	3	3	—	2	24	13	9	—
41	30	—	11	—	—	—	—	3	1	2	—	1	1	—	—
33	13	16	4	—	—	—	—	—	—	—	—	19	17	1	1
33	32	20	3	2	1	—	1	1	1	—	—	3	1	1	1
39	22	13	4	—	—	—	—	—	—	—	—	14	9	3	—
23	14	4	7	1	1	—	—	1	1	—	—	10	7	3	—
33	36	7	10	6	2	1	3	6	3	1	—	9	7	2	—
38	18	13	7	2	2	—	—	4	4	—	—	7	4	3	—
73	52	13	8	—	—	—	—	2	—	1	1	8	3	3	—
19	13	2	2	—	—	—	—	1	—	1	—	8	8	—	—
37	28	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3	4	—
17	13	2	2	—	—	—	—	2	2	—	—	3	4	1	—
11	10	1	—	2	2	—	—	48	43	3	2	—	—	—	—
46	33	13	—	—	—	—	—	2	2	—	—	7	1	6	—
7	4	2	1	—	—	—	—	1	—	1	—	4	3	—	1
18	17	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	12	1	2
68	52	9	7	—	—	—	—	—	—	—	—	15	12	3	—
163	111	33	19	—	—	—	—	4	4	—	—	26	23	1	—
89	73	7	7	—	—	—	—	9	4	3	—	8	6	2	—
83	72	9	4	1	1	—	—	1	—	1	—	22	12	10	—
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	2	—
30	18	9	3	1	1	—	—	10	8	2	—	24	16	8	—
70	34	9	7	—	—	—	—	4	3	1	—	2	2	—	—
42	37	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	1	—
44	33	9	2	9	6	1	2	1	1	—	—	7	7	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	1	2	—	17	10	1	—	9	7	2	—	12	12	—	—
96	81	4	11	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	1	—
43	34	9	—	3	3	—	—	3	2	1	—	7	3	4	—
3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	8	3	4	—	—	—	—	1	1	—	—	14	7	7	—
9	5	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—
43	27	8	8	1	1	—	—	3	3	1	1	13	8	3	—
46	32	8	6	3	3	—	—	3	2	1	—	13	6	2	3
53	47	3	3	2	2	—	—	3	—	3	—	31	18	10	3
98	66	11	21	1	1	—	—	1	1	—	—	14	12	1	1
3	—	3	—	1	1	—	—	1	1	—	—	6	4	2	—
19	10	7	2	1	1	—	—	10	6	3	1	11	9	1	1
2237	1597	398	242	81	64	8	9	184	141	32	11	349	380	140	29



Губерн.	Катарръ желудка и кишекъ.				Воспаленіе желудка и кишекъ.				Заворотъ кишекъ.			
	ПОЛЪЗ.	ВЫЗД.	УМ.	ОСТ.	ПОЛЪЗ.	ВЫЗД.	УМ.	ОСТ.	ПОЛЪЗ.	ВЫЗД.	УМ.	ОСТ.
Архангельская...	2	1	1	—	3	2	1	—	—	—	—	—
Астраханская....	26	23	—	1	5	5	—	—	1	—	1	—
Бессарабская Обл.	9	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Виленская.....	108	87	18	3	—	—	—	—	3	1	4	—
Витебская.....	88	73	11	2	—	—	—	—	1	—	1	—
Владимирская....	79	63	12	4	2	1	1	—	—	—	—	—
Вологодская....	32	49	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Волынская.....	189	163	19	5	2	2	—	—	—	—	—	—
Воронежская....	321	237	26	38	22	16	4	2	1	1	—	—
Вятская.....	196	179	14	3	7	4	3	—	—	—	—	—
Гродненская.....	148	116	28	4	38	23	10	3	—	—	—	—
Екатеринославск.	74	60	9	3	7	6	1	—	1	—	1	—
Забайкальская Об.	14	12	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Иркутская.....	24	24	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—
Казанская.....	29	27	1	1	10	8	1	1	2	1	1	—
Калужская.....	272	242	12	18	—	—	—	—	—	—	—	—
Кіевская.....	518	411	94	13	7	5	2	—	1	—	—	1
Ковенская.....	84	72	1	11	—	—	—	—	2	—	2	—
Костромская....	80	74	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Курляндская....	694	619	60	13	23	18	4	1	—	—	—	—
Курская.....	238	186	41	8	22	13	4	3	—	—	—	—
Лифляндская....	160	144	11	5	5	5	—	—	—	—	—	—
Минская.....	207	178	27	2	11	10	1	—	1	—	1	—
Могилевская....	187	164	22	1	20	14	5	1	—	—	—	—
Московская.....	122	107	11	4	26	17	8	1	—	—	—	—
Нижегородская..	498	449	21	28	30	22	6	2	1	—	1	—
Новгородская....	123	106	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Олопецкая.....	178	162	10	6	1	—	1	—	—	—	—	—
Оренбургская....	92	87	2	3	5	3	1	1	—	—	—	—
Орловская.....	350	283	36	29	4	3	—	1	—	—	—	—
Пензенская.....	103	95	3	7	18	13	3	2	—	—	—	—
Пермская.....	44	42	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Подольская....	219	189	19	11	—	—	—	—	—	—	—	—
Полтавская.....	392	314	39	19	24	17	7	—	—	—	—	—
Псковская.....	474	323	142	7	41	22	18	1	2	—	2	—
Рязанская.....	78	72	5	1	2	—	—	—	—	—	—	—
Самарская.....	340	304	27	9	—	—	—	—	—	—	—	—
С. Петербургская.	399	362	186	31	23	17	6	2	—	—	—	—
Саратовская....	74	68	4	2	10	10	—	—	—	—	—	—
Симбирская.....	131	137	3	11	12	10	2	—	—	—	—	—
Смоленская.....	249	131	91	7	4	3	—	1	—	—	—	—
Ставропольская..	4	3	—	1	6	5	1	—	—	—	—	—
Таврическая....	85	73	7	3	3	2	1	—	—	—	—	—
Тамбовская.....	133	118	7	8	3	2	1	—	—	—	—	—
Тверская.....	321	283	30	6	24	15	8	1	—	—	—	—
Тифлисская.....	10	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Тобольская.....	15	14	1	—	5	3	2	—	—	—	—	—
Томская.....	23	24	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Тульская.....	74	60	6	8	—	—	—	—	—	—	—	—
Харьковская....	229	214	5	10	—	—	—	—	1	—	1	—
Херсонская.....	434	398	30	6	—	—	—	—	1	—	1	—
Черниговская....	277	222	41	14	8	3	4	1	—	—	—	—
Эстляндская.....	34	31	3	—	4	3	1	—	1	1	—	—
Ярославская....	180	146	27	7	—	—	—	—	3	1	2	—
Всего....	9730	8087	1233	408	442	311	107	24	24	3	18	1

Воспаленіе брюшины.				Неправильности пищеваренія.				Геморой.				Глисты.			
ПОЛЪЗ.	ВЫЗД.	УМ.	ОСТ.	ПОЛЪЗ.	ВЫЗД.	УМ.	ОСТ.	ПОЛЪЗ.	ВЫЗД.	УМ.	ОСТ.	ПОЛЪЗ.	ВЫЗД.	УМ.	ОСТ.
1	1	—	—	4	3	1	—	6	6	—	—	—	—	—	—
2	2	—	—	12	12	—	—	6	3	—	—	1	1	—	—
—	—	—	—	6	6	—	—	6	3	1	2	1	1	—	—
89	72	16	1	9	8	1	—	10	9	—	1	13	13	—	—
6	4	2	—	36	29	6	1	3	3	—	—	19	17	—	2
8	7	1	—	1	1	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—
8	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	16	6	2	48	42	6	—	6	6	—	—	40	38	—	2
61	30	6	3	26	22	3	1	44	44	—	—	20	14	6	—
12	9	2	1	27	27	—	—	39	36	—	3	16	13	—	1
11	10	1	—	6	6	—	—	5	5	—	—	4	4	—	—
14	10	4	—	1	—	—	1	38	36	—	2	7	6	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	3	1	—	—	—	—	—	2	1	1	—	1	1	—	—
5	4	1	—	4	3	—	1	10	10	—	—	3	2	—	1
34	24	7	3	8	7	—	1	3	2	—	1	30	26	—	4
9	7	2	—	—	—	—	—	8	8	—	—	—	—	—	—
16	13	1	2	28	19	9	—	—	—	—	—	40	38	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—
27	19	7	1	49	38	11	—	35	32	—	3	—	—	—	—
11	8	3	—	1	1	—	—	3	3	—	—	3	3	—	—
39	33	2	2	8	6	—	2	6	2	—	4	23	20	—	3
53	47	5	1	5	5	—	—	1	1	—	—	13	11	—	2
4	—	4	—	17	15	2	—	30	27	1	2	1	1	—	—
5	5	—	—	1	1	—	—	12	11	—	1	2	1	—	1
6	2	4	—	—	—	—	—	13	12	—	1	8	5	1	2
1	1	—	—	3	3	—	—	6	5	1	—	2	2	—	—
1	1	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	1	—	—
21	8	13	—	3	3	—	—	43	43	—	—	4	4	—	—
2	1	1	—	5	4	—	1	—	—	—	—	4	4	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	16	14	—	2	3	3	—	—
50	43	4	3	17	15	—	2	—	—	—	—	4	4	—	—
123	106	11	8	34	48	3	3	7	7	—	—	6	6	—	—
30	19	11	—	16	13	2	1	6	6	—	—	1	1	—	—
13	7	4	2	12	12	—	—	12	11	—	1	11	11	—	—
31	22	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83	53	28	2	—	—	—	—	1	—	—	1	6	5	—	1
5	4	1	—	—	—	—	—	20	20	—	—	2	2	—	—
17	14	2	1	4	4	—	—	16	14	1	1	4	4	—	—
8	6	1	1	12	11	—	1	29	26	—	3	7	7	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	2	—	—	—	—
54	37	17	—	4	4	—	—	3	3	—	—	13	13	—	—
11	9	2	—	4	4	—	—	10	10	—	—	2	2	—	—
31	24	4	3	15	13	—	—	18	15	1	2	9	8	1	—
3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	5	—	—	3	2	—	1	3	3	—	—	4	4	—	—
2	2	—	—	1	1	—	—	15	14	—	1	1	1	—	—
50	41	8	1	6	6	—	—	1	1	—	—	13	14	—	1
26	21	2	3	9	7	1	1	23	18	—	5	1	1	—	—
38	21	13	4	4	4	—	—	10	9	1	—	30	47	—	3
37	32	5	—	6	3	—	3	38	33	—	5	44	42	—	2
2	1	1	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
13	9	2	2	20	20	—	—	21	19	—	2	2	2	—	—
1110	844	216	50	496	431	43	20	597	544	7	46	430	412	8	30





Губерніи.	Податра.				Воспаленіе печени.				Органическія болѣзни печени и селезенки.			
	польз.	вызд.	ум.	ост.	польз.	вызд.	ум.	ост.	польз.	вызд.	ум.	ост.
Архангельская...	1	—	—	1	—	—	—	—	10	10	—	—
Астраханская...	—	—	—	—	4	3	—	1	8	6	—	2
Бессарабская Обл.	2	1	1	—	4	4	—	—	19	13	1	3
Витебская.....	7	3	—	2	—	—	—	—	276	226	23	27
Витебская.....	4	2	2	—	—	—	—	—	24	19	4	1
Владимирская....	—	—	—	—	—	—	—	—	38	27	10	1
Вологодская.....	—	—	—	—	—	—	—	—	27	22	4	1
Вольнская.....	2	2	—	—	12	11	—	1	43	28	17	—
Воронежская.....	13	13	—	—	101	90	4	7	43	38	3	2
Вятская.....	2	2	—	—	—	—	—	—	19	16	—	3
Гродненская.....	—	—	—	—	58	44	13	1	13	11	4	—
Екатеринославск..	3	2	—	1	18	14	3	1	163	139	13	11
Забайкальской Об.	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—
Иркутская.....	—	—	—	—	—	—	—	—	33	47	4	2
Казанская.....	—	—	—	—	3	3	—	—	16	13	2	1
Калужская.....	—	—	—	—	—	—	—	—	77	66	9	2
Кіевская.....	—	—	—	—	73	61	11	1	50	44	3	1
Ковенская.....	3	2	—	3	26	22	1	3	33	31	1	3
Костромская.....	—	—	—	—	—	—	—	—	60	50	8	2
Курляндская.....	7	3	1	1	—	—	—	—	23	13	7	1
Курская.....	—	—	—	—	113	102	9	4	8	8	—	—
Лифляндская.....	17	13	—	2	10	10	—	—	27	18	8	1
Минская.....	3	3	—	—	—	—	—	—	114	94	9	11
Могилевская.....	13	13	—	—	—	—	—	—	33	28	24	3
Московская.....	—	—	—	—	27	24	1	2	21	16	3	—
Нижегородская..	3	3	—	—	38	30	3	3	26	19	6	1
Новгородская....	—	—	—	—	—	—	—	—	23	17	8	—
Олонекская.....	1	1	—	—	1	1	—	—	12	8	3	1
Оренбургская....	—	—	—	—	—	—	—	—	16	10	3	1
Орловская.....	3	3	1	1	2	1	1	—	43	36	4	3
Пензенская.....	—	—	—	—	—	—	—	—	27	22	4	1
Пермская.....	3	3	—	—	—	—	—	—	10	9	1	—
Подольская.....	—	—	—	—	—	—	—	—	43	34	3	4
Полтавская.....	—	—	—	—	123	109	8	8	371	309	49	13
Псковская.....	—	—	—	—	29	21	7	1	26	18	7	1
Рязанская.....	—	—	—	—	3	3	—	—	43	33	6	2
Самарская.....	—	—	—	—	—	—	—	—	31	47	3	1
С. Петербургская.	1	—	1	—	89	67	17	3	2	2	—	—
Саратовская.....	7	7	—	—	18	17	1	—	68	61	4	3
Симбирская.....	4	3	—	1	47	44	—	3	90	84	4	2
Смоленская.....	3	3	—	—	7	6	—	1	77	67	8	2
Ставропольская..	—	—	—	—	7	7	—	—	3	3	—	—
Таврическая.....	1	1	—	—	3	3	—	—	17	16	1	—
Тамбовская.....	7	7	—	—	13	13	—	—	34	31	2	1
Тверская.....	2	1	—	1	33	28	7	—	38	23	13	—
Тифлисская.....	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	1	—
Тобольская.....	—	—	—	—	—	—	—	—	17	14	1	2
Томская.....	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	1	—
Тульская.....	—	—	—	—	2	1	1	—	102	89	10	3
Харьковская.....	3	3	—	—	29	20	7	2	73	61	7	7
Херсонская.....	4	2	1	1	—	—	—	—	132	121	12	19
Черниговская....	1	1	—	—	11	8	2	1	113	86	22	7
Эстляндская.....	1	1	—	—	14	10	3	1	1	1	—	—
Ярославская.....	—	—	—	—	13	12	1	—	11	9	2	—
Всего....	131	110	7	14	961	812	104	45	2733	2229	334	152

Воспаленіе почекъ.				Органическія болѣзни почекъ.				Каменная болѣзнь.				Катарръ пузыря.			
польз.	вызд.	ум.	ост.	польз.	вызд.	ум.	ост.	польз.	вызд.	ум.	ост.	польз.	вызд.	ум.	ост.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
18	13	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	14	12	1	1
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	21	20	—	1
—	—	—	—	6	4	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—
3	4	1	—	—	—	—	—	2	2	—	—	3	3	—	—
3	4	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	21	13	—	8
1	1	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	3	3	—	—
4	4	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—
7	7	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	3	3	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	2	2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	11	10	—	1
—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	3	3	—	2
3	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	2
3	3	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
3	3	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	4	—	1
7	7	—	—	—	—	—	—	8	3	3	—	2	2	—	—
2	2	—	—	—	—	—	—	3	2	2	1	3	3	1	1
—	—	—	—	8	6	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	10	—	2
2	1	1	—	—	—	—	—	23	22	4	2	1	1	—	—
8	7	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	6	6	—	—
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	3	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	4	4	—	—
2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	—
3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—
7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	9	3	3	1	—	—	—	—
4	3	1	—	—	—	—	—	7	3	1	1	2	2	—	—
2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	14	1	—	43	20	23	—	2	2	—	—	12	11	1	—
—	—	—	—	3	4	1	—	3	3	—	—	3	3	—	—
—	—	—	—	2	2	—	—	2	2	—	—	4	2	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—
4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	1	—
6	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
7	7	—	—	—	—	—	—	3	1	1	1	9	7	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1



Губерніи.	Неправильности от- дѣленія мочи.				Неправильности мѣ- сячнаго очищенія.				Катарръ рукава матки.			
	польз.	вызд.	ум.	ост.	польз.	вызд.	ум.	ост.	польз.	вызд.	ум.	ост.
Архангельская...	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Астраханская....	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бессарабская Обл.	4	4	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Виденская.....	—	—	—	—	43	41	1	1	—	—	—	—
Витебская.....	8	7	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—
Владимірская....	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
Вологодская....	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Вольнская.....	2	1	—	1	2	2	—	—	3	3	—	—
Воронежская....	10	9	—	1	4	4	—	—	3	3	—	—
Вятская.....	3	3	—	—	3	3	—	—	2	2	—	—
Гродненская.....	—	—	—	—	10	7	—	3	—	—	—	—
Екатеринославск.	2	1	—	1	6	2	—	4	—	—	—	—
Забайкальская Об.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Иркутская.....	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—
Казанская.....	3	3	—	—	9	9	—	—	12	9	—	3
Калужская.....	3	3	—	—	36	35	—	1	—	—	—	—
Кіевская.....	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
Ковенская.....	—	—	—	—	9	8	—	1	—	—	—	—
Костромская....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Курляндская....	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Курская.....	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Лифляндская....	—	—	—	—	3	2	—	1	—	—	—	—
Минская.....	—	—	—	—	13	12	—	1	—	—	—	—
Могилевская....	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—
Московская.....	7	7	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Нижегородская..	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Новгородская....	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Олонекская.....	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Оренбургская....	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Орловская.....	8	8	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Пензенская.....	4	4	—	—	6	6	—	—	1	1	—	—
Пермская.....	4	4	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—
Подольская.....	4	4	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Полтавская.....	3	2	1	—	3	3	—	—	—	—	—	—
Псковская.....	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Рязанская.....	9	9	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
Самарская.....	2	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
С. Петербургская.	1	1	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—
Саратовская.....	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Симбирская.....	5	5	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
Смоленская.....	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ставропольская..	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
Таврическая....	—	—	—	—	42	37	4	1	1	1	—	—
Тамбовская.....	22	22	—	—	2	2	—	—	1	1	—	—
Тверская.....	12	10	2	—	2	1	1	—	—	—	—	—
Тифлисская.....	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Тобольская.....	8	8	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
Томская.....	1	—	1	—	2	1	—	1	—	—	—	—
Тульская.....	7	7	—	—	17	13	—	4	—	—	—	—
Харьковская.....	10	7	1	2	1	1	—	—	2	2	—	—
Херсонская.....	19	16	—	3	31	29	—	2	—	—	—	—
Черниговская....	1	1	—	—	7	6	—	1	—	—	—	—
Эстляндская.....	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Ярославская.....	18	14	2	2	4	4	—	—	2	2	—	—
Всего.....	197	178	8	11	292	263	6	23	31	28	—	3

Органическія болѣз- ни матки и личин- ковъ.				Кровотеченіе изъ матки.				Родильная горячка.				Водянка.			
польз.	вызд.	ум.	ост.	польз.	вызд.	ум.	ост.	польз.	вызд.	ум.	ост.	польз.	вызд.	ум.	ост.
1	1	—	—	4	4	—	—	1	—	1	—	17	7	9	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	14	18	3
2	2	—	—	2	2	—	—	6	3	1	—	36	13	16	7
17	13	3	1	49	43	2	2	62	30	10	2	287	146	123	16
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	96	49	42	3
—	—	—	—	2	2	—	—	1	1	—	—	72	31	32	9
—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	41	19	20	2
10	9	1	—	—	—	—	—	2	2	—	—	201	116	73	12
5	5	—	—	5	5	—	—	11	5	3	1	143	65	63	13
—	—	—	—	1	1	—	—	4	4	—	—	83	39	36	8
3	3	—	—	13	10	—	3	—	—	—	—	293	179	99	17
4	3	—	1	—	—	—	—	3	1	—	2	223	114	90	21
—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	—	—	11	3	7	1
—	—	—	—	5	3	1	1	1	1	—	—	59	25	30	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	22	33	3
—	—	—	—	10	10	—	—	—	—	—	—	133	67	33	13
30	23	2	3	4	4	—	—	7	4	—	3	248	123	111	12
2	2	—	—	10	7	1	2	7	7	—	—	135	69	70	16
1	—	1	—	3	5	—	—	1	1	—	—	56	30	23	3
—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	129	65	58	6
—	—	—	—	13	11	—	2	—	—	—	—	199	103	77	19
2	2	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	91	48	33	10
3	3	—	—	8	7	—	1	19	16	1	2	293	138	114	21
1	—	—	1	7	6	1	—	6	6	—	—	129	75	44	10
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	430	293	132	23
3	3	—	—	8	5	2	1	3	4	1	—	82	38	29	13
1	1	—	—	3	3	1	1	1	1	—	—	74	31	37	6
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	20	5	3
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	24	16	8	—
2	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	112	51	32	9
—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	41	17	19	3
2	2	—	—	2	2	—	—	2	1	1	—	24	14	9	1
1	1	—	—	1	1	—	—	3	4	—	1	144	72	66	6
2	2	—	—	1	1	—	—	8	8	—	—	538	272	223	43
2	1	1	—	2	1	—	1	6	4	—	2	183	65	119	1
—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	81	47	23	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	15	18	3
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	194	108	78	8
2	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	132	63	63	4
10	9	—	1	4	3	1	—	3	3	—	—	104	58	32	14
1	—	1	—	6	4	1	1	3	2	—	1	182	101	63	18
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	8	5	3	—
7	7	—	—	5	4	1	—	14	14	—	—	112	66	42	4
2	—	1	1	1	1	—	—	1	1	—	—	101	56	32	13
7	5	2	—	5	4	1	—	3	4	1	—	138	73	57	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	15	7	2
3	1	2	—	1	1	—	—	2	1	—	1	34	14	17	3
3	2	—	1	5	5	—	—	—	—	—	—	22	10	11	1
5	5	—	—	6	4	2	—	8	8	—	—	135	75	49	11
5	3	1	1	13	13	—	—	11	7	1	3	171	73	85	13
22	22	—	—	11	10	—	1	4	3	—	1	248	93	140	15
2	2	—	—	5	4	1	—	3	2	1	—	234	113	117	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	13	5	1
3	2	1	—	3	3	—	—	9	7	1	4	75	37	31	7
168	140	17	11	232	200	16	16	239	191	27	21	6870	3510	2832	508



Губернии.	Анемия и хлорозъ.				Маразмъ.				Золотуха.			
	польз.	вызд.	ум.	ост.	польз.	вызд.	ум.	ост.	польз.	вызд.	ум.	ост.
Архангельская...	—	—	—	—	—	—	—	—	14	12	—	2
Астраханская....	—	—	—	—	13	3	8	2	9	8	—	1
Бессарабская Обл.	—	—	—	—	—	—	—	—	22	21	1	—
Витебская.....	—	—	—	—	—	—	—	—	107	97	1	9
Витебская.....	2	2	—	—	13	9	3	3	44	37	—	7
Владимирская....	3	3	1	1	3	2	1	—	21	19	—	2
Вологодская.....	—	—	—	—	39	19	18	2	30	23	2	3
Волынская.....	—	—	—	—	—	—	—	—	30	22	3	3
Воронежская....	3	3	—	—	—	—	—	—	31	48	1	2
Вятская.....	1	1	—	—	—	—	—	—	57	48	2	7
Гродненская.....	3	3	—	—	—	—	—	—	26	19	1	6
Екатеринославск.	—	—	—	—	—	—	—	—	81	76	1	4
Забайкальская Об.	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—
Иркутская.....	—	—	—	—	—	—	—	—	12	11	—	1
Казанская.....	—	—	—	—	1	—	1	—	21	16	1	4
Калужская.....	30	27	—	3	3	2	2	1	60	30	6	4
Киевская.....	—	—	—	—	—	—	—	—	44	37	1	6
Ковенская.....	3	2	—	1	—	—	—	—	94	80	3	11
Костромская.....	—	—	—	—	3	1	2	—	46	42	—	4
Курляндская....	14	12	2	—	—	—	—	—	12	8	—	4
Курская.....	16	13	—	1	—	—	—	—	51	50	—	1
Лифляндская....	1	1	—	—	2	—	2	—	19	13	4	2
Минская.....	18	10	8	—	—	—	—	—	86	78	—	8
Могилевская.....	—	—	—	—	34	20	4	10	123	103	11	11
Московская.....	—	—	—	—	—	—	—	—	42	42	—	—
Нижегородская..	1	1	—	—	39	16	17	6	17	15	—	2
Новгородская....	—	—	—	—	14	6	3	3	25	23	—	—
Олонекская.....	—	—	—	—	—	—	—	—	18	17	—	1
Оренбургская....	—	—	—	—	—	—	—	—	36	31	1	4
Орловская.....	1	—	1	—	—	—	—	—	51	43	—	8
Пензенская.....	2	2	—	—	—	—	—	—	29	28	—	1
Пермская.....	—	—	—	—	20	16	3	1	30	48	1	1
Подольская.....	—	—	—	—	—	—	—	—	48	36	2	10
Полтавская.....	7	3	2	2	—	—	—	—	127	111	—	16
Псковская.....	—	—	—	—	—	—	—	—	26	21	3	2
Рязанская.....	6	3	2	1	23	13	12	—	96	90	—	6
Самарская.....	7	7	—	—	1	1	—	—	8	7	—	1
С. Петербургская	19	18	—	1	2	—	2	—	46	37	3	6
Саратовская.....	—	—	—	—	1	1	—	—	33	30	—	3
Симбирская.....	2	2	—	—	—	—	—	—	39	29	—	10
Смоленская.....	—	—	—	—	9	3	4	—	36	33	1	—
Ставропольская..	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	1
Таврическая....	4	4	—	—	2	—	1	1	11	9	2	—
Тамбовская.....	3	2	1	—	6	3	2	1	43	32	—	11
Тверская.....	—	—	—	—	7	1	4	2	77	52	4	21
Тифлисская.....	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Тобольская.....	3	1	2	—	3	—	3	—	19	17	—	2
Томская.....	2	2	—	—	11	9	2	—	8	8	—	—
Тульская.....	7	3	2	—	3	1	—	2	72	64	4	4
Харьковская.....	6	4	—	2	1	1	—	—	57	51	1	3
Херсонская.....	8	7	—	1	130	47	10	1	99	79	—	20
Черниговская....	—	—	—	—	—	—	—	—	109	90	—	19
Эстляндская.....	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	—	—
Ярославская.....	4	4	—	—	36	19	12	3	22	20	—	2
Всего....	182	148	21	13	448	197	211	40	2343	2021	60	262

Скорбутъ.				Гангрена.				Ракъ внутреннихъ органовъ.				Веперическая болѣзнь.			
польз.	вызд.	ум.	ост.	польз.	вызд.	ум.	ост.	польз.	вызд.	ум.	ост.	польз.	вызд.	ум.	ост.
11	8	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	122	112	2	8
19	14	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	68	57	1	10
4	4	—	—	1	—	1	—	6	2	4	—	230	199	1	30
30	47	—	3	26	14	10	2	—	—	—	—	313	433	8	74
11	9	2	—	1	—	1	—	3	—	1	2	315	239	3	53
13	11	1	1	4	1	2	1	2	—	—	2	300	272	1	27
23	17	3	3	1	—	1	—	1	1	—	—	303	266	2	37
21	13	4	2	7	2	4	1	6	2	3	1	603	334	6	63
140	113	19	6	13	8	3	2	4	2	2	—	634	388	5	61
131	99	15	17	2	1	1	—	15	7	8	—	587	323	—	62
31	23	7	1	8	3	2	1	—	—	—	—	429	371	7	31
263	239	17	7	13	3	9	3	3	1	2	—	343	468	—	77
20	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	53	1	7
12	7	2	3	6	3	1	—	—	—	—	—	132	136	—	16
18	13	2	3	—	—	—	—	1	—	1	—	274	223	6	43
36	32	1	3	10	6	3	1	4	4	—	—	363	489	1	73
69	59	3	3	12	2	10	—	3	2	3	—	604	528	2	74
33	28	3	2	1	—	1	—	—	—	—	—	493	416	2	77
20	18	—	2	6	3	3	—	—	—	—	—	213	184	—	29
24	21	3	—	4	1	2	1	1	1	—	—	932	861	4	87
63	59	1	5	13	8	5	—	—	—	—	—	330	308	1	41
12	9	3	—	4	3	1	—	2	1	—	1	334	301	3	50
49	44	2	3	5	2	3	—	5	3	1	1	437	393	—	62
18	17	1	—	7	4	3	—	4	4	—	—	441	376	—	63
10	9	—	1	10	6	3	1	—	—	—	—	2634	2290	13	331
17	13	—	2	3	1	2	—	6	4	2	—	308	439	—	49
23	22	1	—	3	2	1	—	1	—	—	1	209	192	—	17
7	7	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	178	142	—	36
24	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128	116	2	10
20	18	—	2	8	3	3	—	2	1	1	—	413	334	3	38
28	26	2	—	2	1	1	—	4	4	—	—	323	290	2	31
20	18	1	1	3	—	3	—	1	1	—	—	271	233	1	17
33	31	2	—	4	1	3	—	1	—	1	—	641	531	3	87
375	347	9	19	34	23	10	1	1	1	—	—	772	661	—	111
150	125	23	—	3	—	2	1	—	—	—	—	488	439	—	49
14	13	1	—	6	3	2	1	1	1	—	—	396	344	—	52
24	24	—	—	11	1	2	—	1	1	—	—	331	291	9	31
368	302	64	2	71	44	17	10	12	1	11	—	366	323	2	41
43	37	6	—	6	2	3	1	1	—	1	—	636	582	6	68
49	40	3	4	3	3	1	1	3	1	2	—	464	413	2	49
9	8	—	1	4	—	3	1	8	6	2	—	424	363	2	59
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	13	—	1
204	183	13	4	38	23	13	—	3	2	1	—	380	297	23	30
17	14	2	1	10	6	4	—	—	—	—	—	511	442	3	66
36	30	6	—	14	9	5	—	1	—	1	—	761	643	12	106
2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97	94	1	2
40	36	1	3	2	—	2	—	3	1	2	—	266	233	1	12
2	1	—	1	2	—	1	1	6	2	1	3	92	82	—	10
28	23	1	2	9	6	2	1	3	—	3	—	494	418	3	73
38	44	8	6	19	7	8	4	2	1	1	—	321	433	8	78
377	337	12	8	20	2	17	1	2	1	—	1	897	777	2	118
96	83	8	3	10	1	9	—	1	1	—	—	638	543	6	107
2	1	—	1	4	2	2	—	—	—	—	—	213	191	—	24
26	21	1	4	3	1	1	—	—	—	—	—	438	383	7	48
3196	2793	267	136	446	218	190	38	126	59	55	12	24109	20994	167	2948



Губерніи.	Хроническія сыпн.				Чесотка.				Укушеніе животныхъ.			
	ПОЛЪЗ.	ВЫЗД.	УМ.	ОСТ.	ПОЛЪЗ.	ВЫЗД.	УМ.	ОСТ.	ПОЛЪЗ.	ВЫЗД.	УМ.	ОСТ.
Архангельская...	7	3	1	1	5	3	—	—	1	1	—	—
Астраханская...	27	19	1	7	2	2	—	—	—	—	—	—
Бессарабская Обл.	16	16	—	—	23	23	—	—	—	—	—	—
Виленская.....	71	66	1	4	113	109	—	6	—	—	—	—
Витебская.....	66	64	1	1	36	34	—	2	—	—	—	—
Владимірская....	7	6	—	1	31	28	—	3	2	—	—	2
Вологодская....	8	8	—	—	38	36	—	2	—	—	—	—
Волынская.....	34	31	—	3	73	72	1	—	4	4	—	—
Воронежская....	63	63	—	—	433	396	—	37	—	—	—	—
Вятская.....	21	21	—	—	117	111	—	6	—	—	—	—
Гродненская.....	11	11	—	—	38	35	1	2	—	—	—	—
Екатеринославск.	101	97	—	4	201	193	—	8	1	1	—	—
Забайкальская Об.	9	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Иркутская.....	10	9	1	—	11	11	—	—	1	1	—	—
Казанская.....	11	10	—	1	31	31	—	—	—	—	—	—
Калужская.....	6	3	1	—	223	212	—	11	3	1	2	—
Кіевская.....	40	39	—	1	72	69	—	3	10	5	5	—
Ковенская.....	23	18	1	4	46	43	—	3	1	1	—	—
Костромская....	42	33	—	7	47	42	—	5	—	—	—	—
Курляндская....	38	34	—	4	124	122	—	2	1	—	—	1
Курская.....	36	34	—	2	101	96	—	5	—	—	—	—
Лифляндская....	46	46	—	—	37	35	—	2	—	—	—	—
Минская.....	63	61	—	2	77	68	—	9	13	13	—	—
Могилевская....	24	22	—	2	200	186	—	14	1	—	1	—
Московская.....	10	10	—	—	23	23	—	—	2	2	—	—
Нижегородская..	92	80	—	12	81	76	—	5	1	—	1	—
Новгородская....	7	7	—	—	30	27	—	3	2	2	—	—
Олонекская.....	22	22	—	—	32	31	—	1	1	1	—	—
Оренбургская....	—	—	—	—	84	83	—	1	—	—	—	—
Орловская.....	2	2	—	—	80	80	—	—	—	—	—	—
Оренбургская....	29	29	—	—	148	129	—	19	3	3	—	—
Пермская.....	17	17	—	—	84	80	—	4	—	—	—	—
Подольская.....	26	23	—	3	32	27	—	5	4	3	1	—
Полтавская.....	61	37	—	4	358	330	2	26	5	1	4	—
Псковская.....	—	—	—	—	380	360	—	20	—	—	—	—
Рязанская.....	12	12	—	—	77	71	—	6	—	—	—	—
Самарская.....	33	30	—	3	103	99	—	4	1	—	1	—
С. Петербургская.	31	27	1	3	70	68	—	2	1	—	—	1
Саратовская.....	11	10	—	1	191	188	1	2	1	—	1	—
Симбирская.....	31	28	—	3	218	211	—	7	2	1	1	—
Смоленская.....	23	19	1	3	98	91	—	7	—	—	—	—
Ставропольская..	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Таврическая.....	74	70	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[illegible]



Губерніи.	Травматическія воспаленія.				Нарывы.				Обжоги.			
	полвз.	вызд.	ум.	ост.	полвз.	вызд.	ум.	ост.	полвз.	вызд.	ум.	ост.
Архангельская...	1	1	—	—	6	4	1	1	3	3	—	—
Астраханская...	—	—	—	—	8	7	—	1	5	4	—	1
Бессарабская Обл.	3	3	—	—	17	16	1	—	4	2	1	1
Виленская.....	72	61	2	9	148	134	2	12	23	18	1	4
Витебская.....	6	4	1	1	63	53	3	3	6	3	1	—
Владимірская....	49	46	—	3	79	72	—	7	14	10	2	2
Вологодская.....	2	2	—	—	21	16	1	4	5	4	1	—
Волынская.....	3	2	1	—	113	96	7	12	11	8	1	2
Воронежская....	18	16	2	—	147	116	—	31	17	16	1	—
Вятская.....	14	12	—	2	61	57	—	4	2	2	—	—
Гродненская.....	35	29	—	6	33	29	1	3	13	12	2	1
Екатеринославск..	1	—	1	—	107	99	2	6	10	8	1	1
Забайкальская Об.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Иркутская.....	1	1	—	—	12	12	—	—	4	3	1	—
Казанская.....	4	2	2	—	39	32	4	3	6	5	—	1
Калужская.....	12	11	—	1	102	93	—	9	6	6	—	—
Кіевская.....	23	19	3	1	143	121	16	6	12	9	2	1
Ковенская.....	4	4	—	—	78	66	1	11	9	9	—	—
Костромская.....	—	—	—	—	52	49	—	3	3	3	—	—
Курляндская....	3	2	—	1	167	146	2	19	12	10	—	2
Курская.....	13	11	1	3	104	96	1	7	—	—	—	—
Лифляндская....	18	15	1	2	80	69	2	9	13	13	—	—
Минская.....	28	24	3	1	131	118	—	13	16	13	2	1
Могилевская....	8	7	1	—	71	62	—	9	8	8	—	—
Московская.....	23	19	3	1	23	21	1	3	7	5	—	2
Нижегородская..	7	7	—	—	79	73	1	5	17	16	1	—
Новгородская....	4	4	—	—	37	32	3	2	3	3	—	—
Олонекская.....	2	2	—	—	80	75	2	3	4	2	1	1
Оренбургская....	2	2	—	—	59	57	—	2	3	4	—	1
Орловская.....	4	4	—	—	72	60	2	10	15	15	—	—
Пензенская.....	1	1	—	—	56	46	1	9	8	8	—	—
Пермская.....	1	1	—	—	46	46	—	—	5	3	—	2
Подольская.....	19	18	—	1	113	109	—	6	7	6	—	1
Полтавская.....	10	10	—	—	160	138	4	18	7	5	1	1
Псковская.....	—	—	—	—	83	79	—	4	5	4	—	1
Рязанская.....	2	1	1	—	103	96	1	6	3	3	—	—
Самарская.....	3	3	—	—	43	41	—	2	6	6	—	—
С. Петербургская.	7	7	—	—	167	144	28	23	30	24	1	5
Саратовская.....	2	2	—	—	126	112	2	12	9	9	—	—
Симбирская.....	6	6	—	—	124	114	1	9	10	8	1	1
Смоленская.....	6	3	—	3	58	51	2	5	2	2	—	—
Ставропольская..	—	—	—	—	4	3	—	1	—	—	—	—
Таврическая.....	22	20	2	—	89	80	4	5	11	10	1	—
Тамбовская.....	13	13	—	—	97	86	—	11	9	7	1	1
Тверская.....	2	2	—	—	107	97	4	6	11	11	—	—
Тифлисская.....	—	—	—	—	7	7	—	—	3	1	2	—
Тобольская.....	10	8	2	—	31	28	2	1	9	6	1	2
Томская.....	1	1	—	—	9	8	1	—	—	—	—	—
Тульская.....	6	6	—	—	98	93	1	4	9	9	—	—
Харьковская.....	20	18	1	1	89	83	—	6	10	9	1	—
Херсонская.....	13	13	—	—	137	114	5	18	17	15	1	1
Черниговская....	53	50	—	3	295	272	1	22	23	18	2	3
Эстляндская.....	4	4	—	—	13	11	—	4	3	2	1	—
Ярославская.....	91	90	—	1	154	133	5	16	13	10	2	1
Всего....	654	587	27	40	4371	3864	113	392	465	392	33	40

Обмороженія.				Ушибы.				Раны.				Переломы.			
Полез.	Вызд.	Ум.	Ост.	Полез.	Вызд.	Ум.	Ост.	Полез.	Вызд.	Ум.	Ост.	Полез.	Вызд.	Ум.	Ост.
5	4	—	1	8	8	—	—	12	11	—	1	1	—	—	1
3	3	—	—	29	26	—	3	19	19	—	—	6	3	1	2
7	4	—	3	10	10	—	—	18	13	3	—	11	8	2	1
77	77	—	—	39	32	1	6	120	106	—	14	34	34	—	—
30	29	—	1	26	23	2	1	31	43	1	3	6	5	—	1
11	11	—	—	33	33	—	2	83	76	—	7	8	4	1	3
6	6	—	—	9	9	—	—	18	13	1	2	6	3	—	3
83	77	4	2	39	38	1	—	113	104	2	7	21	16	2	3
49	48	1	—	60	37	—	3	120	108	3	9	33	28	2	3
8	8	—	—	34	49	1	4	73	71	1	1	8	8	—	—
32	43	1	8	22	19	1	2	33	42	1	10	13	9	2	2
36	29	1	6	39	35	—	4	76	67	2	7	23	17	1	5
7	4	2	1	27	25	—	2	30	25	—	5	6	6	—	—
9	8	—	1	47	43	1	3	21	19	—	2	20	15	2	3
10	8	—	2	40	35	—	3	96	91	—	3	14	13	—	1
43	13	—	2	66	39	4	3	60	49	3	8	32	23	3	4
24	21	—	3	41	35	—	6	74	33	—	21	25	17	2	6
6	6	—	—	19	17	—	2	84	74	—	10	3	1	—	2
24	22	1	1	60	36	1	3	71	64	2	3	27	21	1	3
37	37	—	—	34	32	—	2	91	88	1	2	28	24	2	2
22	20	1	1	68	64	2	2	37	33	3	1	20	18	—	2
37	36	1	—	43	40	1	4	132	117	2	13	26	22	1	3
8	6	—	2	37	34	—	3	34	29	2	3	15	11	2	2
28	24	2	2	22	20	1	1	31	43	1	3	17	13	—	4
15	13	—	—	72	38	3	11	83	78	1	6	16	13	—	3
12	9	2	1	29	27	1	1	17	14	2	1	12	12	—	—
9	7	—	2	10	10	—	—	23	22	—	4	4	3	1	—
1	1	—	—	31	31	—	—	63	61	—	2	7	6	—	1
32	30	1	1	47	43	2	2	68	37	6	3	3	3	—	—
13	13	1	1	22	21	—	1	30	43	1	4	9	8	1	—
4	4	—	—	13	13	—	—	33	30	—	3	3	3	—	—
6	3	1	—	73	39	2	12	102	93	1	8	26	20	2	4
99	84	11	4	107	94	2	11	272	234	9	29	34	33	1	—
9	9	—	—	30	29	—	1	26	24	—	2	16	12	1	3
13	13	—	2	17	17	—	—	39	34	1	4	7	6	—	1
2	2	—	—	50	49	—	1	38	34	4	—	8	7	1	—
39	31	—	8	79	71	1	7	70	33	—	13	42	28	4	10
13	13	—	—	38	34	—	4	70	66	2	2	19	12	4	3
22	21	—	1	69	68	—	1	90	86	1	3	13	11	—	2
7	3	—	2	27	21	1	3	37	44	3	8	16	12	1	3
3	3	—	—	2	2	—	—	3	3	—	—	3	3	—	—
36	33	21	—	27	23	3	1	307	229	69	9	18	13	3	2
33	32	2	1	31	49	1	1	31	44	3	4	13	12	—	3
46	44	—	2	71	64	2	3	33	47	3	3	22	16	3	3
2	—	2	—	13	11	1	1	13	14	1	—	1	1	—	—
18	17	—	1	24	22	—	2	38	36	1	1	13	13	—	—
9	8	1	—	12	12	—	—	46	43	1	—	3	4	1	—
14	14	—	—	61	37	2	2	34	32	—	2	18	13	1	4
83	75	2	6	90	85	1	4	70	37	2	11	22	14	—	8
149	134	12	3	130	141	1	8	188	179	6	3	46	38	1	7
79	73	2	4	73	70	3	2	71	64	2	3	23	16	3	6
6	2	1	3	12	12	—	—	26	22	—	4	15	8	4	2
27	23	—	2	34	30	—	4	44	43	—	1	19	12	4	3
1453	1300	73	80	2294	2104	42	148	3610	3180	149	281	883	699	60	126







Губерніи.	Извѣ.				Наружный ракъ.				Карбушкулъ.			
	полѣз.	вызд.	ум.	ост.	полѣз.	вызд.	ум.	ост.	полѣз.	вызд.	ум.	ост.
Архангельская...	37	33	—	4	4	2	1	1	1	1	—	—
Астраханская...	104	97	1	6	4	4	—	—	1	1	—	—
Бессарабская Обл.	90	80	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—
Виленская.....	206	168	15	23	18	9	5	4	4	3	1	—
Витебская.....	134	121	1	12	1	1	—	—	1	1	—	—
Владимірская....	149	140	—	9	3	1	2	—	1	1	—	—
Вологодская.....	83	77	—	6	1	1	—	—	—	—	—	—
Валынская.....	133	133	7	13	7	4	3	—	1	1	—	—
Воронежская....	382	307	5	70	12	8	3	1	13	9	3	1
Вятская.....	480	436	1	23	2	1	—	1	1	1	—	—
Гродненская.....	168	147	1	20	4	2	—	2	4	4	—	—
Екатеринославск.	438	373	6	59	9	6	2	1	1	1	—	—
Забайкальская Об.	77	64	4	9	3	2	1	—	—	—	—	—
Иркутская.....	109	97	—	12	4	1	3	—	—	—	—	—
Казанская.....	176	170	1	5	6	5	—	1	3	3	—	—
Калужская.....	333	290	—	43	13	12	—	1	4	4	—	—
Кіевская.....	276	231	12	33	13	9	6	—	—	—	—	—
Ковенская.....	140	113	1	26	3	3	—	—	3	2	1	—
Костромская.....	88	76	—	12	3	2	1	—	—	—	—	—
Курляндская....	257	216	2	39	7	6	1	—	—	—	—	—
Курская.....	454	393	13	48	11	8	2	1	—	—	—	—
Лифляндская....	100	89	2	9	4	1	1	2	4	4	—	—
Минская.....	260	222	—	38	9	6	1	2	—	—	—	—
Могилевская.....	215	184	3	28	3	—	1	2	—	—	—	—
Московская.....	120	110	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—
Нижегородская..	232	200	1	31	1	1	—	—	1	—	—	1
Новгородская....	100	94	1	5	—	—	—	—	1	1	—	—
Олонецкая.....	86	63	2	21	—	—	—	—	—	—	—	—
Оренбургская....	39	33	—	6	12	9	2	1	—	—	—	—
Орловская.....	269	223	12	32	6	3	1	—	7	4	1	2
Пензенская.....	163	147	1	15	12	10	—	2	—	—	—	—
Пермская.....	83	78	—	5	—	—	—	—	1	1	—	—
Подольская.....	238	199	1	38	11	8	2	1	1	1	—	—
Полтавская.....	614	518	10	83	13	6	2	7	10	9	1	—
Псковская.....	373	333	1	39	1	1	—	—	1	1	—	—
Рязанская.....	207	189	1	17	9	7	2	—	1	1	—	—
Самарская.....	133	142	2	9	—	—	—	—	—	—	—	—
С. Петербургская	203	168	3	34	6	6	—	—	1	1	—	—
Саратовская.....	317	277	9	31	13	9	1	3	2	2	—	—
Симбирская.....	186	166	2	18	12	11	1	—	3	3	—	—
Смоленская.....	113	103	1	7	4	2	—	2	1	1	—	—
Ставропольская..	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Таврическая.....	101	82	18	1	5	4	1	—	—	—	—	—
Тамбовская.....	198	176	—	22	13	12	—	1	13	13	—	—
Тверская.....	246	218	8	20	19	16	3	—	2	2	—	—
Тифлисская.....	6	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Гобольская.....	65	53	1	11	6	4	2	—	1	1	—	—
Томская.....	21	18	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Тульская.....	298	272	1	25	10	8	1	1	2	2	—	—
Харьковская.....	260	226	8	26	10	7	3	—	—	—	—	—
Херсонская.....	337	290	—	47	9	3	3	1	1	1	—	—
Черниговская....	377	303	6	66	13	10	2	1	2	1	—	1
Эстляндская.....	73	60	2	13	—	—	—	—	3	3	—	—
Ярославская.....	268	230	8	30	7	2	5	—	4	4	—	—
Всего.....	10685	9288	181	1216	340	237	64	39	100	88	7	5

# О ПЕЧАТКѢ.

Стран.	на строкѣ:	Напечатано:	Читай:
4.	13 снизу	Ангора	Ангара
9.	8 сверху.	Ангора	Ангара
49,	12 —	экстенсивномъ	экстенсивномъ
78.	3 снизу	эстенсивномъ	экстенсивномъ
92	1 —	Тифлисской	Тифлисской
102	9 сверху	подязычныхъ	подязычныхъ
104	4 —	коцѣ	коцѣ
117	15 —	Летической	Летической
126	3 снизу	Роставѣ	Ростовѣ
130	12 сверху	исходомъ	исходомъ,
131	11 —	8;106.	8,106.
—	12 —	3199.	31.993.
132	13 —	31,151.	31,151).
171	13 снизу	инфарктовъ.	инфарктовъ.
173	12 —	искусственнаго	искусственнаго
175	8 сверху	Кишневской	Кишневской
—	9 —	Помертвѣніе мякоти	Помертвѣніе въ мякоти
		предмечія	
186	2 снизу	напароксизмы	пароксизмы
188	1 —	оконечностяхъ:	конечностяхъ:
196	10 —	усиливавшимся	усиливающимся
—	4 —	обличавшемся	обличавшимся
206	10 сверху	экстрактъ	экстрактъ
—	15 —	мышьяка	мышьяка
208	1 —	губерній	губерній
—	2 —	больницѣ	больницахъ
—	17 —	обложеннымъ	обложенномъ
211	6 снизу	Выздоровленіе	Выздоровленіе
212	9 —	эпитемій	эпителий
217	11 сверху	Островской	Остроужской
219	5 снизу	бедренныхъ	бедренныхъ
220	8 сверху	начинались	назначались
—	12 снизу	бедренно-тазовыхъ	бедренно-тазовыхъ
243	1 —	окитуровъ	контуровъ
246	12 —	инфильтраціи	инфильтраціи
251	15 —	часа	часа
253	7 сверху	анамнестическихъ	анамнестическихъ
260	5 —	Кишневской	Кишневской
265	14 снизу	звснулъ	заснулъ
277	12 сверху	одинакаго	одинаковаго
279	1 снизу	вдыхаемый	вдыхаемый
281	1 —	По	При
289	3 —	четвертый	четвертый
302	3 сверху	искусственную	искусственную
303	16 снизу	живота	его
311	15 сверху	muqueuses	muqueuses
312	3 —	ила а въ	ила въ
317	13 снизу	гною	гноя
318	9 —	Вымущеніе	Вымущенія
327	10 —	цвѣта;	цвѣта,





